

## Bijsluiter VERMOX

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is zonder recept verkrijgbaar. Om een zo goed mogelijk behandelingsresultaat te bereiken, moet VERMOX echter volgens de voorschriften worden gebruikt.

Bewaar de bijsluiter. Misschien wilt u deze later nog eens lezen.

Vraag uw apotheker om meer informatie of advies als u dat nodig heeft.

Als uw symptomen verergeren of als er na enkele dagen geen verbetering optreedt, moet u in ieder geval een arts raadplegen.

Deze bijsluiter bevat:

1. Wat is VERMOX en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u VERMOX inneemt?
3. Hoe moet VERMOX worden ingenomen?
4. Welke bijwerkingen zijn mogelijk?
5. Hoe moet VERMOX worden bewaard?
6. Verdere informatie

Naam van het geneesmiddel

VERMOX 100 mg tabletten

VERMOX 20 mg/ml suspensie voor oraal gebruik

De werkzame stof is mebendazol.

VERMOX tabletten bevatten 100 mg mebendazol (R 17 635) per tablet.

Overige bestanddelen: microkristallijne cellulose, talk, maïzetmeel, Carboxymethylzetmeel-natrium, natriumsacharine, magnesiumstearaat, gehydrogeneerde katoenzaadolie, sinaasappelschilolie, siliciumdioxide, natriumlaurylsulfaat, geel oranje S (E 110).

VERMOX Suspensie voor oraal gebruik bevat 20 mg mebendazol (R 17 635) per ml suspensie.

Overige bestanddelen: microkristallijne cellulose, methylcellulose, Natriumcarboxymethylcellulose, sucrose, natriumlaurylsulfaat, methylparahydroxybenzoaat, propylparahydroxybenzoaat, bananenaroma, citroenzuur, gezuiverd water.

Vergunninghouder

Janssen-Cilag n.v.

Roderveldlaan 1

B-2600 Berchem

België

Fabrikant

Tabletten

Janssen-Cilag S.p.A.

Via C. Janssen

I-04010 Borgo San Michele

Latina – Italië

Suspensie voor oraal gebruik

Janssen Pharmaceutica N.V.  
Turnhoutseweg 30  
B-2340 Beerse  
België

Vergunningsnummer  
VERMOX Tabletten: 1028 IS 162 F 3  
VERMOX Suspensie voor oraal gebruik: 2 S 260 F 11

## 1. Wat is VERMOX en waarvoor wordt het gebruikt?

Tabletten voor orale inname:

De tabletten zijn verkrijgbaar in een doordrukstrip met 6 tabletten.

Suspensie voor oraal gebruik:

De suspensie voor oraal gebruik is verkrijgbaar in een fles met 30 ml drankoplossing (met kunststof doseerdop voor 5 ml).

VERMOX is een middel tegen worminfecties

VERMOX is geïndiceerd voor de behandeling van infecties door één of meerdere wormsoorten:

- Aarsmade (*Enterobius vermicularis*);
- Spoelworm (*Ascaris lumbricoides*);
- Zweepworm (*Trichuris trichuria*);
- Haakworm (Mijnworm) (*Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*);
- Lintworm (*Taenia* spp.);
- Dwergthreadworm (*Strongyloides stercoralis*).

## 2. Wat moet u weten voordat u VERMOX inneemt?

VERMOX mag niet worden ingenomen,

- als u overgevoelig (allergisch) bent voor mebendazol of een van de andere bestanddelen van VERMOX. Deze overgevoeligheid kan zich uiten in huiduitslag, jeuk, kortademigheid en/of een gezwollen gezicht. Stop in dat geval de behandeling en raadpleeg uw arts.

Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij het innemen van VERMOX,

- wanneer het aan kinderen jonger dan 2 jaar wordt toegediend. VERMOX mag aan peuters jonger dan 2 jaar alleen worden toegediend als de worminfectie de voedingsstatus en de lichamelijke ontwikkeling van het kind duidelijk beïnvloedt. Vraag in ieder geval eerst uw arts om advies.
- wanneer u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Lees ook de sectie "Inname van VERMOX samen met andere geneesmiddelen".

Bij inname van VERMOX samen met voedsel en dranken

Niet van toepassing

Zwangerschap

Vooraf in de eerste drie maanden van de zwangerschap is het noodzakelijk om de voordelen van VERMOX af te wegen tegen de mogelijke risico's.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u geneesmiddelen inneemt.

## Borstvoeding

Tijdens de borstvoeding moet u voorzichtig zijn met het innemen van VERMOX. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u geneesmiddelen inneemt.

## Rijvaardigheid en het bedienen van machines

VERMOX heeft geen invloed op het vermogen om een voertuig te besturen of machines te bedienen.

## Belangrijke informatie over bepaalde andere bestanddelen van VERMOX

Niet van toepassing

## Inname van VERMOX samen met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het om niet-voorgeschreven geneesmiddelen gaat.

- Als u tegelijkertijd Cimetidine (een geneesmiddel tegen maagzuur) gebruikt, moet u dit aan uw arts melden. Hij zal de gepaste maatregelen nemen en de noodzakelijke dosisaanpassingen doen.
- Het gelijktijdig innemen van VERMOX en Metronidazol (een geneesmiddel tegen bacteriële en protozoaire infecties) moet worden vermeden.

## 3. Hoe moet VERMOX worden ingenomen?

Volg deze instructies precies op, tenzij uw arts u iets anders heeft voorgeschreven. Vraag uw arts of apotheker als u niet helemaal zeker bent.

Hoeveel VERMOX u moet innemen, hangt af van het type worm waarmee u geïnfecteerd bent. Als u twijfelt, vraag dan uw arts om advies.

### 1. Aarsmaden (*Enterobius vermicularis*):

1 enkele tablet of 5 ml (= 1 doseerdop) drankoplossing.

Alle gezinsleden moeten gelijktijdig worden behandeld en deze behandeling moet na 2 tot 4 weken worden herhaald (alle gezinsleden nemen opnieuw 1 tablet of 5 ml drankoplossing in).

Dit is noodzakelijk voor een effectieve behandeling: de eerste inname doodt alle wormen, maar niet hun eieren, die een nieuwe infectie kunnen veroorzaken.

De dosering geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen.

### 2. Spoelwormen, zweepwormen, haakwormen en gemengde infecties: 1 tablet of 5 ml (= 1 doseerdop) drankoplossing 's ochtends en 's avonds gedurende drie opeenvolgende dagen.

De dosering geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen.

### 3. Lintwormen en dwergdraadwormen:

\* Volwassenen:

2 tot 3 tabletten of 10 tot 15 ml (= 2 tot 3 doseerdoppen) drankoplossing 's ochtends en 's avonds gedurende drie opeenvolgende dagen.

\* Kinderen ouder dan 2 jaar:

1 tablet of 5 ml (= 1 doseerdop) drankoplossing 's ochtends en 's avonds gedurende drie opeenvolgende dagen.

Kinderen jonger dan 2 jaar: zie rubriek "Bijzondere voorzichtigheid bij het gebruik van VERMOX is vereist".

Wanneer u een behandeling met VERMOX uitvoert, hoeft u geen speciaal dieet te volgen en geen laxemiddelen in te nemen.

Neem de tablet(ten) in met wat water. Schud de suspensie voor gebruik. De fles wordt als volgt geopend: druk de kunststof schroefdop naar beneden en draai tegelijkertijd tegen de klok in (zie afbeelding).

Als u bent vergeten VERMOX in te nemen  
Niet van toepassing

Als u bent gestopt met het innemen van VERMOX  
Niet van toepassing

Als u een grotere hoeveelheid VERMOX heeft ingenomen dan u zou moeten Als u te veel VERMOX heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (070/245.245). Het innemen van een te grote hoeveelheid VERMOX brengt geen grote gevaren met zich mee. In het ergste geval kunnen darmkrampen, braken en diarree of hoofdpijn en duizeligheid optreden. Bij langdurig gebruik van grote hoeveelheden kan er een verstoring van de leverfunctie optreden.

Als een van deze symptomen bij u optreedt, moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen. Het toedienen van actieve kool kan nuttig zijn.

#### 4. Welke bijwerkingen zijn mogelijk?

Zoals alle geneesmiddelen kan VERMOX bijwerkingen hebben.

VERMOX is goed verdragen en bij inname van de voorgeschreven hoeveelheden zijn nauwelijks bijwerkingen te verwachten. De volgende bijwerkingen kunnen echter af en toe optreden:

- Kortdurende maagpijn en diarree kunnen af en toe voorkomen, vooral als u een ernstige worminfectie heeft. In dat geval kunt u VERMOX volgens de instructies blijven innemen.
- Overgevoeligheid voor VERMOX komt zeer zelden voor. Dit kan zich uiten door bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, kortademigheid en een gezwollen gezicht. Als een van deze symptomen bij u optreedt, stop dan met het innemen van VERMOX en neem contact op met uw arts.
- In zeer zeldzame gevallen is een ernstige huidaandoening met huiduitslag, blaren op de huid en zweren in de mond, aan de ogen en in het genitale en anale gebied samen met koorts gemeld. Als u deze symptomen opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
- Zeer zelden kunnen convulsies (krampen) bij zuigelingen optreden. VERMOX mag alleen aan kinderen onder 1 jaar worden gegeven als uw arts het heeft voorgeschreven.
- Zeer zelden kunnen bij langdurig gebruik van VERMOX in doses die aanzienlijk hoger zijn dan de aanbevolen doses (d.w.z. veel hoger dan normaal voorgeschreven), problemen met betrekking tot bloed, lever en nieren optreden.

Informeer uw arts of apotheker als u bijwerkingen opmerkt die niet in deze bijsluiter staan vermeld en die u als ernstig ervaart.

#### 5. Hoe VERMOX moet worden bewaard

VERMOX wordt bij kamertemperatuur (15-30°C) en beschermd tegen licht bewaard.

VERMOX buiten het bereik van kinderen houden.

Vervaldatum

De afkorting "exp." op de verpakking betekent dat het geneesmiddel vervalst op de laatste dag van de maand die na de afkorting is vermeld (maand en jaar).

#### 6. Meer informatie

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### Aflevering

VERMOX tabletten en suspensie voor oraal gebruik zijn zonder recept verkrijgbaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in oktober 2004

Datum van goedkeuring van deze bijsluiter: juli 2006

Transtoyou