

## Ulotka VERMOX

Przeczytaj uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla Ciebie. Ten lek jest dostępny bez recepty. Aby osiągnąć najlepszy efekt leczenia, VERMOX musi być stosowany zgodnie z zaleceniami.

Zachowaj tę ulotkę. Może zechcesz przeczytać ją ponownie.

Zapytaj farmaceutę, jeśli potrzebujesz więcej informacji lub porady.

Jeśli objawy się pogorszą lub nie ustąpią po kilku dniach, musisz koniecznie skontaktować się z lekarzem.

Ta ulotka zawiera:

1. Co to jest VERMOX i w jakim celu się go stosuje?
2. Co należy wiedzieć przed zażyciem VERMOX?
3. Jak stosować VERMOX?
4. Jakie są możliwe działania niepożądane?
5. Jak przechowywać VERMOX?
6. Dalsze informacje

Nazwa leku

VERMOX 100 mg tabletki

VERMOX 20 mg/ml zawiesina doustna

Substancją czynną jest mebendazol.

Tabletki VERMOX zawierają 100 mg mebendazolu (R 17 635) na tabletkę.

Inne składniki: celuloza mikrokrystaliczna, talk, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa, sacharyna sodowa, stearynian magnezu, uwodorniony olej z nasion bawełny, olejek ze skórki pomarańczowej, dwutlenek krzemu, laurylosiarczan sodu, żółcień pomarańczowa S (E 110).

Zawiesina do podawania doustnego VERMOX zawiera 20 mg mebendazolu (R 17 635) na ml zawiesiny.

Inne składniki: celuloza mikrokrystaliczna, metyloceluloza, karboksymetyloceluloza sodowa, sacharoza, laurylosiarczan sodu, metyloparaben, propyloparaben, aromat bananowy, kwas cytrynowy, woda oczyszczona.

Podmiot odpowiedzialny

Janssen-Cilag n.v.

Roderveldlaan 1

B-2600 Berchem

Belgia

Producent

Tabletki

Janssen-Cilag S.p.A.

Via C. Janssen

I-04010 Borgo San Michele

Latina – Włochy

Zawiesina do podawania doustnego

Janssen Pharmaceutica N.V.  
Turnhoutseweg 30  
B-2340 Beerse  
Belgia

Numer zezwolenia  
VERMOX Tabletki: 1028 IS 162 F 3  
VERMOX Zawiesina doustna: 2 S 260 F 11

## 1. Co to jest VERMOX i w jakim celu się go stosuje?

Tabletki do podawania doustnego:

Tabletki są dostępne w blistrze zawierającym 6 tabletek.

Zawiesina doustna:

Zawiesina doustna jest dostępna w butelce z 30 ml roztworu do picia (z plastikową miarką na 5 ml).

VERMOX jest lekiem przeciwko zakażeniom robakami

VERMOX jest wskazany do leczenia zakażeń wywołanych przez jeden lub więcej gatunków robaków:

- Owsik (*Enterobius vermicularis*);
- Glista ludzka (*Ascaris lumbricoides*);
- Włosogłówka (*Trichuris trichuria*);
- Tęgoryjec (*Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*);
- Tasiemiec (*Taenia spp.*);
- Węgorek jelitowy (*Strongyloides stercoralis*).

## 2. Co należy wiedzieć przed zażyciem VERMOX?

VERMOX nie może być stosowany,

- jeśli jesteś nadwrażliwy (alergiczny) na mebendazol lub którykolwiek z pozostałych składników VERMOX. Ta nadwrażliwość może objawiać się wysypką, swędzeniem, dusznością i/lub obrzękiem twarzy. W takim przypadku przerwij leczenie i skontaktuj się z lekarzem.

Szczególna ostrożność jest wymagana podczas stosowania VERMOX,

- gdy jest podawany dzieciom poniżej 2 lat. VERMOX można podawać małym dzieciom poniżej 2 lat tylko wtedy, gdy infekcja pasożytnicza wyraźnie wpływa na stan odżywienia i rozwój fizyczny dziecka. W każdym przypadku najpierw skonsultuj się z lekarzem.
- jeśli przyjmujesz inne leki. Przeczytaj również sekcję "Przyjmowanie VERMOX z innymi lekami".

Przyjmowanie VERMOX z jedzeniem i napojami

Nie dotyczy

Ciąża

Zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach ciąży konieczne jest rozważenie korzyści z VERMOX w porównaniu z możliwymi zagrożeniami.

Przed przyjęciem jakichkolwiek leków skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

## Karmienie piersią

Podczas karmienia piersią musisz być ostrożny przy przyjmowaniu VERMOX.  
Przed przyjęciem jakichkolwiek leków skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

## Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

VERMOX nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn.

## Ważne informacje o niektórych innych składnikach VERMOX

Nie dotyczy

## Przyjmowanie VERMOX z innymi lekami

Proszę poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli przyjmujesz inne leki lub niedawno przyjmowałeś, nawet jeśli są to leki bez recepty.

- Jeśli jednocześnie przyjmujesz cymetydynę (lek na nadkwasotę), musisz to zgłosić lekarzowi. Podejmie on odpowiednie środki i dokona niezbędnych dostosowań dawki.
- Należy unikać jednoczesnego przyjmowania VERMOX i metronidazolu (leku przeciw infekcjom bakteryjnym i pierwotniakowym).

## 3. Jak przyjmować VERMOX?

Proszę dokładnie przestrzegać tych instrukcji, chyba że lekarz zalecił inaczej. W razie wątpliwości proszę zapytać lekarza lub farmaceutę.

Ilość VERMOX, którą musisz przyjąć, zależy od rodzaju robaka, którym jesteś zarażony. W razie wątpliwości proszę skonsultować się z lekarzem.

### 1. Owsiki (*Enterobius vermicularis*):

1 tabletkę lub 5 ml (= 1 miarka) roztworu doustnego.

Wszyscy członkowie rodziny muszą być leczeni jednocześnie, a leczenie to należy powtórzyć po 2 do 4 tygodniach (wszyscy członkowie rodziny ponownie przyjmują 1 tabletkę lub 5 ml roztworu doustnego). Jest to konieczne dla skutecznego leczenia: pierwsza dawka zabija wszystkie robaki, ale nie ich jaja, które mogą spowodować ponowną infekcję.

Dawkowanie dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych.

### 2. Glisty, włosogłówki, tęgoryjce i infekcje mieszane: 1 tabletkę lub 5 ml (= 1 miarka) roztworu doustnego rano i wieczorem przez trzy kolejne dni.

Dawkowanie dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych.

### 3. Tasiemce i węgorki jelitowe:

\* Dorośli:

2 do 3 tabletek lub 10 do 15 ml (= 2 do 3 miarek) roztworu doustnego rano i wieczorem przez trzy kolejne dni.

\* Dzieci powyżej 2 lat:

1 tabletkę lub 5 ml (= 1 miarka) roztworu doustnego rano i wieczorem przez trzy kolejne dni.

Dzieci poniżej 2 lat: patrz sekcja "Szczególna ostrożność przy stosowaniu VERMOX jest wymagana".

Podczas leczenia VERMOX nie musisz stosować specjalnej diety ani przyjmować środków przeczyszczających.

Tabletki należy przyjmować z niewielką ilością wody. Przed użyciem wstrząsnąć zawiesiną.

Butelkę otwiera się w następujący sposób: nacisnąć plastikową nakrętkę w dół i jednocześnie obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrz rysunek).

Jeśli zapomniałeś przyjąć VERMOX

Nie dotyczy

Jeśli przerwałeś przyjmowanie VERMOX

Nie dotyczy

Jeśli zażyłeś większą ilość VERMOX, niż powinieneś Jeśli zażyłeś zbyt dużo VERMOX, skontaktuj się niezwłocznie z lekarzem, farmaceutą lub centrum zatruc (070/245.245). Przyjęcie zbyt dużej ilości VERMOX nie stanowi dużego zagrożenia. W najgorszym przypadku mogą wystąpić skurcze jelit, wymioty i biegunka lub bóle głowy i zawroty głowy. Przy długotrwałym przyjmowaniu dużych ilości może dojść do zaburzenia funkcji wątroby. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy poinformować o tym lekarza. Podanie węgla aktywowanego może być korzystne.

#### 4. Jakie działania niepożądane są możliwe?

Jak wszystkie leki, VERMOX może powodować działania niepożądane.

VERMOX jest dobrze tolerowany i przy przyjmowaniu zalecanych ilości rzadko występują działania niepożądane. Jednakże, mogą czasami wystąpić następujące działania niepożądane:

- Krótkotrwałe bóle brzucha i biegunka mogą czasami wystąpić, zwłaszcza jeśli masz ciężką infekcję pasożytniczą. W takim przypadku możesz kontynuować przyjmowanie VERMOX zgodnie z instrukcjami.
- Nadwrażliwość na VERMOX występuje bardzo rzadko. Może się to objawiać na przykład wysypką skórą, swędzeniem, dusznością i obrzękiem twarzy. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, przerwij przyjmowanie VERMOX i skontaktuj się z lekarzem.
- W bardzo rzadkich przypadkach zgłaszano poważne choroby skóry z wysypką, pęcherzami na skórze i owrzodzeniami w jamie ustnej, na oczach oraz w okolicach genitaliów i odbytu wraz z gorączką. Jeśli zauważysz te objawy, skontaktuj się niezwłocznie z lekarzem.
- Bardzo rzadko mogą wystąpić drgawki u niemowląt. VERMOX może być podawany dzieciom poniżej 1 roku życia tylko wtedy, gdy lekarz go przepisał.
- Bardzo rzadko, przy długotrwałym przyjmowaniu VERMOX w dawkach znacznie przekraczających zalecane (tj. znacznie wyższych niż normalnie przepisywane), mogą wystąpić problemy dotyczące krwi, wątroby i nerek.

Poinformuj lekarza lub farmaceutę, jeśli zauważysz działania niepożądane, które nie są wymienione w tej ulotce i które uważasz za poważne.

#### 5. Jak przechowywać VERMOX

VERMOX przechowuje się w temperaturze pokojowej (15-30°C) i chroni przed światłem.

Przechowywać VERMOX w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Data ważności

Skrót "exp." na opakowaniu oznacza, że lek traci ważność z końcem miesiąca podanego po skrócie (miesiąc i rok).

#### 6. Dalsze informacje

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące stosowania tego leku, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

**Wydanie**

Tabletki i zawiesina do stosowania doustnego VERMOX są dostępne bez recepty.

Ulotka ta została ostatnio zaktualizowana w październiku 2004

Data zatwierdzenia tej ulotki: lipiec 2006

Transtoyou