

Folheto informativo VERMOX

Leia atentamente todo o folheto informativo, pois contém informações importantes para você.

Este medicamento está disponível sem receita médica. Para obter o melhor resultado no tratamento, no entanto, VERMOX deve ser utilizado conforme prescrito.

Guarde o folheto informativo. Talvez você queira lê-lo novamente mais tarde.

Consulte o seu farmacêutico se precisar de mais informações ou conselhos.

Se os seus sintomas piorarem ou não houver melhora após alguns dias, você deve consultar um médico.

Este folheto informativo inclui:

1. O que é VERMOX e para que é utilizado?
2. O que você deve saber antes de tomar VERMOX?
3. Como tomar VERMOX?
4. Quais são os possíveis efeitos colaterais?
5. Como armazenar VERMOX?
6. Mais informações

Nome do medicamento

VERMOX 100 mg comprimidos

VERMOX 20 mg/ml suspensão oral

O princípio ativo é o Mebendazol.

Os comprimidos de VERMOX contêm 100 mg de Mebendazol (R 17 635) por comprimido.

Outros componentes: celulose microcristalina, talco, amido de milho,

Carboximetilamido sódico, sacarina sódica, estearato de magnésio, óleo de semente de algodão hidrogenado, óleo de casca de laranja, dióxido de silício, laurilsulfato de sódio, amarelo laranja S (E 110).

VERMOX Suspensão oral contém 20 mg de Mebendazol (R 17 635) por ml de suspensão.

Outros componentes: celulose microcristalina, metilcelulose,

carboximetilcelulose de sódio, sacarose, laurilsulfato de sódio, metilparabeno, propilparabeno, aroma de banana, ácido cítrico, água purificada.

Titular da autorização de introdução no mercado

Janssen-Cilag n.v.

Roderveldlaan 1

B-2600 Berchem

Bélgica

Fabricante

Comprimidos

Janssen-Cilag S.p.A.

Via C. Janssen

I-04010 Borgo San Michele

Latina – Itália

Suspensão oral

Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Bélgica

Número de autorização
VERMOX Comprimidos: 1028 IS 162 F 3
VERMOX Suspensão oral: 2 S 260 F 11

1. O que é VERMOX e para que é utilizado?

Comprimidos para administração oral:

Os comprimidos estão disponíveis em uma embalagem blister com 6 comprimidos.

Suspensão oral:

A suspensão oral está disponível em um frasco com 30 ml de solução oral (com tampa dosadora de plástico para 5 ml).

VERMOX é um medicamento contra infecções por vermes

VERMOX é indicado para o tratamento de infecções por uma ou mais espécies de vermes:

- Oxiúro (*Enterobius vermicularis*);
- Lombriga (*Ascaris lumbricoides*);
- Tricurídeo (*Trichuris trichuria*);
- Ancilostomídeo (*Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*);
- Teníase (*Taenia* spp.);
- Estrongiloidíase (*Strongyloides stercoralis*).

2. O que você deve saber antes de tomar VERMOX?

VERMOX não deve ser tomado,

- se você for hipersensível (alérgico) ao Mebendazol ou a qualquer outro componente de VERMOX. Esta hipersensibilidade pode se manifestar por erupção cutânea, coceira, falta de ar e/ou inchaço no rosto. Neste caso, interrompa o tratamento e consulte seu médico.

É necessário ter cuidado especial ao tomar VERMOX,

- quando administrado a crianças menores de 2 anos. VERMOX só deve ser administrado a crianças pequenas menores de 2 anos se a infecção por vermes afetar significativamente o estado nutricional e o desenvolvimento físico da criança. Em qualquer caso, consulte primeiro o seu médico.
- se você estiver tomando outros medicamentos. Por favor, leia também a seção "Uso de VERMOX com outros medicamentos".

Uso de VERMOX com alimentos e bebidas

Não aplicável

Gravidez

Especialmente nos primeiros três meses de gravidez, é necessário avaliar os benefícios de VERMOX em relação aos possíveis riscos.

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Amamentação

Durante a amamentação, você deve ter cuidado ao tomar VERMOX.
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Capacidade de conduzir e operar máquinas
VERMOX não afeta a capacidade de conduzir veículos ou operar máquinas.

Informações importantes sobre certos outros componentes de VERMOX
Não aplicável

Uso de VERMOX com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar outros medicamentos ou se tomou recentemente, mesmo que sejam medicamentos sem receita médica.

- Se você estiver tomando simultaneamente Cimetidina (um medicamento para acidez estomacal), deve informar o seu médico. Ele tomará as medidas adequadas e fará os ajustes de dose necessários.
- A administração simultânea de VERMOX e Metronidazol (um medicamento contra infecções bacterianas e protozoárias) deve ser evitada.

3. Como tomar VERMOX?

Siga estas instruções exatamente, a menos que seu médico tenha prescrito algo diferente.
Por favor, pergunte ao seu médico ou farmacêutico se não tiver certeza.

A quantidade de VERMOX que você deve tomar depende do tipo de verme com o qual você está infectado. Se tiver dúvidas, por favor, consulte seu médico.

1. Oxiúros (*Enterobius vermicularis*):

1 único comprimido ou 5 ml (= 1 tampa dosadora) de solução oral.

Todos os membros da família devem ser tratados ao mesmo tempo e este tratamento deve ser repetido após 2 a 4 semanas (todos os membros da família tomam novamente 1 comprimido ou 5 ml de solução oral). Isso é necessário para um tratamento eficaz: a primeira dose mata todos os vermes, mas não seus ovos, que podem causar uma nova infecção.

A dosagem é válida tanto para crianças quanto para adultos.

2. *Ascaris*, *Trichuris*, *Ancilostomídeos* e infecções mistas: 1 comprimido ou 5 ml (= 1 tampa dosadora) de solução oral de manhã e à noite por três dias consecutivos.

A dosagem é válida tanto para crianças quanto para adultos.

3. *Tênias* e *Strongyloides*:

* Adultos:

2 a 3 comprimidos ou 10 a 15 ml (= 2 a 3 tampas dosadoras) de solução oral de manhã e à noite por três dias consecutivos.

* Crianças acima de 2 anos:

1 comprimido ou 5 ml (= 1 tampa dosadora) de solução oral de manhã e à noite por três dias consecutivos.

Crianças menores de 2 anos: veja a seção "Precauções especiais ao tomar VERMOX".

Ao realizar um tratamento com VERMOX, você não precisa seguir uma dieta especial nem tomar laxantes.

Tome o(s) comprimido(s) com um pouco de água. Agite a suspensão antes de usar. A garrafa é aberta da seguinte forma: pressione a tampa de plástico para baixo e gire no sentido anti-horário ao mesmo tempo (veja a ilustração).

Se você esquecer de tomar VERMOX
Não aplicável

Se você interrompeu a administração de VERMOX
Não aplicável

Se você tomou uma quantidade maior de VERMOX do que deveria Se você tomou muito VERMOX, entre em contato imediatamente com seu médico, farmacêutico ou com o centro de intoxicações (070/245.245). Tomar uma quantidade excessiva de VERMOX não apresenta grandes perigos. No pior dos casos, podem ocorrer cólicas intestinais, vômitos e diarreia ou dores de cabeça e tontura. O uso prolongado de grandes quantidades pode causar disfunção hepática.

Se algum desses sintomas ocorrer, você deve informar seu médico. A administração de carvão ativado pode ser benéfica.

4. Quais são os possíveis efeitos colaterais?

Como todos os medicamentos, o VERMOX pode causar efeitos colaterais.

VERMOX é bem tolerado e, quando tomado nas quantidades prescritas, raramente são esperados efeitos colaterais. No entanto, os seguintes efeitos colaterais podem ocorrer ocasionalmente:

- Dores de estômago de curta duração e diarreia podem ocorrer ocasionalmente, especialmente se você tiver uma infecção grave por vermes. Nesse caso, você pode continuar tomando VERMOX conforme as instruções.
- Hipersensibilidade ao VERMOX é muito rara. Isso pode se manifestar, por exemplo, por erupção cutânea, coceira, falta de ar e inchaço no rosto. Se algum desses sintomas ocorrer, interrompa a administração de VERMOX e entre em contato com seu médico.
- Em casos muito raros, foi relatada uma doença de pele grave com erupção cutânea, bolhas na pele e úlceras na boca, nos olhos, bem como na área genital e anal, acompanhadas de febre. Se você notar esses sintomas, entre em contato imediatamente com seu médico.
- Muito raramente, convulsões (espasmos) podem ocorrer em bebês. VERMOX só deve ser administrado a crianças menores de 1 ano se prescrito pelo médico.
- Muito raramente, o uso prolongado de VERMOX em doses muito superiores às recomendadas (ou seja, muito mais altas do que as normalmente prescritas) pode causar problemas relacionados ao sangue, fígado e rins.

Informe seu médico ou farmacêutico se você notar efeitos colaterais que não estão listados nesta bula e que você considera graves.

5. Como armazenar o VERMOX

VERMOX deve ser armazenado à temperatura ambiente (15-30°C) e protegido da luz. Mantenha VERMOX fora do alcance das crianças.

Data de validade

A abreviação "exp." na embalagem significa que o medicamento vence no último dia do mês indicado após a abreviação (mês e ano).

6. Mais informações

Se tiver mais perguntas sobre o uso deste medicamento, por favor, consulte o seu médico ou farmacêutico.

Dispensação

Os comprimidos e a suspensão oral de VERMOX estão disponíveis sem receita médica.

Este folheto informativo foi revisado pela última vez em outubro de 2004

Data de aprovação deste folheto informativo: julho de 2006

Transtoyou