

Bipacksedel VERMOX

Läs hela bipacksedeln noggrant, eftersom den innehåller viktig information för dig. Detta läkemedel är tillgängligt utan recept. För att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat måste VERMOX dock användas enligt föreskrifterna.

Spara bipacksedeln. Du kanske vill läsa den igen senare.

Fråga din apotekare om du behöver mer information eller råd.

Om dina symtom förvärras eller om det inte sker någon förbättring efter några dagar måste du definitivt uppsöka en läkare.

Denna bipacksedel innehåller:

1. Vad är VERMOX och vad används det för?
2. Vad behöver du veta innan du tar VERMOX?
3. Hur ska VERMOX tas?
4. Vilka biverkningar är möjliga?
5. Hur ska VERMOX förvaras?
6. Ytterligare information

Beteckning av läkemedlet

VERMOX 100 mg tabletter

VERMOX 20 mg/ml oral suspension

Den aktiva substansen är Mebendazol.

VERMOX tabletter innehåller 100 mg Mebendazol (R 17 635) per tablett.

Övriga ingredienser: mikrokristallin cellulosa, talk, majsstärkelse,

Karboximetylstärkelse-natrium, natriumsackarin, magnesiumstearat, hydrogenerad bomullsfröolja, apelsinskalolja, kiseldioxid, natriumlaurylsulfat, Gelborange S (E 110).

VERMOX oral suspension innehåller 20 mg mebendazol (R 17 635) per ml suspension.

Övriga ingredienser: mikrokristallin cellulosa, metylcellulosa,

natriumkarboximetylcellulosa, sackaros, natriumlaurylsulfat, metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat, bananarom, citronsyra, renat vatten.

Innehavare av godkännande för försäljning

Janssen-Cilag n.v.

Roderveldlaan 1

B-2600 Berchem

Belgien

Tillverkare

Tabletter

Janssen-Cilag S.p.A.

Via C. Janssen

I-04010 Borgo San Michele

Latina – Italien

Oral suspension

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse
Belgien

Godkännandenummer
VERMOX tabletter: 1028 IS 162 F 3
VERMOX suspension för oral användning: 2 S 260 F 11

1. Vad är VERMOX och vad används det för?

Tabletter för oral användning:

Tabletterna finns i en blisterförpackning med 6 tabletter.

Suspension för oral användning:

Suspensionen för oral användning finns i en flaska med 30 ml dricklösning (med doseringskåpa av plast för 5 ml).

VERMOX är ett medel mot maskinfektioner

VERMOX är indicerat för behandling av infektioner av en eller flera maskarter:

- Springmask (*Enterobius vermicularis*);
- Spolmask (*Ascaris lumbricoides*);
- Piskmask (*Trichuris trichuria*);
- Hakmask (Gravmask) (*Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*);
- Bandmask (*Taenia* spp.);
- Dvärgtrådmask (*Strongyloides stercoralis*).

2. Vad måste du beakta innan du tar VERMOX?

VERMOX får inte tas,

- om du är överkänslig (allergisk) mot mebendazol eller någon av de övriga beståndsdelarna i VERMOX. Denna överkänslighet kan visa sig genom hudutslag, klåda, andnöd och/eller svullet ansikte. Avbryt i så fall behandlingen och kontakta din läkare.

Särskild försiktighet vid intag av VERMOX är nödvändig,

- när det ges till barn under 2 år. VERMOX får endast ges till småbarn under 2 år om maskinfektionen tydligt påverkar barnets näringstillstånd och fysiska utveckling. Rådfråga alltid din läkare först.
- om du tar andra läkemedel. Läs även avsnittet "Intag av VERMOX tillsammans med andra läkemedel".

Vid intag av VERMOX tillsammans med mat och dryck
Inte tillämpligt

Graviditet

Framför allt under de första tre månaderna av graviditeten är det nödvändigt att väga fördelarna med VERMOX mot de möjliga riskerna.

Rådfråga din läkare eller apotekare innan du tar några läkemedel.

Amning

Under amning måste du vara försiktig med att ta VERMOX.

Rådfråga din läkare eller apotekare innan du tar några läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

VERMOX påverkar inte förmågan att köra fordon eller använda maskiner.

Viktig information om vissa andra ingredienser i VERMOX
Inte tillämpligt

Intag av VERMOX tillsammans med andra läkemedel
Informera din läkare eller apotekare om du tar andra läkemedel
eller nyligen har tagit, även om det gäller receptfria läkemedel.

- Om du samtidigt tar Cimetidin (ett läkemedel mot magsyra) måste du informera din läkare. Han kommer att vidta lämpliga åtgärder och göra nödvändiga dosjusteringar.
- Samtidig användning av VERMOX och Metronidazol (ett läkemedel mot bakterie- och protozoainfektioner) bör undvikas.

3. Hur ska VERMOX tas?

Följ dessa instruktioner noggrant, om inte din läkare har ordinerat något annat. Fråga din läkare eller apotekare om du är osäker.

Hur mycket VERMOX du behöver ta beror på vilken typ av mask du är infekterad med. Om du är osäker, fråga din läkare om råd.

1. Springmask (*Enterobius vermicularis*):

1 tablett eller 5 ml (= 1 doseringskapsyl) oral lösning.

Alla familjemedlemmar måste behandlas samtidigt och denna behandling måste upprepas efter 2 till 4 veckor (alla familjemedlemmar tar återigen 1 tablett eller 5 ml oral lösning). Detta är nödvändigt för en effektiv behandling: den första dosen dödar alla maskar, men inte deras ägg, som kan orsaka en ny infektion.

Doseringen gäller både för barn och vuxna.

2. Spolmaskar, piskmaskar, hakmaskar och blandinfektioner: 1 tablett eller 5 ml (= 1 doseringskapsyl) oral lösning morgon och kväll i tre på varandra följande dagar.

Doseringen gäller både för barn och vuxna.

3. Bandmaskar och dvärgpiskmaskar:

* Vuxna:

2 till 3 tabletter eller 10 till 15 ml (= 2 till 3 doseringskapsyler) oral lösning morgon och kväll i tre på varandra följande dagar.

* Barn över 2 år:

1 tablett eller 5 ml (= 1 doseringskapsyl) oral lösning morgon och kväll i tre på varandra följande dagar.

Barn under 2 år: se avsnittet "Särskild försiktighet vid användning av VERMOX krävs".

När du genomgår en behandling med VERMOX behöver du inte följa någon speciell diet och inte ta några laxermedel.

Ta tablett/tabletterna med lite vatten. Skaka suspensionen före användning. Flaskan öppnas på följande sätt: tryck ner plastskruvlocket och vrid samtidigt moturs (se bild).

Om du har glömt att ta VERMOX
Ej tillämpligt

Om du har avbrutit intaget av VERMOX
Ej tillämpligt

Om du har tagit en större mängd VERMOX än du borde Om du har tagit för mycket VERMOX, kontakta omedelbart din läkare, apotekare eller giftinformationscentralen (070/245.245).

Intag av en för stor mängd VERMOX medför inga stora faror. I värsta fall kan tarmkramp, kräkningar och diarré eller huvudvärk och yrsel uppstå. Vid långvarigt intag av stora mängder kan leverfunktionen störas.

Om något av dessa symtom uppträder hos dig, måste du informera din läkare. Administrering av aktivt kol kan vara till nytta.

4. Vilka biverkningar är möjliga?

Liksom alla läkemedel kan VERMOX ha biverkningar.

VERMOX är väl tolererat och vid intag av föreskrivna mängder förväntas knappt några biverkningar. Följande biverkningar kan dock ibland uppstå:

- Kortvariga magsmärtor och diarré kan ibland förekomma, särskilt om du har en allvarig maskinfektion. I detta fall kan du fortsätta ta VERMOX enligt anvisningarna.
- Överkänslighet mot VERMOX är mycket sällsynt. Detta kan uttryckas genom till exempel hudutslag, klåda, andfåddhet och ett svullet ansikte. Om något av dessa symtom uppträder hos dig, avbryt intaget av VERMOX och kontakta din läkare.
- I mycket sällsynta fall har en allvarig hudsjukdom med hudutslag, blåsor på huden och sår i munnen, på ögonen samt i genital- och analområdet tillsammans med feber rapporterats. Om du märker dessa symtom, kontakta omedelbart din läkare.
- Mycket sällan kan kramp uppträda hos spädbarn. VERMOX får endast ges till barn under 1 år om din läkare har ordinerat det.
- Mycket sällan kan vid långvarigt intag av VERMOX i doser som ligger betydligt över de rekommenderade doserna (dvs. mycket högre än de normalt ordinerade) problem med blod, lever och njurar uppstå.

Informera din läkare eller apotekare om du märker biverkningar som inte anges i denna bipacksedel och som du upplever som allvarliga.

5. Hur VERMOX ska förvaras

VERMOX förvaras vid rumstemperatur (15-30°C) och skyddas från ljus. Förvara VERMOX oåtkomligt för barn.

Utgångsdatum

Förkortningen "exp." på förpackningen betyder att läkemedlet går ut den sista dagen i månaden som anges efter förkortningen (månad och år).

6. Ytterligare information

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, vänligen kontakta din läkare eller apotekare.

Utleverans

VERMOX tabletter och oral suspension är receptfria.

Denna bipacksedel uppdaterades senast i oktober 2004

Godkännandedatum för denna bipacksedel: juli 2006