

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

VIAGRA 25 mg Comprimidos recubiertos con película
VIAGRA 50 mg Comprimidos recubiertos con película
VIAGRA 100 mg Comprimidos recubiertos con película
Citrato de sildenafil

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento.

- Conserve el prospecto. Puede que desee leerlo nuevamente más tarde.
- Si tiene más preguntas, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado personalmente. No lo dé a otras personas.
- Puede perjudicar a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted.
- Si alguno de los efectos secundarios le afecta gravemente o si nota efectos secundarios no mencionados en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Este prospecto contiene:

1. ¿Qué es VIAGRA y para qué se utiliza?
2. ¿Qué necesita saber antes de tomar VIAGRA?
3. ¿Cómo se toma VIAGRA?
4. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?
5. ¿Cómo se debe conservar VIAGRA?
6. Información adicional

1. ¿QUÉ ES VIAGRA Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

VIAGRA pertenece a un grupo de medicamentos llamados inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5). Actúa al ayudar a relajar los vasos sanguíneos de su pene durante la excitación sexual. Esto permite que la sangre fluya más fácilmente hacia el pene. VIAGRA solo le ayudará a lograr una erección si está sexualmente estimulado. No debe tomar VIAGRA si no padece disfunción eréctil. Las mujeres no deben tomar VIAGRA.

VIAGRA se utiliza para tratar la disfunción eréctil en hombres, a veces también llamada impotencia. Esto ocurre cuando un hombre no puede lograr o mantener un pene erecto lo suficientemente duro para la actividad sexual.

2. ¿QUÉ DEBE TENER EN CUENTA ANTES DE TOMAR VIAGRA?

No debe tomar VIAGRA,

- si está tomando medicamentos llamados nitratos, ya que la combinación puede causar una disminución potencialmente peligrosa de su presión arterial. Hable con su médico si está tomando alguno de estos medicamentos, que a menudo se recetan para aliviar los síntomas de la angina de pecho (o "dolor de corazón"). Si no está seguro, consulte a su médico o farmacéutico.

- si está tomando medicamentos conocidos como donadores de óxido nítrico, como el nitrito de amilo (también llamados "poppers"), ya que esta combinación también puede causar una disminución potencialmente peligrosa de su presión arterial.
- si es alérgico (hipersensible) al sildenafil o a cualquiera de los otros componentes de VIAGRA.
- si tiene una enfermedad grave del corazón o del hígado.
- si ha tenido recientemente un accidente cerebrovascular o un ataque al corazón, o si tiene presión arterial baja.
- si tiene ciertas enfermedades oculares hereditarias raras (como la retinitis pigmentosa).
- si tiene o ha tenido pérdida de visión debido a una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION).

Se requiere especial precaución al tomar VIAGRA

Hable con su médico,

- si tiene anemia de células falciformes (alteración de los glóbulos rojos), leucemia (cáncer de sangre) o mieloma múltiple (cáncer de médula ósea). En estos casos, puede ser necesaria una precaución especial al tomar medicamentos para tratar la disfunción eréctil.
- si tiene una deformación de su pene o enfermedad de Peyronie.
- si tiene problemas cardíacos. Su médico debe verificar cuidadosamente si su corazón puede soportar el esfuerzo adicional del acto sexual.
- si actualmente tiene una úlcera gastrointestinal, o si hay un trastorno de la coagulación sanguínea (como la hemofilia).
- si nota una disminución repentina o pérdida de la visión, suspenda el tratamiento con VIAGRA y notifique inmediatamente a un médico.

No debe usar VIAGRA al mismo tiempo que otros tratamientos orales o locales para la disfunción eréctil.

Consideraciones especiales para niños y adolescentes

VIAGRA no debe ser tomado por personas menores de 18 años.

Consideraciones especiales para pacientes con enfermedades renales o hepáticas

Debe informar a su médico si tiene una disfunción renal o hepática. Su médico decidirá si necesita una dosis más baja.

Uso de VIAGRA con otros medicamentos

Por favor, informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso si se trata de medicamentos sin receta.

Las tabletas recubiertas de VIAGRA y algunos medicamentos pueden influirse mutuamente, especialmente aquellos utilizados para tratar el dolor de corazón. En una emergencia médica, debe informar al personal médico que lo atiende que ha tomado VIAGRA y cuándo lo tomó. No tome VIAGRA durante el tratamiento con otros medicamentos a menos que su médico le indique expresamente que puede hacerlo.

No debe tomar VIAGRA si está tomando medicamentos llamados nitratos, ya que la combinación de estos medicamentos puede causar una disminución potencialmente peligrosa de su presión arterial. Hable con su médico o farmacéutico si está tomando alguno de estos medicamentos, que a menudo se recetan para aliviar los síntomas de la angina de pecho (o "dolor de corazón").

No debe tomar VIAGRA si está tomando medicamentos conocidos como donadores de óxido nítrico, como el nitrito de amilo (también llamado "Poppers"), ya que esta combinación también puede causar una disminución potencialmente peligrosa de su presión arterial.

Si está tomando medicamentos conocidos como inhibidores de la proteasa, utilizados para tratar la infección por VIH, su médico puede comenzar el tratamiento con la dosis más baja de VIAGRA (25 mg).

En algunos pacientes que toman alfabloqueantes para tratar la hipertensión o el agrandamiento de la próstata, puede ocurrir mareo y aturdimiento, que pueden ser causados por una presión arterial demasiado baja al sentarse o levantarse rápidamente. Algunos pacientes experimentaron estos síntomas cuando usaron VIAGRA junto con alfabloqueantes.

Esto generalmente ocurre dentro de las 4 horas posteriores a la toma de VIAGRA. Para reducir la probabilidad de que experimente estos síntomas, debe tomar su alfabloqueante en una dosis diaria regular antes de tomar VIAGRA. En tal caso, su médico puede recetarle una dosis inicial más baja de VIAGRA (25 mg).

Uso de VIAGRA con alimentos y bebidas

VIAGRA puede tomarse con o sin alimentos. Sin embargo, puede notar que tarda más en hacer efecto si lo toma con una comida abundante.

El consumo de alcohol puede reducir temporalmente la capacidad de lograr una erección. Para obtener el máximo beneficio de su medicamento, no debe beber cantidades excesivas de alcohol antes de tomar VIAGRA.

Embarazo y lactancia

VIAGRA no está destinado para uso en mujeres.

Capacidad para conducir y manejar máquinas

VIAGRA puede causar mareos y afectar la visión. Asegúrese de cómo reacciona a la toma de VIAGRA antes de conducir o manejar máquinas.

Información importante sobre ciertos otros componentes de VIAGRA

Por favor, tome VIAGRA solo después de consultar a su médico si sabe que tiene intolerancia a ciertos azúcares, como la lactosa.

3. ¿CÓMO TOMAR VIAGRA?

Tome VIAGRA siempre exactamente como le indique su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si no está seguro. A menos que su médico le indique lo contrario, la dosis inicial habitual es de 50 mg.

No tome VIAGRA más de una vez al día.

Debe tomar VIAGRA aproximadamente una hora antes de la actividad sexual prevista. Trague el comprimido sin masticar y beba un vaso de agua.

Hable con su médico o farmacéutico si tiene la impresión de que el efecto de VIAGRA es demasiado fuerte o demasiado débil.

VIAGRA solo le ayudará a lograr una erección si está sexualmente estimulado. El tiempo hasta que VIAGRA hace efecto varía de un paciente a otro, generalmente es de media a una hora. Puede notar que VIAGRA tarda más en hacer efecto si lo toma con una comida abundante.

Debe informar a su médico si VIAGRA no le provoca una erección o si la erección no dura lo suficiente para completar el acto sexual.

Si ha tomado más VIAGRA de lo que debería

Los efectos secundarios pueden ser más frecuentes y graves. Dosis superiores a 100 mg no aumentan la eficacia.

No tome una dosis mayor que la que le ha recetado su médico.

Si ha tomado más comprimidos de los que le recetó su médico, informe a su médico.

Si tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

4. ¿QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS SON POSIBLES?

Al igual que todos los medicamentos, VIAGRA puede tener efectos secundarios, pero no necesariamente ocurren en todos los casos. Los efectos secundarios asociados con Viagra suelen ser leves a moderados y de corta duración.

Si experimenta dolor en el pecho durante o después de la actividad sexual:

- Adopte una posición semi-sentada e intente relajarse.
- No use nitratos para tratar su dolor en el pecho.
- Notifique a su médico de inmediato.

Todos los medicamentos, incluido VIAGRA, pueden causar reacciones alérgicas. Informe a su médico de inmediato si después de tomar VIAGRA experimenta alguno de los siguientes síntomas: respiración sibilante repentina, dificultad para respirar o mareos, hinchazón de los párpados, la cara, los labios o la garganta.

Se han reportado erecciones prolongadas y a veces dolorosas después de tomar

VIAGRA. Si experimenta una erección de más de 4 horas, debe consultar a un médico de inmediato.

Si nota un deterioro repentino o pérdida de la visión, deje de tomar VIAGRA y contacte a su médico de inmediato.

Un efecto secundario muy común (puede ocurrir en 1 de cada 10 pacientes) son los dolores de cabeza.

Efectos secundarios comunes (pueden ocurrir en 1 a 10 de cada 100 pacientes) son: enrojecimiento facial, indigestión, alteraciones de la visión (incluyendo alteraciones en la percepción del color, sensibilidad a la luz, visión borrosa o disminución de la agudeza visual), congestión nasal y mareos.

Efectos secundarios ocasionales (pueden ocurrir en 1 a 10 de cada 1000 pacientes) son: vómitos, erupciones cutáneas, hemorragia en el fondo del ojo, irritación ocular, ojos inyectados de sangre/rojos, dolor ocular, visión doble, sensación anormal en el ojo, latidos cardíacos irregulares o acelerados, dolor muscular, somnolencia, disminución de la sensibilidad táctil, vértigo, zumbido en los oídos, náuseas, boca seca, dolor en el pecho y fatiga.

Efectos secundarios raros (pueden ocurrir en 1 a 10 de cada 10,000 pacientes) son: hipertensión, presión arterial baja, desmayos, accidentes cerebrovasculares, hemorragias nasales y pérdida repentina de la audición o sordera.

Otros efectos secundarios reportados después de la comercialización incluyen: palpitaciones, dolor en el pecho, muertes súbitas, ataques cardíacos o trastornos temporales de la circulación cerebral. La mayoría, pero no todos, de estos hombres tenían enfermedades cardíacas antes de tomar este medicamento. No es posible determinar si estos eventos están directamente relacionados con VIAGRA. Se han reportado casos de convulsiones o ataques epilépticos, así como reacciones cutáneas graves con erupciones, ampollas, descamación de la piel y dolor, que requieren atención médica inmediata.

Por favor, informe a su médico o farmacéutico si alguno de los efectos secundarios le afecta significativamente o si nota efectos secundarios que no están indicados en este prospecto.

5. ¿CÓMO DEBE ALMACENARSE VIAGRA?

Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños.

No almacenar a más de 30 °C.

Conservar en el envase original para protegerlo de la humedad.

No utilice el medicamento después de la fecha de caducidad indicada en el cartón exterior. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes.

El medicamento no debe desecharse por el desagüe ni con los residuos domésticos. Pregunte a su farmacéutico cómo desechar el medicamento cuando ya no lo necesite. Esta medida ayuda a proteger el medio ambiente.

6. MÁS INFORMACIÓN

Qué contiene VIAGRA

- El principio activo es sildenafil. Cada tableta contiene 25 mg, 50 mg o 100 mg de sildenafil (como citrato).
- Los demás componentes son:
Núcleo de la tableta: celulosa microcristalina, fosfato de calcio hidrógeno, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio
Recubrimiento de la película: hipromelosa, dióxido de titanio (E171), lactosa, triacetina, indigotina sal de aluminio (E132)

Cómo es VIAGRA y contenido del envase

Las tabletas recubiertas de VIAGRA son azules, redondeadas y en forma de rombo. Están marcadas en un lado con "PFIZER" y en el otro con "VGR 25", "VGR 50" o "VGR 100". Las tabletas están disponibles en envases blíster de 2, 4, 8 o 12 tabletas (25 mg, 50 mg o 100 mg) o en tarjetas blíster (50 mg). Es posible que no todas las presentaciones estén comercializadas en su país.

Titular de la autorización de comercialización y fabricante

El titular de la autorización de comercialización de VIAGRA es Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Reino Unido.

El fabricante de VIAGRA es Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Francia.

Si desea más información sobre el medicamento, póngase en contacto con el representante local del titular de la autorización de comercialización.

Bélgica

Pfizer S.A./ N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Luxemburgo

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Bulgaria

Pfizer Luxemburgo SARL, Sucursal Bulgaria

Tel.: +359 2 970 4333

Hungría

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00

República Checa

Pfizer s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel: +356 21 22 01 74

Dinamarca

Pfizer ApS

Países Bajos

Pfizer bv

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Alemania
Pfizer Pharma GmbH
Tel: +49 (0)30 550055 51000

Noruega
Pfizer AS
Tlf: +47 67 52 61 00

Estonia
Pfizer Luxembourg SARL, Eesti filiaal
Tel: +372 6 405 328

Austria
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0

Grecia
Pfizer Hellas A.E.
Τηλ: +30 210 6785800

Polonia
Pfizer Polska Sp. z o.o.,
Tel.: +48 22 335 61 00

España
Pfizer S.A.
Tel: +34 91 490 99 00

Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel: +351 21 423 5500

Francia
Pfizer
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Rumanía
Pfizer România S.R.L.
Tel: +40 (0)21 207 28 00

Irlanda
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363 (llamada gratuita)
áreas
Tel: +44 (0)1304 616161

Eslovenia
Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer,
sucursal para asesoramiento en
actividades farmacéuticas, Liubliana
Tel: + 386(0)152 11 400

Islandia
Vistor hf.
Tel: + 354 535 7000

República Eslovaca
Pfizer Luxembourg SARL, organización
componente
Tel: +421-2-3355 5500

Italia
Pfizer Italia S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Finlandia
Pfizer Oy
Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

Chipre
GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD,
Τηλ: +35722818087

Suecia
Pfizer AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel: +371 670 35 775

Reino Unido
Pfizer Limited
Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL, filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000

Esta información de uso fue aprobada por última vez en 07/2010

Información detallada sobre VIAGRA está disponible en el sitio web de la Agencia Europea de Medicamentos <http://www.ema.europa.eu> disponible.

Transtoyou