

## BRUKSINFORMASJON: INFORMASJON FOR BRUKEREN

VIAGRA 25 mg filmdrasjerte tabletter  
VIAGRA 50 mg filmdrasjerte tabletter  
VIAGRA 100 mg filmdrasjerte tabletter  
Sildenafilcitrat

Les hele pakningsvedlegget nøye før du begynner å ta dette legemidlet.

- Oppbevar pakningsvedlegget. Du kan ha behov for å lese det igjen senere.
- Hvis du har flere spørsmål, vennligst kontakt legen din eller apoteket.
- Dette legemidlet er forskrevet til deg personlig. Ikke gi det videre til andre.
- Det kan skade andre, selv om de har de samme symptomene som deg.
- Hvis noen av bivirkningene påvirker deg betydelig, eller hvis du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, vennligst informer legen din eller apoteket.

Dette pakningsvedlegget inneholder:

1. Hva er VIAGRA og hva brukes det til?
2. Hva må du vite før du tar VIAGRA?
3. Hvordan skal VIAGRA tas?
4. Hvilke bivirkninger er mulige?
5. Hvordan skal VIAGRA oppbevares?
6. Ytterligere informasjon

### 1. HVA ER VIAGRA OG HVA BRUKES DET TIL?

VIAGRA tilhører en gruppe legemidler kalt fosfodiesterase type 5 (PDE5)-hemmere. (PDE5)-hemmere. Det virker ved å støtte avslapningen av blodårene i penis under seksuell opphisselse. Dette gjør at blod lettere kan strømme inn i penis. VIAGRA vil bare hjelpe deg med å få en ereksjon hvis du er seksuelt stimulert. Du skal ikke ta VIAGRA hvis du ikke lider av erektil dysfunksjon. Kvinner skal ikke ta VIAGRA.

VIAGRA brukes til behandling av erektil dysfunksjon hos menn, som noen ganger også kalles impotens. Dette oppstår når en mann ikke kan få eller opprettholde en tilstrekkelig hard, oppreist penis for seksuell aktivitet.

### 2. HVA MÅ DU VITE FØR DU TAR VIAGRA?

VIAGRA skal ikke tas

- hvis du tar legemidler som kalles nitrater, da kombinasjonen kan føre til en potensielt farlig senking av blodtrykket ditt. Snakk med legen din hvis du tar noen av disse legemidlene, som ofte foreskrives for å lindre symptomer på angina pectoris (eller «hjertesmerter»). Hvis du er usikker, spør legen din eller apoteket.
- hvis du tar legemidler kjent som nitrogenoksid-donorer, som amylnitritt (også kalt «poppers»), da også denne kombinasjonen kan føre til en potensielt farlig senking av blodtrykket ditt.

- hvis du er allergisk (overfølsom) overfor sildenafil eller noen av de andre innholdsstoffene i VIAGRA.
- hvis du har en alvorlig hjerte- eller leversykdom.
- hvis du nylig har hatt et slag eller hjerteinfarkt, eller hvis du har lavt blodtrykk.
- hvis du har visse sjeldne arvelige øyesykdommer (som retinitis pigmentosa).
- hvis du har eller har hatt synstap på grunn av ikke-arteriell fremre iskemisk optikusnevropati (NAION).

Spesiell forsiktighet ved bruk av VIAGRA er nødvendig  
Snakk med legen din

- hvis du har sigdcelleanemi (endring av de røde blodcellene), leukemi (blodkreft) eller multippelt myelom (benmargskreft). I disse tilfellene kan spesiell forsiktighet ved bruk av legemidler for behandling av erektil dysfunksjon være nødvendig.
- hvis du har en deformasjon av penis eller Peyronies sykdom.
- hvis du har hjerteproblemer. Legen din skal i dette tilfellet nøye vurdere om hjertet ditt tåler den ekstra belastningen ved samleie.
- hvis du for tiden har et mage-tarm-sår, eller hvis det foreligger en forstyrrelse i blodkoagulasjonen (som for eksempel hemofili).
- hvis du merker en plutselig reduksjon eller tap av synet, avbryt behandlingen med VIAGRA og kontakt lege umiddelbart.

Du må ikke bruke VIAGRA samtidig med andre orale eller lokale behandlinger for erektil dysfunksjon.

Spesielle hensyn for barn og ungdom  
VIAGRA skal ikke tas av personer under 18 år.

Spesielle hensyn for pasienter med nyre- eller leversykdommer  
Du bør informere legen din hvis du har en funksjonsforstyrrelse i nyrene eller leveren. Legen din vil avgjøre om du trenger en lavere dosering.

Ved inntak av VIAGRA med andre legemidler  
Vennligst informer legen din eller apoteket hvis du tar andre legemidler eller nylig har tatt noen, selv om det er reseptfrie legemidler.

VIAGRA filmdrasjerte tabletter og noen legemidler kan påvirke hverandre, spesielt de som brukes til behandling av hjertesmerter. Ved en medisinsk nødsituasjon bør du informere helsepersonellet som behandler deg om at du har tatt VIAGRA og når du tok det. Ikke ta VIAGRA under behandling med andre legemidler med mindre legen din uttrykkelig sier at du kan gjøre det.

Du må ikke ta VIAGRA hvis du tar legemidler som kalles nitrater, da kombinasjonen av disse legemidlene kan forårsake en potensielt farlig reduksjon i blodtrykket ditt. Snakk med legen din eller apoteket hvis du tar noen av disse legemidlene, som ofte foreskrives for å lindre symptomer på angina pectoris (eller 'hjertesmerter').

Du må ikke ta VIAGRA hvis du tar legemidler kjent som nitrogenoksid-donorer, som amylnitritt (også kalt 'poppers'), da også denne kombinasjonen kan forårsake en potensielt farlig reduksjon i blodtrykket ditt.

Hvis du tar legemidler kjent som proteasehemmere, som brukes til behandling av HIV-infeksjon, vil legen din muligens starte behandlingen med den laveste VIAGRA-dosen (25 mg).

Hos noen pasienter som tar alfablokkere for behandling av høyt blodtrykk eller forstørret prostata, kan det oppstå svimmelhet og ørhet, som kan være forårsaket av lavt blodtrykk ved rask oppreisning eller oppreising. Noen pasienter har hatt slike symptomer når de brukte VIAGRA sammen med alfablokkere.

Dette oppstår vanligvis innen 4 timer etter inntak av VIAGRA. For å redusere sannsynligheten for at slike symptomer oppstår hos deg, bør du ta alfablokkeren din i en regelmessig daglig dose før du tar VIAGRA. Legen din vil i et slikt tilfelle muligens foreskrive en lavere startdose (25 mg) VIAGRA.

Ved inntak av VIAGRA sammen med mat og drikke VIAGRA kan tas med eller uten mat. Du vil imidlertid kanskje oppdage at det tar lengre tid før VIAGRA virker hvis du tar det med et tungt måltid.

Alkoholinntak kan midlertidig redusere evnen til å oppnå en ereksjon. For å få best mulig nytte av legemidlet ditt, bør du ikke drikke store mengder alkohol før du tar VIAGRA.

#### Graviditet og amming

VIAGRA er ikke beregnet for bruk hos kvinner.

#### Kjøring og bruk av maskiner

VIAGRA kan forårsake svimmelhet og påvirke synet. Vær oppmerksom på hvordan du reagerer på inntak av VIAGRA før du kjører bil eller bruker maskiner.

#### Viktig informasjon om visse andre bestanddeler i VIAGRA

Vennligst ta VIAGRA kun etter samråd med legen din hvis du vet at du har en intoleranse overfor visse sukkerarter, som for eksempel laktose.

### 3. HVORDAN DU BRUKER VIAGRA

Ta alltid VIAGRA nøyaktig som anvist av legen din. Spør legen din eller apoteket hvis du er usikker. Med mindre annet er foreskrevet av legen, er den vanlige startdosen 50 mg.

Ta ikke VIAGRA oftere enn én gang om dagen.

Du bør ta VIAGRA omtrent en time før planlagt samleie. Svelg tabletten hel og drikk et glass vann til.

Vennligst snakk med legen din eller apoteket hvis du har inntrykk av at effekten av VIAGRA er for sterk eller for svak.

VIAGRA vil kun hjelpe deg med å få en ereksjon hvis du er seksuelt stimulert. Tiden det tar før VIAGRA virker, varierer fra pasient til pasient, men er vanligvis mellom en halv til en time. Du vil muligens oppdage at det tar lengre tid før VIAGRA virker hvis du tar det med et tungt måltid.

Du bør informere legen din hvis VIAGRA ikke gir deg en ereksjon eller hvis ereksjonen ikke varer lenge nok til å fullføre samleiet.

Hvis du har tatt en større mengde VIAGRA enn du burde  
Bivirkninger kan forekomme oftere og være mer alvorlige. Doser over 100 mg øker ikke effekten.

Ta ikke en høyere dose enn den legen din har foreskrevet.

Hvis du har tatt flere tabletter enn legen din har foreskrevet, kontakt legen din.

Hvis du har flere spørsmål om bruken av legemidlet, spør legen din eller apoteket.

#### 4. Hvilke bivirkninger er mulige?

Som alle legemidler kan VIAGRA ha bivirkninger, men de oppstår ikke hos alle. Bivirkningene som er beskrevet i forbindelse med Viagra, er vanligvis milde til moderate og av kort varighet.

Hvis du opplever bryst smerter under eller etter samleie:

- Innta en halvsittende stilling og prøv å slappe av.
- Bruk ikke nitrater for å behandle bryst smerter.
- Kontakt legen din umiddelbart.

Alle legemidler, inkludert VIAGRA, kan forårsake allergiske reaksjoner. Kontakt legen din umiddelbart hvis du etter inntak av VIAGRA opplever noen av følgende symptomer: plutselig pipende pust, pustevansker eller svimmelhet, hevelse i øyelokkene, ansiktet, leppene eller halsen.

Overdreven langvarige og noen ganger smertefulle ereksjoner har blitt rapportert etter inntak av VIAGRA. Hvis du har en slik ereksjon som varer mer enn 4 timer, bør du umiddelbart oppsøke lege.

Hvis du opplever en plutselig forverring eller tap av synet, skal du ikke ta VIAGRA mer og kontakte legen din umiddelbart.

En svært vanlig bivirkning (kan forekomme hos 1 av 10 pasienter) er hodepine.

Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos 1 til 10 av 100 pasienter) er: ansiktsrødme, fordøyelsesbesvær, påvirkning av synet (inkludert fargeforstyrrelser, lysfølsomhet, uklart syn eller redusert synsskarphet), tett nese og svimmelhet.

Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos 1 til 10 av 1000 pasienter) er: oppkast, hudutslett, blødning i bakgrunnen av øynene, øyeirritasjon, blodskutte/røde øyne, øyensmerter, dobbeltsyn, unormal følelse i øyet, uregelmessig hjerterytme eller hjertebank, muskelsmerter, døsighet, redusert følelse, svimmelhet, øresus, kvalme, tørr munn, brystmerter og tretthet.

Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos 1 til 10 av 10.000 pasienter) er: høyt blodtrykk, lavt blodtrykk, besvimelse, slag, neseblod og plutselig hørselstap eller døvhets.

Andre bivirkninger som er beskrevet etter markedsføringserfaring, inkluderer: hjertebank, brystmerter, plutselige dødsfall, hjerteinfarkt eller forbigående sirkulasjonsforstyrrelser i hjernen. De fleste, men ikke alle, av disse mennene hadde hjertesykdommer før de tok dette legemidlet. Det er ikke mulig å vurdere om disse hendelsene er direkte relatert til VIAGRA. Det har også blitt rapportert om tilfeller av kramper eller anfall samt alvorlige hudreaksjoner med utslett, blemmer, hudavskalling og smerter som krever umiddelbar medisinsk behandling.

Informér legen din eller apoteket hvis noen av de oppførte bivirkningene påvirker deg betydelig, eller hvis du merker bivirkninger som ikke er angitt i denne pakningsvedlegget.

## 5. HVORDAN OPPBEVARES VIAGRA?

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Bruk ikke legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen refererer til den siste dagen i måneden.

Legemidlet skal ikke kastes i avløpsvann eller husholdningsavfall. Spør apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

## 6. Ytterligere informasjon

Hva VIAGRA inneholder

- Virkestoffet er Sildenafil. Hver tablett inneholder 25 mg, 50 mg eller 100 mg Sildenafil (som citrat).
- De andre innholdsstoffene er:  
Tablettkjerne: MikrokrySTALLinsk cellulose, kalsiumhydrogenfosfat, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat  
Filmdrasjering: Hypromellose, titandioksid (E171), laktose, triacetin, indigokarminaluminiumsalt (E132)

Hvordan VIAGRA ser ut og innholdet i pakningen

VIAGRA filmdrasjerte tabletter er blå, avrundede, diamantformede tabletter. De er merket med «PFIZER» på den ene siden og «VGR 25», «VGR 50» eller «VGR 100» på den andre siden. Tablettene finnes i blisterpakninger med 2, 4, 8 eller 12 tabletter (25 mg, 50 mg eller 100 mg) eller som blisterkort (50 mg). Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført i ditt land.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og produsent

Innehaver av markedsføringstillatelsen for VIAGRA er Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Storbritannia.

Produsent av VIAGRA er Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrike.

For ytterligere informasjon om legemidlet, vennligst kontakt den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

Belgia  
Pfizer S.A./ N.V.  
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Luxembourg  
Pfizer S.A.  
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Bulgaria  
Pfizer Luxembourg SARL, Filial Bulgaria  
Tel.: +359 2 970 4333

Ungarn  
Pfizer Kft.  
Tel.: + 36 1 488 37 00

Tsjekkia  
Pfizer s.r.o.  
Tel: +420-283-004-111

Malta  
V.J. Salomone Pharma Ltd.  
Tel: +356 21 22 01 74

Danmark  
Pfizer ApS  
Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland  
Pfizer bv  
Tel: +31 (0)10 406 43 01

Tyskland  
Pfizer Pharma GmbH  
Tel: +49 (0)30 550055 51000

Norge  
Pfizer AS  
Tlf: +47 67 52 61 00

Estland  
Pfizer Luxembourg SARL, Eesti filiaal  
Tel: +372 6 405 328

Østerrike  
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.  
Tel: +43 (0)1 521 15-0

Hellas  
Pfizer Hellas A.E.  
Τηλ: +30 210 6785800

Polen  
Pfizer Polska Sp. z o.o.,  
Tel.: +48 22 335 61 00

Spania  
Pfizer S.A.  
Tel: +34 91 490 99 00

Portugal  
Laboratórios Pfizer, Lda.  
Tel: +351 21 423 5500

Frankrike  
Pfizer  
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Romania  
Pfizer România S.R.L.  
Tel: +40 (0)21 207 28 00

Irland  
Pfizer Healthcare Ireland  
Tel: 1800 633 363 (gratisnummer)  
Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenia  
Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer,  
filial for rådgivning områder  
farmasøytiske aktiviteter, Ljubljana  
Tel: + 386(0)152 11 400

Island  
Vistor hf.  
Tel: + 354 535 7000

Den slovakiske republikk  
Pfizer Luxembourg SARL, organisasjon  
komponent  
Tel: +421-2-3355 5500

Italia  
Pfizer Italia S.r.l.  
Tel: +39 06 33 18 21

Finland  
Pfizer Oy  
Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

Kypros  
GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD,  
Τηλ: +35722818087

Sverige  
Pfizer AB  
Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija  
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā  
Tel: +371 670 35 775

United Kingdom  
Pfizer Limited  
Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva  
Pfizer Luxembourg SARL, filialas Lietuvoje  
Tel. +3705 2514000  
Denne bruksinformasjonen ble sist godkjent i 07/2010

Detaljert informasjon om VIAGRA er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret <http://www.ema.europa.eu> tilgjengelig.