

BRUKSANVISNING: INFORMATION FÖR ANVÄNDAREN

VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter
VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter
VIAGRA 100 mg filmdragerade tabletter
Sildenafilcitrat

Läs hela bipacksedeln noggrant innan du börjar ta detta läkemedel.

- Spara bipacksedeln. Du kanske vill läsa den igen senare.
- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra.
- Det kan skada andra, även om de har samma symtom som du.
- Om någon av de biverkningar som nämns påverkar dig avsevärt eller om du märker biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, informera din läkare eller apotekspersonal.

Denna bipacksedel innehåller:

1. Vad är VIAGRA och vad används det för?
2. Vad behöver du veta innan du tar VIAGRA?
3. Hur ska VIAGRA tas?
4. Vilka biverkningar är möjliga?
5. Hur ska VIAGRA förvaras?
6. Ytterligare information

1. VAD ÄR VIAGRA OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

VIAGRA tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5)-hämmare. Det verkar genom att underlätta avslappningen av blodkärlen i din penis vid sexuell upphetsning. Detta gör att blod lättare kan flöda in i penisen. VIAGRA kommer endast att hjälpa dig att få en erektion om du är sexuellt stimulerad. Du ska inte ta VIAGRA om du inte lider av erektil dysfunktion. Kvinnor ska inte ta VIAGRA.

VIAGRA används för behandling av erektil dysfunktion hos män, vilket ibland också kallas impotens. Detta inträffar när en man inte kan få eller behålla en tillräckligt hård, upprätt penis för sexuell aktivitet.

2. VAD MÅSTE DU BEAKTA INNAN DU TAR VIAGRA?

VIAGRA får inte tas

- om du tar läkemedel som kallas nitrater, eftersom kombinationen kan orsaka en potentiellt farlig sänkning av ditt blodtryck. Tala med din läkare om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ordinerar för att lindra symtom vid angina pectoris (eller "hjärtsmärta"). Om du är osäker, fråga din läkare eller apotekare.

- om du tar läkemedel som är kända som kväveoxid-donatorer, såsom amylnitrit (även kallat "poppers"), eftersom även denna kombination kan orsaka en potentiellt farlig sänkning av ditt blodtryck.
- om du är allergisk (överkänslig) mot sildenafil eller någon av de andra ingredienserna i VIAGRA.
- om du har en allvarlig hjärt- eller leversjukdom.
- om du nyligen har haft en stroke eller hjärtinfarkt, eller om du har lågt blodtryck.
- om du har vissa sällsynta ärftliga ögonsjukdomar (som retinitis pigmentosa).
- om du har eller har haft synförlust på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION).

Särskild försiktighet vid intag av VIAGRA är nödvändig
Tala med din läkare,

- om du har sicklecellanemi (förändring av de röda blodkropparna), leukemi (blodcancer) eller multipelt myelom (benmärgscancer). I dessa fall kan särskild försiktighet vid intag av läkemedel för behandling av erektil dysfunktion vara nödvändig.
- om du har en deformation av din penis eller Peyronies sjukdom.
- om du har hjärtproblem. Din läkare bör i detta fall noggrant kontrollera om ditt hjärta klarar den extra ansträngningen av samlag.
- om du för närvarande har ett mag-tarm-sår, eller om det finns en störning i blodkoagulationen (som t.ex. hemofili).
- om du märker en plötslig minskning eller förlust av synen, avbryt behandlingen med VIAGRA och kontakta omedelbart en läkare.

Du får inte använda VIAGRA samtidigt med andra orala eller lokalt applicerade behandlingar för erektil dysfunktion.

Särskilda överväganden för barn och ungdomar
VIAGRA får inte tas av personer under 18 år.

Särskilda överväganden för patienter med njur- eller leversjukdomar
Du bör informera din läkare om du har en njur- eller leverfunktionsstörning. Din läkare kommer att avgöra om en lägre dosering är nödvändig för dig.

Vid intag av VIAGRA med andra läkemedel
Vänligen informera din läkare eller apotekare om du tar andra läkemedel eller nyligen har tagit dem, även om det är receptfria läkemedel.

VIAGRA-filmdragerade tabletter och vissa läkemedel kan påverka varandra, särskilt de som används för att behandla hjärtsmärter. Vid en medicinsk nödsituation bör du informera den

medicinska personalen som behandlar dig att du har tagit VIAGRA och när du tog det. Ta inte VIAGRA under behandling med andra läkemedel om inte din läkare uttryckligen säger att du kan göra det.

Du får inte ta VIAGRA om du tar läkemedel som kallas nitrater, eftersom kombinationen av dessa läkemedel kan orsaka en potentiellt farlig sänkning av ditt blodtryck. Prata med din läkare eller apotekare om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ordineras för att lindra symtom vid angina pectoris (eller 'hjärtsmärtor').

Du får inte ta VIAGRA om du tar läkemedel som är kända som kväveoxid-donatorer, som amylnitrit (även kallade 'poppers'), eftersom även denna kombination kan orsaka en potentiellt farlig sänkning av ditt blodtryck.

Om du tar läkemedel kända som proteashämmare, som används för att behandla HIV-infektion, kan din läkare börja behandlingen med den lägsta VIAGRA-dosen (25 mg).

Hos vissa patienter som tar alfahämmare för att behandla högt blodtryck eller förstörd prostata kan det uppstå yrsel och dåsighet, vilket kan orsakas av ett för lågt blodtryck vid snabb uppsättning eller uppresning. Vissa patienter har haft sådana symtom när de använde VIAGRA tillsammans med alfahämmare.

Detta inträffar oftast inom 4 timmar efter att ha tagit VIAGRA. För att minska sannolikheten för att sådana symtom uppstår hos dig, bör du ta din alfahämmare i en regelbunden daglig dos innan du tar VIAGRA. Din läkare kan i ett sådant fall ordinera en lägre startdos (25 mg) VIAGRA.

Vid intag av VIAGRA tillsammans med mat och dryck VIAGRA kan tas med eller utan mat. Du kan dock märka att det tar längre tid för VIAGRA att verka om du tar det med en riklig måltid.

Alkoholkonsumtion kan tillfälligt minska förmågan att få en erektion. För att få bästa möjliga nytta av ditt läkemedel bör du inte dricka överdrivna mängder alkohol innan du tar VIAGRA.

Graviditet och amning
VIAGRA är inte avsett för användning hos kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner
VIAGRA kan orsaka yrsel och påverka synen. Var uppmärksam på hur du reagerar på intag av VIAGRA innan du kör bil eller använder maskiner.

Viktig information om vissa andra ingredienser i VIAGRA
Ta inte VIAGRA utan att rådfråga din läkare om du vet att du har en intolerans mot vissa sockerarter, såsom laktos.

3. HUR SKA VIAGRA TAS?

Ta alltid VIAGRA exakt enligt läkarens anvisningar. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Om inte annat föreskrivs av läkaren är den vanliga startdosen 50 mg.

Ta inte VIAGRA oftare än en gång per dag.

Du bör ta VIAGRA ungefär en timme före planerat samlag. Svälj tabletten hel och drick ett glas vatten till.

Tala med din läkare eller apotekspersonal om du tycker att effekten av VIAGRA är för stark eller för svag.

VIAGRA kommer endast att hjälpa dig att få en erektion om du är sexuellt stimulerad. Tiden det tar för VIAGRA att verka varierar från patient till patient, vanligtvis mellan en halvtimme och en timme. Du kommer kanske märka att det tar längre tid för VIAGRA att verka om du tar det med en riklig måltid.

Du bör informera din läkare om VIAGRA inte ger dig en erektion eller om erektionen inte varar tillräckligt länge för att fullborda samlaget.

Om du har tagit en större mängd VIAGRA än du borde
Biverkningar kan uppträda oftare och vara allvarigare. Doser över 100 mg ökar inte effekten.

Ta inte en högre dos än den som din läkare har ordinerat.

Om du har tagit fler tabletter än vad din läkare har ordinerat, kontakta din läkare.

Om du har ytterligare frågor om användningen av läkemedlet, fråga din läkare eller apotekspersonal.

4. VILKA BIVERKNINGAR ÄR MÖJLIGA?

Liksom alla läkemedel kan VIAGRA ha biverkningar, men de behöver inte förekomma hos alla. De biverkningar som beskrivs i samband med Viagra är oftast milda till måttliga och av kort varaktighet.

Om du får bröstsmärtor under eller efter samlag:

- Sätt dig i en halvsittande ställning och försök att slappna av.
- Använd inte nitrater för att behandla dina bröstsmärtor.
- Kontakta omedelbart din läkare.

Alla läkemedel inklusive VIAGRA kan orsaka allergiska reaktioner. Kontakta omedelbart din läkare om du efter att ha tagit VIAGRA upplever något av följande symtom: plötsligt väsande andning, andningssvårigheter eller yrsel, svullnad av ögonlock, ansikte, läppar eller svalg.

Överdrivet långvariga och ibland smärtsamma erektioner har rapporterats efter intag av VIAGRA. Om du har en sådan erektion som varar mer än 4 timmar bör du omedelbart söka läkare.

Om du märker en plötslig försämring eller förlust av synen, sluta ta VIAGRA och kontakta omedelbart din läkare.

En mycket vanlig biverkning (kan förekomma hos 1 av 10 patienter) är huvudvärk.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 till 10 av 100 patienter) är: ansiktsrodnad, matsmältningsbesvär, synpåverkan (inklusive störningar i färgseendet, ljuskänslighet, dimsyn eller nedsatt synskärpa), täppt näsa och yrsel.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 till 10 av 1000 patienter) är: kräkningar, hudutslag, blödning i ögonens bakgrund, ögonirritation, blodsprängda/röda ögon, ögonsmärta, dubbelseende, onormal känsla i ögat, oregelbunden hjärtrytm eller hjärtklappning, muskelsmärta, dåsigheit, nedsatt känsel, svindel, tinnitus, illamående, torr mun, bröstsmärtor och trötthet.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos 1 till 10 av 10 000 patienter) är: högt blodtryck, lågt blodtryck, svimning, stroke, näsblod och plötslig hörselnedsättning eller dövhet.

Andra biverkningar som beskrivits efter marknadsintroduktionen inkluderar: hjärtklappning, bröstsmärtor, plötsliga dödsfall, hjärtinfarkt eller tillfälliga cirkulationsstörningar i hjärnan. De flesta, men inte alla, av dessa män hade hjärtsjukdomar innan de tog detta läkemedel. Det är inte möjligt att bedöma om dessa händelser har ett direkt samband med VIAGRA. Förekomster av kramper eller anfall samt allvarliga hudreaktioner med utslag, blåsbildning, hudavflagnings och smärta, som kräver omedelbar medicinsk vård, har också rapporterats.

Informera din läkare eller apotekspersonal om någon av de listade biverkningarna påverkar dig avsevärt eller om du märker biverkningar som inte anges i denna bipacksedel.

5. HUR SKA VIAGRA FÖRVARAS?

Förvara läkemedel oåtkomligt för barn.

Förvara vid högst 30 °C.

Förvara i originalförpackningen för att skydda mot fukt.

Använd inte läkemedlet efter utgångsdatumet som anges på kartongen. Utgångsdatumet avser sista dagen i månaden.

Läkemedlet får inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder hjälper till att skydda miljön.

6. Ytterligare information

Vad VIAGRA innehåller

- Den aktiva substansen är sildenafil. Varje tablett innehåller 25 mg, 50 mg eller 100 mg sildenafil (som citrat).
- Övriga innehållsämnen är:
Tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat
Filmdragering: Hypromellos, titandioxid (E171), laktos, triacetin, indigokarminaluminiumsalt (E132)

Hur VIAGRA ser ut och förpackningens innehåll

VIAGRA filmdragerade tabletter är blå, rundade, diamantformade tabletter. De är märkta på ena sidan med "PFIZER" och på den andra med "VGR 25", "VGR 50" eller "VGR 100".
Tabletterna finns i blisterförpackningar med 2, 4, 8 eller 12 tabletter (25 mg, 50 mg eller 100 mg) eller som blisterkort (50 mg). Alla förpackningsstorlekar kanske inte marknadsförs i ditt land.

Farmaceutisk företag och tillverkare

Farmaceutisk företag för VIAGRA är Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Storbritannien.

Tillverkare av VIAGRA är Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrike.

Om ytterligare information om läkemedlet önskas, vänligen kontakta den lokala representanten för det farmaceutiska företaget.

Belgien

Pfizer S.A./ N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Bulgarien

Pfizer Luxembourg SARL, filial Bulgarien Pfizer Kft.

Tel.: +359 2 970 4333

Ungern

Tel.: + 36 1 488 37 00

Tjeckien

Pfizer s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel: +356 21 22 01 74

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Nederländerna

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Tyskland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Estland

Pfizer Luxembourg SARL, Estlands filial

Tel: +372 6 405 328

Österrike

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Grekland

Pfizer Hellas A.E.

Τηλ: +30 210 6785800

Polen

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel.: +48 22 335 61 00

Spanien

Pfizer S.A.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

Frankrike

Rumänien

Pfizer
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Pfizer România S.R.L.
Tel: +40 (0)21 207 28 00

Irland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363 (avgiftsfritt)
Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenien
Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer,
filial för rådgivning områden
farmaceutiska aktiviteter, Ljubljana
Tel: + 386(0)152 11 400

Island
Vistor hf.
Tel: + 354 535 7000

Slovakien
Pfizer Luxembourg SARL, organisation
del
Tel: +421-2-3355 5500

Italien
Pfizer Italia S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

Cypern
GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD,
Τηλ: +35722818087

Sverige
Pfizer AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel: +371 670 35 775

United Kingdom
Pfizer Limited
Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL, filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000
Denna bipacksedel godkändes senast 07/2010

Detaljerad information om VIAGRA finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats
<http://www.ema.europa.eu> tillgänglig.