

Packungsbeilage: Informationen für den Anwender

VIAGRA CONNECT® 50 mg Filmtabletten Sildenafil

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, da sie wichtige Informationen enthält.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben oder nach Anweisung Ihres Apothekers ein.

- Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie sie später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, sprechen Sie mit Ihrem Apotheker oder Arzt. Dies schließt alle möglichen Nebenwirkungen ein, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind. Siehe Abschnitt 4.
- Sie müssen mit einem Arzt sprechen, wenn Sie VIAGRA CONNECT wie angewiesen eingenommen haben und keine Erektion bekommen oder aufrechterhalten konnten, die fest genug für den Geschlechtsverkehr ist.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was VIAGRA CONNECT ist und wofür es angewendet wird
2. Was Sie vor der Einnahme von VIAGRA CONNECT wissen müssen
3. Wie ist VIAGRA CONNECT einzunehmen
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Wie ist VIAGRA CONNECT aufzubewahren
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was VIAGRA CONNECT® ist und wofür es angewendet wird

Was VIAGRA CONNECT ist

VIAGRA CONNECT enthält den Wirkstoff Sildenafil, der zu einer Gruppe von Arzneimitteln gehört, die als Phosphodiesterase-Typ-5 (PDE5)-Hemmer bezeichnet werden. Es wirkt, indem es die Blutgefäße in Ihrem Penis entspannt, sodass Blut in Ihren Penis fließen kann, wenn Sie sexuell erregt sind, und eine Erektion verursacht. VIAGRA CONNECT hilft Ihnen nur, eine Erektion zu bekommen, wenn Sie sexuell erregt (stimuliert) sind.

Wofür VIAGRA CONNECT verwendet wird

VIAGRA CONNECT ist eine Behandlung für Männer ab 18 Jahren mit erektiler Dysfunktion.

Erektile Dysfunktion, auch bekannt als Impotenz, ist die Unfähigkeit, eine Erektion zu erreichen oder aufrechtzuerhalten, die fest genug ist, um Geschlechtsverkehr zu haben. Erektionen hängen von vielen verschiedenen Faktoren ab, einschließlich eines ordnungsgemäßen Blutflusses zum Penis. Reduzierter Blutfluss zum Penis kann erektile Dysfunktion verursachen. Erektile Dysfunktion kann Männer unterschiedlich betreffen. Einige können keine Erektion erreichen. Andere können eine Erektion erreichen, aber nicht fest genug für den Geschlechtsverkehr oder sie können die Erektion vor oder während des Geschlechtsverkehrs verlieren.

2. Was Sie wissen müssen, bevor Sie VIAGRA CONNECT® einnehmen

Nehmen Sie VIAGRA CONNECT nicht ein, wenn Sie:

- kein Erektionsproblem haben
- irgendein Nitratmedikament gegen Brustschmerzen oder Herzinsuffizienz einnehmen (siehe „Andere Medikamente und VIAGRA CONNECT“)
- Amyl Nitrit, sogenannte „Poppers“ als Freizeitdrogen einnehmen
- Riociguat (oder andere Guanylatzyklase-Stimulatoren) gegen Bluthochdruck in der Lunge einnehmen (siehe „Andere Medikamente und VIAGRA CONNECT“)
- Ritonavir zur Behandlung von HIV einnehmen (siehe „Andere Medikamente und VIAGRA CONNECT“)
- von Ihrem Arzt angewiesen wurden, sexuelle Aktivität wegen eines Problems mit Ihrem Herzen oder Ihren Blutgefäßen zu vermeiden (siehe „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“)
- ein schweres Herzproblem haben, wie einen kürzlichen Herzinfarkt oder Schlaganfall (innerhalb der letzten 6 Monate), instabile Angina (Brustschmerzen) oder schwere Herzinsuffizienz (verminderte Pumpkapazität des Herzens) • ein schweres Leberproblem haben
- niedrigen Blutdruck haben (unter 90/50 mmHg), der Symptome wie Müdigkeit, Schwindel, Benommenheit, Übelkeit, feuchte Haut, Depression, Bewusstlosigkeit oder verschwommenes Sehen verursachen kann
- jemals einen schweren Sehverlust aufgrund von Nervenschäden in den Augen hatten, wie nicht-arteriitische anteriore ischämische Optikusneuropathie (NAION); oder eine seltene erbliche Augenerkrankung haben, wie Retinitis pigmentosa (siehe „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“)
- einen deformierten Penis haben
- eine Frau sind
- sind unter 18 Jahre alt
- allergisch gegen Sildenafil oder einen der anderen Bestandteile dieses Arzneimittels (aufgeführt in Abschnitt 6) sind

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Sie sollten so bald wie möglich innerhalb der ersten 6 Monate nach Beginn der Anwendung von VIAGRA CONNECT einen Gesundheitscheck bei Ihrem Arzt vereinbaren, um sicherzustellen, dass Ihre Erektionsprobleme nicht durch eine ernsthafte Gesundheitsstörung verursacht werden.

Erektile Dysfunktion kann ein frühes Anzeichen sein für:

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Diabetes
- Bluthochdruck
- hoher Cholesterinspiegel

Informieren Sie Ihren Arzt über Ihre Probleme, wenn Sie dies noch nicht getan haben.

Kardiovaskuläre Risikofaktoren

Sexuelle Aktivität kann Ihr Herz belasten (siehe „Nehmen Sie VIAGRA CONNECT nicht ein, wenn Sie“ oben).

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie VIAGRA CONNECT einnehmen, wenn Sie:

sehr kurzatmig werden oder Schmerzen in der Brust bei leichter oder mäßiger Aktivität verspüren (z. B. zügiges Gehen für 20 Minuten oder Treppensteigen über zwei Etagen). Ihr Arzt muss möglicherweise überprüfen, ob Ihr Herz die zusätzliche Belastung durch Geschlechtsverkehr verkraften kann.

- ein Problem mit einer Herzklappe haben (Herzklappenerkrankung).
- eine Erkrankung haben, bei der der Herzmuskel entzündet ist und nicht so gut arbeitet, wie er sollte (Kardiomyopathie).
- einen unregelmäßigen Herzschlag haben (Arrhythmie).
- eine Operation zur Verbesserung des Blutflusses zu Ihrem Herzen hatten oder Bluthochdruck haben, der jetzt ausreichend behandelt wird.
- einen Bluthochdruck haben, der nicht kontrolliert ist.

Andere Risikofaktoren:

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie VIAGRA CONNECT einnehmen, wenn Sie:

- jemals eine Erektion hatten, die länger als 4 Stunden anhielt (Priapismus). Einige Erkrankungen können die Wahrscheinlichkeit einer anhaltenden Erektion erhöhen, wie z.B. Sichelzellenanämie (eine Anomalie der roten Blutkörperchen), Leukämie (Krebs der Blutzellen) oder multiples Myelom (Krebs des Knochenmarks). Die Verwendung von Potenzmitteln kann das Risiko eines Priapismus erhöhen. Eine lang anhaltende Erektion kann das Gewebe im Penis schädigen und zu einem dauerhaften Verlust der Fähigkeit führen, eine Erektion zu bekommen.
- ein Magengeschwür oder eine Blutungsstörung (wie Hämophilie) haben.
- zuvor mit einer leichten bis mittelschweren Lebererkrankung oder schweren Nierenproblemen diagnostiziert wurden. VIAGRA CONNECT ist möglicherweise nicht für Sie geeignet, Sie sollten Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie VIAGRA CONNECT einnehmen.

Wenn Sie einen plötzlichen Sehverlust erleben, sollten Sie die Einnahme von VIAGRA CONNECT abbrechen und sofort Ihren Arzt kontaktieren. Fälle von Sehstörungen wurden bei der Anwendung von Sildenafil berichtet.

Kinder und Jugendliche

Dieses Arzneimittel sollte nicht an Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren verabreicht werden.

Andere Arzneimittel und VIAGRA CONNECT

Informieren Sie Ihren Apotheker oder Arzt, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich eingenommen haben oder einnehmen könnten. Einige Arzneimittel können von VIAGRA CONNECT beeinflusst werden oder sie können beeinflussen, wie VIAGRA CONNECT wirkt, was zu Nebenwirkungen führen kann.

Verwenden Sie VIAGRA CONNECT nicht, wenn Sie einnehmen:

Nitratarzneimittel: Nehmen Sie VIAGRA CONNECT nicht ein, wenn Sie Nitratarzneimittel (wie Glyceroltrinitrat, Isosorbidmononitrat, Isosorbiddinitrat) gegen Brustschmerzen (Angina pectoris) oder Herzinsuffizienz oder „Poppers“ als Freizeitdrogen (Stickstoffmonoxidendonatoren (wie Amylnitrit), Nicorandil oder Natriumnitroprussid) einnehmen. Dies liegt daran, dass diese Substanzen in Kombination mit VIAGRA CONNECT zu einem gefährlichen Blutdruckabfall führen können.

Riociguat: Nehmen Sie VIAGRA CONNECT nicht ein, wenn Sie ein Arzneimittel namens Riociguat (oder andere Arzneimittel einer Gruppe namens Guanylatcyclase-Stimulatoren) einnehmen. Riociguat wird zur Behandlung von Bluthochdruck in der Lunge eingesetzt und kann in Kombination mit VIAGRA CONNECT zu einem gefährlichen Blutdruckabfall führen.

Arzneimittel zur Behandlung von HIV-Infektionen: Ritonavir ist ein Arzneimittel zur Behandlung von HIV-Infektionen. Nehmen Sie VIAGRA CONNECT nicht ein, wenn Sie Ritonavir einnehmen, da diese Kombination zu einem gefährlichen Blutdruckabfall führen kann.

Sprechen Sie mit Ihrem Apotheker oder Arzt, bevor Sie VIAGRA CONNECT verwenden, wenn Sie einnehmen:

Arzneimittel zur Behandlung von Pilzinfektionen und Antibiotika: Arzneimittel zur Behandlung von Pilzinfektionen namens Itraconazol oder Ketoconazol und ein Antibiotikum namens Erythromycin erhöhen die Konzentration von VIAGRA CONNECT im Körper und können zu Nebenwirkungen führen. Sie sollten Ihren Arzt kontaktieren, bevor Sie VIAGRA CONNECT einnehmen, wenn Sie diese Arzneimittel verwenden.

Behandlung von Sodbrennen: Das Arzneimittel zur Behandlung von Sodbrennen, Cimetidin, erhöht die Konzentration von VIAGRA CONNECT im Körper und kann zu Nebenwirkungen führen. Sie sollten Ihren Arzt kontaktieren, bevor Sie VIAGRA CONNECT einnehmen.

Andere Behandlungen für erektile Dysfunktion: Die Sicherheit und Wirksamkeit von Kombinationen von VIAGRA CONNECT mit anderen Behandlungen für erektile Dysfunktion wurden nicht untersucht und diese Kombination wird daher nicht empfohlen.

Alpha-Blocker zur Behandlung von Harnproblemen oder Bluthochdruck: Alpha-Blocker zur Behandlung von Harnproblemen aufgrund einer vergrößerten Prostata (wie Alfuzosin, Doxazosin oder Tamsulosin) können zu Schwindel, Benommenheit, Übelkeit, Ohnmacht, Konzentrationsmangel oder verschwommenem Sehen aufgrund von niedrigem Blutdruck (symptomatische Hypotonie) führen.

VIAGRA CONNECT mit Nahrung und Getränken

VIAGRA CONNECT kann mit oder ohne Nahrung eingenommen werden. Wenn dieses Arzneimittel nach einer fettreichen Mahlzeit eingenommen wird, kann es etwas länger dauern, bis es zu wirken beginnt.

Nehmen Sie VIAGRA CONNECT nicht mit Grapefruit oder Grapefruitsaft ein, da dies die Wirkung des Medikaments beeinflussen kann.

Übermäßiger Alkoholkonsum kann vorübergehend Ihre Fähigkeit, eine Erektion zu erreichen, verringern. Um einen Nutzen aus dem Medikament zu ziehen, wird empfohlen, vor sexueller Aktivität keine großen Mengen Alkohol zu trinken.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fruchtbarkeit Dieses Medikament sollte nicht von Frauen verwendet werden.

Fahren und Bedienen von Maschinen

VIAGRA CONNECT kann Schwindel verursachen und Ihr Sehvermögen beeinträchtigen. Fahren Sie nicht und bedienen Sie keine Maschinen, wenn Sie nach der Einnahme dieses Medikaments unter diesen Nebenwirkungen leiden.

VIAGRA CONNECT enthält Laktose

Wenn Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt hat, dass Sie eine Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie dieses Medikament einnehmen.

VIAGRA CONNECT enthält Natrium

Dieses Medikament enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Tablette, das heißt im Wesentlichen 'natriumfrei'.

3. Wie ist VIAGRA CONNECT® einzunehmen

Nehmen Sie dieses Medikament immer genau so ein, wie in dieser Packungsbeilage beschrieben oder wie von Ihrem Apotheker oder Arzt angewiesen. Fragen Sie bei Ihrem Apotheker oder Arzt nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Nehmen Sie 1 Tablette nach Bedarf etwa 1 Stunde vor der sexuellen Aktivität ein.
Schlucken Sie die Tablette unzerkaut mit Wasser.
Nehmen Sie nicht mehr als 1 Tablette pro Tag ein.

VIAGRA CONNECT hilft Ihnen nur, eine Erektion zu erreichen, wenn Sie sexuell erregt sind. Sie und Ihr Partner sollten sich wie gewohnt auf das Vorspiel einlassen, auch wenn Sie kein Medikament gegen erektile Dysfunktion einnehmen.

Die Zeit, die dieses Medikament benötigt, um zu wirken, variiert von Person zu Person, beträgt jedoch normalerweise zwischen 30 und 60 Minuten. Sie können es bis zu 4 Stunden vor der sexuellen Aktivität einnehmen.

Entspannen Sie sich und haben Sie Geduld, wenn VIAGRA CONNECT Ihnen beim ersten Mal nicht hilft. Sie können es später erneut versuchen, aber denken Sie daran, dass Sie nur 1 Tablette pro Tag einnehmen dürfen. Bei den meisten Männern wirkt VIAGRA CONNECT beim ersten oder zweiten Versuch. Wenn es schon eine Weile her ist, dass Sie eine Erektion bekommen oder halten konnten, kann es ein paar Versuche dauern, bis Sie den gewünschten Effekt erzielen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie VIAGRA CONNECT ausprobiert haben und immer noch keine Erektion bekommen und halten können. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Wirkung von VIAGRA CONNECT zu stark ist, sprechen Sie mit Ihrem Apotheker oder Arzt.

Wenn Sie mehr VIAGRA CONNECT einnehmen, als Sie sollten

Wenn Sie mehr Tabletten als empfohlen einnehmen, kontaktieren Sie sofort Ihren Apotheker oder Arzt. Die Einnahme einer höheren als der empfohlenen Dosis kann zu Nebenwirkungen und/oder schwerwiegenderen Nebenwirkungen führen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Apotheker oder Arzt.

4. Mögliche Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten. Diese Nebenwirkungen sind in der Regel mild bis moderat und von kurzer Dauer.

Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie eine der folgenden schwerwiegenden Nebenwirkungen bemerken:

Brustschmerzen: Dies tritt gelegentlich auf. Wenn dies vor, während oder nach sexueller Aktivität auftritt: Nehmen Sie eine halb sitzende Position ein und versuchen Sie, sich zu entspannen. Verwenden Sie KEINE Nitrate zur Behandlung Ihrer Brustschmerzen.

Eine verlängerte und manchmal schmerzhafte Erektion, die länger als 4 Stunden anhält: Dies tritt selten auf.

Ein plötzlicher Verlust oder eine plötzliche Abnahme des Sehvermögens: Dies tritt selten auf.

Eine allergische Reaktion: Dies tritt gelegentlich auf. Symptome umfassen plötzliches Keuchen, Atembeschwerden oder Schwindel, Schwellungen der Augenlider, des Gesichts, der Lippen oder des Rachens.

Schwere Hautreaktionen wie Stevens-Johnson-Syndrom (SJS) und Toxische Epidermale Nekrolyse (TEN): Dies tritt selten auf. Symptome können schweres Abschälen und Schwellungen der Haut, Blasenbildung im Mund, an den Genitalien und um die Augen sowie Fieber umfassen.

Anfälle oder Krampfanfälle: Dies tritt selten auf.

Andere Nebenwirkungen

Sehr häufig (kann mehr als 1 von 10 Personen betreffen):

Kopfschmerzen

Häufig (kann bis zu 1 von 10 Personen betreffen):

Übelkeit, Verdauungsstörungen, verstopfte Nase, Schwindel

Gesichtsrötung, Hitzewallung (ein plötzliches Hitzegefühl im Oberkörper)

Farbveränderung des Sehens, verschwommenes Sehen, Sehstörungen

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Personen betreffen):

Erbrechen, Schmerzen im Oberbauch, saurer Reflux (einschließlich Sodbrennen)
Hautausschlag, Schmerzen in den Armen oder Beinen, Nasenbluten, Hitzegefühl,
Müdigkeit (Erschöpfung)

Augenreizung, gerötete Augen, Augenschmerzen, Lichtblitze sehen, visuelle
Helligkeit, Lichtempfindlichkeit, tränende Augen

pochender Herzschlag, schneller Herzschlag

Bluthochdruck

niedriger Blutdruck (typische Anzeichen sind Schwindel, Ohnmacht,
verschwommenes Sehen, Übelkeit und Müdigkeit)

Muskelschmerzen, Schläfrigkeit, vermindertes Berührungsempfinden, Schwindel,
Ohrensausen

trockener Mund, verstopfte oder verstopfte Nasennebenhöhlen, Entzündung der
Nasenschleimhaut (kann als laufende Nase, Niesen und verstopfte Nase empfunden
werden)

Vorhandensein von Blut im Urin

Selten (kann bis zu 1 von 1.000 Personen betreffen):

Ohnmacht, trockene Nase, Schwellung der Naseninnenseite, Reizbarkeit und plötzlicher Hörverlust oder -abnahme
plötzlicher unerwarteter Tod durch Herzfunktionsverlust (plötzlicher Herzstillstand), Schlaganfall, Herzinfarkt, Brustschmerzen (Angina), unregelmäßiger Herzschlag, vorübergehend verminderter Blutfluss zu Teilen des Gehirns
Gefühl der Enge im Hals, tauber Mund
Blutung im hinteren Teil des Auges, Doppelsehen, verminderte Sehschärfe, abnormales Empfinden im Auge, Schwellung des Auges oder Augenlids, kleine Partikel oder Flecken im Sichtfeld, Halos um Lichter sehen, Erweiterung der Pupille, Verfärbung des Augenweißes
Penisblutung, Vorhandensein von Blut im Sperma

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das Pflegepersonal. Dies schließt alle möglichen Nebenwirkungen ein, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Yellow Card Scheme unter: www.mhra.gov.uk/yellowcard melden oder nach MHRA Yellow Card im Google Play oder Apple App Store suchen. Durch das Melden von Nebenwirkungen können Sie dazu beitragen, mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels bereitzustellen.

5. Wie VIAGRA CONNECT® aufzubewahren ist

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich und unsichtbar auf.

Nicht über 30°C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht nach dem Verfallsdatum, das auf dem Umkarton und der Blisterpackung angegeben ist. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie Sie Arzneimittel entsorgen, die Sie nicht mehr verwenden. Diese Maßnahmen helfen, die Umwelt zu schützen.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was VIAGRA CONNECT enthält

- Der Wirkstoff ist Sildenafil. Jede Tablette enthält 50 mg Sildenafil (als Citrat).
- Die sonstigen Bestandteile sind:
Tablettenkern: mikrokristalline Cellulose, Calciumhydrogenphosphat (wasserfrei), Croscarmellose-Natrium (siehe Abschnitt 2 „VIAGRA CONNECT enthält Natrium“) und Magnesiumstearat
Filmüberzug: Hypromellose, Titandioxid (E 171), Laktose

(siehe Abschnitt 2 „VIAGRA CONNECT enthält Laktose“), Triacetin und Indigokarmin-Aluminiumsalz (E 132)

Wie VIAGRA CONNECT aussieht und Inhalt der Packung

VIAGRA CONNECT sind blaue, filmbeschichtete Tabletten mit einer abgerundeten Rautenform und messen 11,2 mm x 8,1 mm. Sie sind auf der einen Seite mit 'Pfizer' und auf der anderen Seite mit 'V50' gekennzeichnet.

Die Tabletten sind in Blisterpackungen mit 2, 4 oder 8 Tabletten in einem Umkarton erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Zulassungsinhaber

Upjohn UK Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, UK

Hersteller

Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29, Route des Industries, 37530 Pocé sur Cisse, Frankreich

Firmenkontaktadresse

Für weitere Informationen zu diesem Arzneimittel kontaktieren Sie bitte die Medizinische Information bei Pfizer Limited, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey, KT20 7NS. Telefon: 01304 616161

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten Königreich (Nordirland) unter den folgenden Namen zugelassen:

Norwegen:	Viagra Reseptfri
Polen:	VIAGRA CONNECT MAX
Schweden:	Sildenafil Pfizer Consumer Healthcare
Irland, Vereinigtes Königreich (Nordirland):	VIAGRA CONNECT

Dieses Merkblatt wurde zuletzt im 06/2021 überarbeitet.

Ref: VC 5_0