

Prospecto: Información para el usuario

VIAGRA CONNECT® 50 mg comprimidos recubiertos con película  
sildenafil

Lea todo este prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento porque contiene información importante para usted.

Tome siempre este medicamento exactamente como se describe en este prospecto o según le haya indicado su farmacéutico.

- Conserve este prospecto. Puede que necesite leerlo de nuevo.
- Consulte a su farmacéutico si necesita más información o consejo.
- Si experimenta cualquier efecto secundario, hable con su farmacéutico o médico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe hablar con un médico si ha tomado VIAGRA CONNECT según las indicaciones y no pudo conseguir o mantener una erección lo suficientemente firme para el sexo.

Contenido de este prospecto

1. Qué es VIAGRA CONNECT y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de tomar VIAGRA CONNECT
3. Cómo tomar VIAGRA CONNECT
4. Posibles efectos secundarios
5. Cómo almacenar VIAGRA CONNECT
6. Contenido del envase e información adicional

## 1. Qué es VIAGRA CONNECT® y para qué se utiliza

Qué es VIAGRA CONNECT

VIAGRA CONNECT contiene la sustancia activa sildenafil, que pertenece a un grupo de medicamentos llamados inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5). Actúa relajando los vasos sanguíneos en su pene, permitiendo que la sangre fluya hacia su pene cuando se excite sexualmente y causando una erección. VIAGRA CONNECT solo le ayudará a conseguir una erección si está sexualmente excitado (estimulado).

Para qué se utiliza VIAGRA CONNECT

VIAGRA CONNECT es un tratamiento para hombres de 18 años o más con disfunción eréctil.

La disfunción eréctil, también conocida como impotencia, es la incapacidad de lograr o mantener una erección lo suficientemente firme para tener relaciones sexuales. Las erecciones dependen de muchos factores diferentes, incluyendo un flujo sanguíneo adecuado al pene. La reducción del flujo sanguíneo al pene puede causar disfunción eréctil. La disfunción eréctil puede afectar a los hombres de diferentes maneras. Algunos no pueden lograr una erección. Otros pueden lograr una erección, pero no lo suficientemente firme para tener relaciones sexuales o pueden perder la erección antes o durante el acto sexual.

## 2. Lo que necesita saber antes de tomar VIAGRA CONNECT®

No tome VIAGRA CONNECT si:

- no tiene un problema de erección
- toma algún medicamento con nitratos para el dolor de pecho o insuficiencia cardíaca (ver "Otros medicamentos y VIAGRA CONNECT")
- toma nitrito de amilo, conocidos como "poppers" como drogas recreativas
- toma riociguat (u otros estimuladores de la guanilato ciclasa) para la presión arterial alta en los pulmones (ver "Otros medicamentos y VIAGRA CONNECT")
- toma ritonavir para el tratamiento del VIH (ver "Otros medicamentos y VIAGRA CONNECT")
- su médico le ha aconsejado evitar la actividad sexual debido a un problema con su corazón o vasos sanguíneos (ver "Advertencias y precauciones")
- tiene un problema cardíaco grave como un ataque al corazón o un derrame cerebral reciente (en los últimos 6 meses), angina inestable (dolor en el pecho) o insuficiencia cardíaca grave (capacidad de bombeo reducida del corazón) • tiene un problema hepático grave
- tiene presión arterial baja (por debajo de 90/50 mmHg) que puede causar síntomas como cansancio, mareos, aturdimiento, náuseas, piel fría y húmeda, depresión, pérdida de conciencia o visión borrosa
- alguna vez ha tenido pérdida severa de visión debido a daño en los nervios de los ojos, como neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION); o tiene una enfermedad ocular hereditaria rara, como retinitis pigmentosa (ver "Advertencias y precauciones")
- tiene un pene deformado
- es una mujer
- son menores de 18 años de edad
- son alérgicos al sildenafil o a cualquiera de los otros ingredientes de este medicamento (enumerados en la sección 6)

### Advertencias y precauciones

Debe programar un chequeo de salud con su médico lo antes posible dentro de los primeros 6 meses de comenzar a usar VIAGRA CONNECT para asegurarse de que sus problemas de erección no sean causados por ninguna condición de salud grave.

La disfunción eréctil puede ser un signo temprano de:

- enfermedad cardiovascular
- diabetes
- presión arterial alta
- colesterol alto

Informe a su médico sobre sus problemas si aún no lo ha hecho.

### Factores de riesgo cardiovascular

La actividad sexual puede poner tensión en su corazón (ver "No tome VIAGRA CONNECT si usted" arriba).

Hable con su médico antes de tomar VIAGRA CONNECT si usted:

- se queda muy sin aliento o siente algún dolor en el pecho con actividad ligera o moderada (por ejemplo, caminar rápidamente durante 20 minutos o subir dos tramos de escaleras). Su médico puede necesitar verificar si su corazón puede soportar la tensión adicional de tener relaciones sexuales.

tiene un problema con una válvula en su corazón (enfermedad valvular cardíaca).  
tiene una enfermedad en la que el músculo del corazón se inflama y no funciona tan bien como debería (miocardiopatía).  
tiene un latido cardíaco irregular (arritmia).  
ha tenido cirugía para mejorar el flujo sanguíneo a su corazón, o tiene presión arterial alta que ahora está adecuadamente tratada.  
tiene presión arterial alta que no está controlada.

Otros factores de riesgo:

Hable con su médico antes de tomar VIAGRA CONNECT si usted:

alguna vez ha tenido una erección que duró más de 4 horas (priapismo). Algunas condiciones pueden aumentar la probabilidad de tener una erección persistente, como la anemia de células falciformes (una anomalía de los glóbulos rojos), la leucemia (cáncer de las células sanguíneas) o el mieloma múltiple (cáncer de la médula ósea). El uso de medicamentos para la impotencia puede aumentar el riesgo de priapismo. Una erección prolongada puede causar daño al tejido del pene y pérdida permanente de la capacidad de tener una erección.  
tiene una úlcera de estómago o un trastorno de sangrado (como la hemofilia).  
ha sido diagnosticado previamente con enfermedad hepática leve a moderada, o problemas renales severos. VIAGRA CONNECT puede no ser adecuado para usted, debe consultar a su médico antes de tomar VIAGRA CONNECT.

Si experimenta algún defecto visual repentino, debe dejar de tomar VIAGRA CONNECT y contactar a su médico de inmediato. Se han reportado casos de efectos visuales al usar sildenafil.

Niños y adolescentes

Este medicamento no debe administrarse a niños o adolescentes menores de 18 años.

Otros medicamentos y VIAGRA CONNECT

Informe a su farmacéutico o médico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tomar otros medicamentos. Algunos medicamentos pueden verse afectados por VIAGRA CONNECT o pueden afectar cómo funciona VIAGRA CONNECT y esto puede resultar en efectos secundarios.

No use VIAGRA CONNECT si toma:

Medicamentos con nitratos: No tome VIAGRA CONNECT si está tomando medicamentos con nitratos (como trinitrato de glicerilo, mononitrato de isosorbida, dinitrato de isosorbida) para el dolor en el pecho (angina de pecho) o insuficiencia cardíaca o "poppers" como drogas recreativas (donantes de óxido nítrico (como nitrito de amilo), nicorandil o nitroprusiato de sodio). Esto se debe a que estas sustancias podrían provocar una caída peligrosa de la presión arterial si se toman junto con VIAGRA CONNECT.

Riociguat: No tome VIAGRA CONNECT si está tomando un medicamento llamado riociguat (u otros medicamentos de un grupo llamado estimuladores de la guanilato ciclasa). Riociguat se usa para tratar la presión arterial alta en los pulmones y puede provocar una caída peligrosa de la presión arterial si se toma junto con VIAGRA CONNECT.

Medicamentos para tratar infecciones por VIH: Ritonavir es un medicamento utilizado para tratar infecciones por VIH. No tome VIAGRA CONNECT si está tomando ritonavir ya que esta combinación puede provocar una caída peligrosa de la presión arterial.

Hable con su farmacéutico o médico antes de usar VIAGRA CONNECT si está tomando:

Medicamentos para tratar infecciones por hongos y antibióticos: Los medicamentos para tratar infecciones por hongos llamados itraconazol o ketoconazol y un antibiótico llamado eritromicina aumentan la concentración de VIAGRA CONNECT en el cuerpo y pueden resultar en efectos secundarios. Debe contactar a su médico antes de tomar VIAGRA CONNECT si está usando estos medicamentos.

Tratamiento para la acidez estomacal: El medicamento para tratar la acidez estomacal, cimetidina, aumenta la concentración de VIAGRA CONNECT en el cuerpo y puede resultar en efectos secundarios. Debe contactar a su médico antes de tomar VIAGRA CONNECT.

Otros tratamientos para la disfunción eréctil: No se ha estudiado la seguridad y eficacia de las combinaciones de VIAGRA CONNECT con otros tratamientos para la disfunción eréctil y por lo tanto no se recomienda esta combinación.

Bloqueadores alfa utilizados para tratar problemas urinarios o presión arterial alta: Los bloqueadores alfa utilizados para tratar problemas urinarios debido a próstata agrandada (como alfuzosina, doxazosina o tamsulosina) pueden provocar mareos, aturdimiento, náuseas, desmayos, falta de concentración o visión borrosa debido a la baja presión arterial (hipotensión sintomática).

VIAGRA CONNECT con alimentos y bebidas

VIAGRA CONNECT se puede tomar con o sin alimentos. Cuando este medicamento se toma después de una comida rica en grasas, puede tardar un poco más en comenzar a funcionar.

No tome VIAGRA CONNECT con pomelo o jugo de pomelo, ya que esto puede afectar cómo funciona el medicamento.

Beber alcohol en exceso puede reducir temporalmente su capacidad para lograr una erección. Para obtener un beneficio del medicamento, se le aconseja no beber grandes cantidades de alcohol antes de la actividad sexual.

Embarazo, lactancia y fertilidad Este medicamento no debe ser utilizado por mujeres.

Conducción y uso de máquinas

VIAGRA CONNECT puede causar mareos y puede afectar su visión. No conduzca ni use máquinas si sufre estos efectos secundarios después de tomar este medicamento.

VIAGRA CONNECT contiene lactosa

Si su médico le ha dicho que tiene intolerancia a algunos azúcares, contacte a su médico antes de tomar este medicamento.

VIAGRA CONNECT contiene sodio

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por tableta, es decir, esencialmente 'libre de sodio'.

### 3. Cómo tomar VIAGRA CONNECT®

Siempre tome este medicamento exactamente como se describe en este prospecto o como le haya indicado su farmacéutico o médico. Consulte con su farmacéutico o médico si no está seguro.

Tome 1 tableta, según sea necesario, aproximadamente 1 hora antes de la actividad sexual.

Trague la tableta entera con agua.

No tome más de 1 tableta al día.

VIAGRA CONNECT solo le ayudará a lograr una erección si está sexualmente excitado. Usted y su pareja deben participar en los juegos previos tal como lo harían si no estuviera tomando un medicamento para la disfunción eréctil.

La cantidad de tiempo que este medicamento tarda en funcionar varía de persona a persona, pero normalmente tarda entre 30 a 60 minutos. Puede tomarlo hasta 4 horas antes de la actividad sexual.

Relájese y sea paciente si VIAGRA CONNECT no le ayuda la primera vez. Puede intentarlo de nuevo más tarde, pero recuerde que solo puede tomar 1 tableta al día. Para la mayoría de los hombres, VIAGRA CONNECT funcionará la primera o segunda vez que lo intenten. Si ha pasado algún tiempo desde que pudo lograr o mantener una erección, puede tomar un par de intentos antes de lograr el efecto deseado. Hable con su médico si ha intentado VIAGRA CONNECT y aún no puede lograr y mantener una erección.

Si siente que el efecto de VIAGRA CONNECT es demasiado fuerte, hable con su farmacéutico o médico.

Si toma más VIAGRA CONNECT de lo que debería

Si toma más tabletas de las recomendadas, contacte a su farmacéutico o médico inmediatamente. Tomar más de la dosis recomendada puede resultar en efectos secundarios y/o efectos secundarios más severos.

Si tiene alguna pregunta adicional sobre el uso de este medicamento, pregunte a su farmacéutico o médico.

### 4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede causar efectos secundarios aunque no todos los sufran. Estos efectos secundarios suelen ser leves a moderados y de corta duración.

Busque atención médica inmediatamente si experimenta alguno de los siguientes efectos secundarios graves:

Dolor en el pecho: esto ocurre poco comúnmente. Si esto ocurre antes, durante o después de la actividad sexual: Póngase en una posición semi-sentada e intente relajarse. NO use nitratos para tratar su dolor en el pecho.

Una erección prolongada y a veces dolorosa que dura más de 4 horas: esto ocurre raramente.

Una disminución o pérdida repentina de la visión: esto ocurre raramente.

Una reacción alérgica: esto ocurre poco comúnmente. Los síntomas incluyen sibilancias repentinas, dificultad para respirar o mareos, hinchazón de los párpados, cara, labios o garganta.

Reacciones cutáneas graves como el Síndrome de Stevens-Johnson (SJS) y el Síndrome Epidérmico Tóxico (TEN): esto ocurre raramente. Los síntomas pueden incluir descamación severa e hinchazón de la piel, ampollas en la boca, genitales y alrededor de los ojos y fiebre.

Convulsiones o ataques: esto ocurre raramente.

#### Otros efectos secundarios

Muy comunes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas):  
dolor de cabeza

Comunes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas):  
náuseas, indigestión, congestión nasal, mareos  
enrojecimiento facial, sofoco (una sensación repentina de calor en la parte superior del cuerpo)  
alteración del color de la visión, visión borrosa, trastorno visual

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):  
vómitos, dolor en la parte superior del abdomen, reflujo ácido (incluyendo acidez)  
erupción cutánea, dolor en los brazos o piernas, sangrado nasal, sensación de calor, sensación de cansancio (fatiga)  
irritación ocular, ojos inyectados de sangre/ojos rojos, dolor ocular, ver destellos de luz, brillo visual, sensibilidad a la luz, ojos llorosos  
latidos cardíacos fuertes, latidos cardíacos rápidos  
presión arterial alta  
presión arterial baja (los signos típicos son mareos, desmayos, visión borrosa, náuseas y cansancio)  
dolor muscular, somnolencia, reducción del sentido del tacto, vértigo, zumbido en los oídos  
boca seca, senos nasales bloqueados o congestionados, inflamación del revestimiento de la nariz (puede experimentarse como nariz que moquea, estornudos y nariz congestionada)  
presencia de sangre en la orina

Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1,000 personas):  
desmayos, nariz seca, hinchazón del interior de la nariz, sensación de irritabilidad y disminución o pérdida repentina de la audición  
muerte súbita e inesperada causada por pérdida de la función cardíaca (paro cardíaco súbito), accidente cerebrovascular, ataque al corazón, dolores en el pecho (angina), latidos cardíacos irregulares, disminución temporal del flujo sanguíneo a partes del cerebro  
sensación de opresión en la garganta, boca entumecida  
sangrado en la parte posterior del ojo, visión doble, reducción de la agudeza visual, sensación anormal en el ojo, hinchazón del ojo o párpado, pequeñas partículas o

manchas en la visión, ver halos alrededor de las luces, dilatación de la pupila del ojo, decoloración del blanco del ojo  
sangrado del pene, presencia de sangre en el semen

#### Notificación de efectos secundarios

Si experimenta cualquier efecto secundario, hable con su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este prospecto. También puede notificar efectos secundarios directamente a través del Esquema de Tarjeta Amarilla en: [www.mhra.gov.uk/yellowcard](http://www.mhra.gov.uk/yellowcard) o buscar MHRA Yellow Card en Google Play o Apple App Store. Al notificar efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

#### 5. Cómo almacenar VIAGRA CONNECT®

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No almacenar a más de 30°C.

Conservar en el envase original para protegerlo de la humedad.

No use este medicamento después de la fecha de caducidad que se indica en el cartón y el blíster. La fecha de caducidad se refiere al último día de ese mes.

No tire los medicamentos por el desagüe ni los deseche con los residuos domésticos. Pregunte a su farmacéutico cómo desechar los medicamentos que ya no utiliza. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

#### 6. Contenido del envase y otra información

##### Qué contiene VIAGRA CONNECT

- La sustancia activa es sildenafil. Cada tableta contiene 50 mg de sildenafil (como citrato).
- Los otros ingredientes son:  
Núcleo de la tableta: celulosa microcristalina, fosfato de calcio hidrógeno (anhidro), croscarmelosa sódica (ver sección 2 "VIAGRA CONNECT contiene sodio") y estearato de magnesio  
Recubrimiento de película: hipromelosa, dióxido de titanio (E 171), lactosa (ver sección 2 "VIAGRA CONNECT contiene lactosa"), triacetina y laca de aluminio de indigotina (E 132)

##### Cómo es VIAGRA CONNECT y contenido del envase

VIAGRA CONNECT son tabletas recubiertas con película de color azul con forma de diamante redondeado y miden 11.2 mm x 8.1 mm. Están marcadas con 'Pfizer' en un lado y 'V50' en el otro lado.

Las tabletas se presentan en blísteres que contienen 2, 4 u 8 tabletas dentro de un cartón. Es posible que no todos los tamaños de envase se comercialicen.

##### Titular de la Autorización de Comercialización

Upjohn UK Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, UK

Fabricante

Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29, Route des Industries, 37530 Pocé sur Cisse, France

Dirección de contacto de la empresa

Para obtener más información sobre este medicamento, por favor contacte con Información Médica en Pfizer Limited, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey, KT20 7NS. Teléfono: 01304 616161

Este medicamento está autorizado en los Estados Miembros del Área Económica Europea y en el Reino Unido (Irlanda del Norte) bajo los siguientes nombres:

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Noruega:                                  | Viagra Reseptfri                      |
| Polonia:                                  | VIAGRA CONNECT MAX                    |
| Suecia:                                   | Sildenafil Pfizer Consumer Healthcare |
| Irlanda, Reino Unido (Irlanda del Norte): | VIAGRA CONNECT                        |

Este prospecto fue revisado por última vez en 06/2021.

Ref: VC 5\_0