

Pakendi infoleht: teave kasutajale

VIAGRA CONNECT® 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid
sildenafil

Lugege see infoleht hoolikalt läbi enne, kui hakkate seda ravimit võtma, sest see sisaldab teile olulist teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu teie apteeker on teile öelnud.

- Hoidke see infoleht alles. Teil võib olla vaja seda uuesti lugeda.
- Küsige oma apteekrilt, kui vajate lisateavet või nõu.
- Kui teil tekib mingeid kõrvaltoimeid, rääkige oma apteekri või arstiga. See hõlmab kõiki võimalikke kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole loetletud. Vt lõik 4.
- Te peate rääkima arstiga, kui olete võtnud VIAGRA CONNECTi vastavalt juhistele ja ei suutnud saavutada või säilitada piisavalt tugevat erektsiooni seksiks.

Mis on selles infolehes

1. Mis on VIAGRA CONNECT ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne VIAGRA CONNECTi võtmist
3. Kuidas VIAGRA CONNECTi võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas VIAGRA CONNECTi säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on VIAGRA CONNECT® ja milleks seda kasutatakse

Mis on VIAGRA CONNECT

VIAGRA CONNECT sisaldab toimeainet sildenafili, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse fosfodiesteras tüüp 5 (PDE5) inhibiitoriteks. See toimib, lõõgastades teie peenise veresooni, võimaldades verel voolata teie peenisesse, kui olete seksuaalselt erutatud, ja põhjustades erektsiooni. VIAGRA CONNECT aitab teil saavutada erektsiooni ainult siis, kui olete seksuaalselt erutatud (stimuleeritud).

Milleks kasutatakse VIAGRA CONNECT-i

VIAGRA CONNECT on ravi meestele vanuses 18 aastat ja vanemad, kellel on erektsioonihäired.

Erektsioonihäired, tuntud ka kui impotentsus, on suutmatus saavutada või säilitada erektsiooni, mis on piisavalt tugev seksimiseks. Erektsioonid sõltuvad paljudest erinevatest teguritest, sealhulgas korralikust verevoolust peenisesse. Vähendatud verevool peenisesse võib põhjustada erektsioonihäireid. Erektsioonihäired võivad mõjutada mehi erinevalt. Mõned ei suuda saavutada erektsiooni. Teised võivad saavutada erektsiooni, kuid mitte piisavalt tugeva seksimiseks või nad võivad kaotada erektsiooni enne või seksi ajal.

2. Mida peate teadma enne VIAGRA CONNECT® võtmist

Ärge võtke VIAGRA CONNECT-i, kui te:
teil ei ole erektsiooniprobleemi

võtate nitraatravimeid rindkerevalu või südamepuudulikkuse korral (vt „Muud ravimid ja VIAGRA CONNECT“)

võtate amüülnitriti, nn „poppersit“ kui meelelahutuslikke uimasteid

võtate riotsiguaati (või muid guanülaattsüklaasi stimulaatoreid) kõrge vererõhu korral kopsudes (vt „Muud ravimid ja VIAGRA CONNECT“)

võtate ritonaviiri HIV-i raviks (vt „Muud ravimid ja VIAGRA CONNECT“)

teile on arst soovitanud vältida seksuaalset aktiivsust südame või veresoonte probleemide tõttu (vt „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“)

teil on tõsine südameprobleem, nagu hiljutine südameatakk või insult (viimase 6 kuu jooksul), ebastabiilne stenokardia (rindkerevalu) või raske südamepuudulikkus (südame pumpamisvõime vähenemine) • teil on tõsine maksaprobleem

teil on madal vererõhk (alla 90/50 mmHg), mis võib põhjustada sümptomeid nagu väsimus, pearinglus, kergemeelsus, iiveldus, külm ja niiske nahk, depressioon, teadvusekaotus või ähmane nägemine

teil on kunagi olnud tõsine nägemise kaotus närvikahjustuse tõttu silmades, nagu mittearteriitiline eesmine isheemiline optiline neuropaatia (NAION); või teil on haruldane pärilik silmahaigus, nagu retinitis pigmentosa (vt „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“)

teil on deformeerunud peenis

olete naine

on alla 18-aastased

on allergilised sildenafili või selle ravimi mis tahes muu koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6)

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Peaksite planeerima tervisekontrolli oma arstiga nii kiiresti kui võimalik esimese 6 kuu jooksul pärast VIAGRA CONNECTi kasutamise alustamist, et veenduda, et teie erektsiooniprobleemid ei ole põhjustatud tõsisest tervislikust seisundist.

Erektsioonihäired võivad olla varajane märk:

- kardiovaskulaarsest haigusest
- diabeedist
- kõrgest vererõhust
- kõrgest kolesteroolist

Rääkige oma arstile oma probleemidest, kui te pole seda veel teinud.

Kardiovaskulaarsed riskitegurid

Seksuaalne aktiivsus võib teie südamele koormust tekitada (vt eespool „Ärge võtke VIAGRA CONNECTi, kui te“).

Rääkige oma arstiga enne VIAGRA CONNECTi võtmist, kui te:

- muutute väga hingetuks või tunnete kerge või mõõduka tegevuse ajal valu rinnus (nt kõnnite kiiresti 20 minutit või ronite kahele trepimarsile). Teie arst võib vajada kontrollimist, kas teie süda suudab seksuaalvahekorra lisakoormust taluda.
- teil on probleem südameklapiga (klapirike).
- teil on haigus, mille korral südamelihhas muutub põletikuliseks ja ei tööta nii hästi kui peaks (kardiomiopaatia).
- teil on ebaregulaarne südame tegevus (arütmia).
- teil on olnud operatsioon, et parandada verevoolu südamesse, või teil on kõrge vererõhk, mis on nüüd piisavalt ravitud.

teil on kõrge vererõhk, mida ei kontrollita.

Muud riskitegurid:

Rääkige oma arstiga enne VIAGRA CONNECTi võtmist, kui te:

on kunagi olnud erektsioon, mis kestis üle 4 tunni (priapism). Mõned seisundid võivad suurendada püsiva erektsiooni tõenäosust, nagu sirprakuline aneemia (punaste vereliblede anomaalia), leukeemia (vererakkude vähk) või hulgimüeloom (luuüdi vähk). Impotentsuse ravimite kasutamine võib suurendada priapismi riski. Pikaajaline erektsioon võib põhjustada peenise koe kahjustusi ja püsivat erektsioonivõime kaotust.

on maohaavand või verejooksuhäire (näiteks hemofiilia).

on varem diagnoositud kerge kuni mõõdukas maksahaigus või rasked neeruprobleemid. VIAGRA CONNECT ei pruugi teile sobida, peaksite enne VIAGRA CONNECTi võtmist konsulteerima oma arstiga.

Kui teil tekib äkiline nägemishäire, peaksite VIAGRA CONNECTi võtmise lõpetama ja viivitamatult oma arstiga ühendust võtma. Sildenafili kasutamisel on teatatud nägemishäiretest.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei tohi anda alla 18-aastastele lastele ega noorukitele.

Teised ravimid ja VIAGRA CONNECT

Õelge oma apteekrile või arstile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või võite võtta mingeid muid ravimeid. Mõned ravimid võivad mõjutada VIAGRA CONNECTi või võivad need mõjutada, kuidas VIAGRA CONNECT toimib, ja see võib põhjustada kõrvaltoimeid.

Ärge kasutage VIAGRA CONNECTi, kui te võtate:

Nitraatravimid: Ärge võtke VIAGRA CONNECTi, kui te võtate nitraatravimeid (nagu glütserüültrinitraat, isosorbiidmononitraat, isosorbiiddinitraat) rindkerevalu (stenokardia) või südamepuudulikkuse vastu või „poppersit“ kui meelelahutuslikke uimasteid (lämmastikoksiidi doonorid (nagu amüülnitrit), nikorandil või naatriumnitroprussiid). See on sellepärast, et need ained võivad koos VIAGRA CONNECTiga võetuna põhjustada ohtlikku vererõhu langust.

Riociguat: Ärge võtke VIAGRA CONNECTi, kui te võtate ravimit nimega riociguat (või muid ravimeid, mis kuuluvad guanülaattsüklaasi stimulaatorite rühma). Riociguat kasutatakse kõrge vererõhu raviks kopsudes ja võib koos VIAGRA CONNECTiga võetuna põhjustada ohtlikku vererõhu langust.

HIV-infektsioonide ravimid: Ritonaviir on ravim, mida kasutatakse HIV-infektsioonide raviks. Ärge võtke VIAGRA CONNECTi, kui te võtate ritonaviiri, kuna see kombinatsioon võib põhjustada ohtlikku vererõhu langust.

Rääkige oma apteekri või arstiga enne VIAGRA CONNECTi kasutamist, kui te võtate:

Seeneinfektsioonide ja antibiootikumide ravimid: Seeneinfektsioonide ravimid, mida nimetatakse itrakonasoolikaks või ketokonasoolikaks, ja antibiootikum nimega erütromütsiin suurendavad VIAGRA CONNECTi kontsentratsiooni kehas ja võivad põhjustada kõrvaltoimeid. Peaksite enne VIAGRA CONNECTi võtmist nende ravimite kasutamisel oma arstiga ühendust võtma.

Kõrvetiste ravi: Kõrvetiste raviks kasutatav ravim, tsimetidiin, suurendab VIAGRA CONNECTi kontsentratsiooni kehas ja võib põhjustada kõrvaltoimeid. Peaksite enne VIAGRA CONNECTi võtmist oma arstiga ühendust võtma.

Muud erektsioonihäirete ravimeetodid: VIAGRA CONNECTi ja teiste erektsioonihäirete ravimeetodite kombinatsioonide ohutust ja efektiivsust ei ole uuritud ning seetõttu ei ole see kombinatsioon soovitatav.

Alfa-blokaatorid, mida kasutatakse kuseteede probleemide või kõrge vererõhu raviks: Alfa-blokaatorid, mida kasutatakse suurenenud eesnäärme tõttu tekkivate kuseteede probleemide raviks (nagu alfososiin, doksasosiin või tamsulosiin), võivad põhjustada pearinglust, kergemeelsust, iiveldust, minestamist, keskendumisvõime puudumist või ähmast nägemist madala vererõhu tõttu (sümptomaatiline hüpotensioon).

VIAGRA CONNECT koos toidu ja joogiga

VIAGRA CONNECTi võib võtta koos toiduga või ilma. Kui seda ravimit võetakse pärast rasvarikast einet, võib selle toime algus veidi kauem aega võtta.

Ärge võtke VIAGRA CONNECTi koos greibi või greibimahлага, sest see võib mõjutada ravimi toimet.

Liigne alkoholi tarbimine võib ajutiselt vähendada teie võimet erektsiooni saavutada.

Ravimist kasu saamiseks on soovitatav mitte juua suuri koguseid alkoholi enne seksuaalset tegevust.

Rasedus, imetamine ja viljakus Seda ravimit ei tohi naised kasutada.

Autojuhtimine ja masinate käsitlemine

VIAGRA CONNECT võib põhjustada pearinglust ja mõjutada teie nägemist. Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid, kui teil esinevad need kõrvaltoimed pärast selle ravimi võtmist.

VIAGRA CONNECT sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et teil on talumatus teatud suhkrute suhtes, võtke enne selle ravimi võtmist ühendust oma arstiga.

VIAGRA CONNECT sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) tableti kohta, see tähendab sisuliselt 'naatriumivaba'.

3. Kuidas VIAGRA CONNECT®-i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu apteeker või arst on teile öelnud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma apteekri või arstiga.

Võtke 1 tablett vastavalt vajadusele umbes 1 tund enne seksuaalset tegevust.

Neelake tablett tervelt koos veega.

Ärge võtke rohkem kui 1 tablett päevas.

VIAGRA CONNECT aitab teil erektsiooni saavutada ainult siis, kui olete seksuaalselt erutatud. Teie ja teie partner peaksid eelmängu tegema samamoodi nagu siis, kui te ei võtaks erektsioonihäirete ravimit.

Selle ravimi toime algusaeg varieerub inimeseti, kuid tavaliselt kulub 30 kuni 60 minutit. Võite seda võtta kuni 4 tundi enne seksuaalset tegevust.

Olge rahulik ja kannatlik, kui VIAGRA CONNECT ei aita teid esimesel korral. Võite proovida hiljem uuesti, kuid pidage meeles, et võite võtta ainult 1 tableti päevas. Enamiku meeste jaoks toimib VIAGRA CONNECT esimesel või teisel katsel. Kui on möödunud mõni aeg, kui te ei suutnud erektsiooni saavutada või säilitada, võib soovitud efekti saavutamiseks kuluda paar katset. Rääkige oma arstiga, kui olete proovinud VIAGRA CONNECTi ja ei suuda endiselt erektsiooni saavutada ja säilitada.

Kui tunnete, et VIAGRA CONNECTi toime on liiga tugev, rääkige oma apteekri või arstiga.

Kui te võtate rohkem VIAGRA CONNECTi kui peaksite

Kui te võtate rohkem tablette kui soovitatud, võtke kohe ühendust oma apteekri või arstiga. Soovitatust suurema annuse võtmine võib põhjustada kõrvaltoimeid ja/või raskemaid kõrvaltoimeid.

Kui teil on selle ravimi kasutamise kohta lisaküsimusi, küsige oma apteekrilt või arstilt.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Need kõrvaltoimed on tavaliselt kerged kuni mõõdukad ja lühiajalised.

Pöörduge kohe arsti poole, kui teil esineb mõni järgmistest tõsisest kõrvaltoimetest:

Rindkerevalu: see esineb harva. Kui see tekib enne, ajal või pärast seksuaalset tegevust: võtke poolistuv asend ja proovige lõõgastuda. Ärge kasutage nitraate oma rindkerevalu raviks.

Pikaajaline ja mõnikord valulik erektsioon, mis kestab kauem kui 4 tundi: see esineb harva.

Äkiline nägemise vähenemine või kaotus: see esineb harva.

Allergiline reaktsioon: see esineb harva. Süntomiteks on äkiline vilistav hingamine, hingamisraskused või pearinglus, silmalaugude, näo, huulte või kurgu turse.

Tõsised nahareaktsioonid nagu Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS) ja toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN): see esineb harva. Süntomiteks võivad olla naha tugev koorumine ja turse, suu, suguelundite ja silmade ümbruse villid ning palavik.

Krambid või hoog: see esineb harva.

Muud kõrvaltoimed

Väga sage (võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st):
peavalu

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st):
iiveldus, seedehäired, kinnine nina, pearinglus

näo punetus, kuumahoog (äkiline kuumatunne ülakehas)
nägemise värvimuutus, ähmane nägemine, nägemishäired

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

oksendamine, ülakõhuvalu, happe tagasivool (sealhulgas kõrvetised)
nahalööve, valu kätes või jalgades, ninaverejooks, kuumatunne, väsimustunne (väsimus)
silmaärritus, punetavad silmad/punased silmad, silmavalu, valgussähvatuste nägemine, visuaalne heledus, valgustundlikkus, vesised silmad
tugev südamelöök, kiire südamelöök
kõrge vererõhk
madal vererõhk (tüüpilised tunnused on pearinglus, minestamine, ähmane nägemine, iiveldus ja väsimus)
lihasvalu, unisustunne, vähenenud puuetundlikkus, vertiigo, kõrvade helin
kuiv suu, blokeeritud või kinnine nina, nina limaskesta põletik (võib esineda nohu, aevastamise ja kinnise ninana)
vere esinemine uriinis

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

minestamine, kuiv nina, nina sisemuse turse, ärrituvustunne ja äkiline kuulmise vähenemine või kaotus
äkiline ootamatu surm südamefunktsiooni kaotuse tõttu (äkiline südame seiskumine), insult, südameatakk, valu rinnus (stenokardia), ebaregulaarne südametegevus, ajutine verevoolu vähenemine aju osadesse
kurgutõmbetunne, tuim suu
verejooks silma tagaosas, kahelinägemine, nägemisteravuse vähenemine, ebatavaline tunne silmas, silma või silmalau turse, väikesed osakesed või täpid nägemises, halode nägemine valgusallikate ümber, silma pupilli laienemine, silmavalge värvimuutus
peenise veritsus, vere esinemine seemnevedelikus

Kõrvaltoimete teatamine

Kui teil tekib mingeid kõrvaltoimeid, rääkige oma arsti, apteekri või õega. See hõlmab kõiki võimalikke kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole loetletud. Samuti saate kõrvaltoimetest otse teatada Kollase Kaardi skeemi kaudu aadressil: www.mhra.gov.uk/yellowcard või otsige MHRA Yellow Card Google Play või Apple App Store'is. Kõrvaltoimetest teatades saate aidata anda rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

5. Kuidas säilitada VIAGRA CONNECT®

Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge hoidke temperatuuril üle 30°C.
Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud karbil ja blistril.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid ära kanalisatsiooni või olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida VIAGRA CONNECT sisaldab

- Toimeaine on sildenafiliil. Iga tablett sisaldab 50 mg sildenafiliili (tsitraadina).
- Muud koostisosad on:
Tableti südamik: mikrokristalne tselluloos, kaltsiumvesinikfosfaat (veevaba), kroskarmelloosnaatrium (vt lõik 2 „VIAGRA CONNECT sisaldab naatriumi”) ja magneesiumstearaat. Kilekate: hüpromelloos, titaandioksiid (E 171), laktoos (vt lõik 2 „VIAGRA CONNECT sisaldab laktoosi”), triatsetiin ja indigokarmiini alumiiniumlake (E 132).

Milline VIAGRA CONNECT välja näeb ja pakendi sisu

VIAGRA CONNECT on sinised kilekattega tabletid, millel on ümar-teemant kuju ja mõõtmed 11,2 mm x 8,1 mm. Ühel küljel on märgistus 'Pfizer' ja teisel küljel 'V50'. Tabletid on saadaval blisterpakendites, mis sisaldavad 2, 4 või 8 tabletti karbis. Kõiki pakendi suurusi ei pruugita turustada.

Müügiloo hoidja

Upjohn UK Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ühendkuningriik

Tootja

Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29, Route des Industries, 37530 Pocé sur Cisse, Prantsusmaa

Ettevõtte kontaktaadress

Lisateabe saamiseks selle ravimi kohta võtke ühendust Pfizer Limited meditsiiniinfo osakonnaga, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey, KT20 7NS. Telefon: 01304 616161

See ravim on Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides ja Ühendkuningriigis (Põhja-lirimaa) müügiloo saanud järgmiste nimede all:

Norra:	Viagra Reseptfri
Poola:	VIAGRA CONNECT MAX
Rootsi:	Sildenafilil Pfizer Consumer Healthcare
lirimaa, Ühendkuningriik (Põhja-lirimaa):	VIAGRA CONNECT

Seda infolehte uuendati viimati 06/2021.

Viide: VC 5_0