

Bipacksedel: Information till användaren

VIAGRA CONNECT® 50 mg filmdragerade tabletter  
sildenafil

Läs hela denna bipacksedel noggrant innan du börjar ta detta läkemedel eftersom den innehåller viktig information för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din apotekare.

- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
- Fråga din apotekare om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med din apotekare eller läkare. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.
- Du måste prata med en läkare om du har tagit VIAGRA CONNECT enligt anvisningarna och inte kunde få eller behålla en erektion tillräckligt fast för sex.

Vad denna bipacksedel innehåller

1. Vad VIAGRA CONNECT är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar VIAGRA CONNECT
3. Hur du tar VIAGRA CONNECT
4. Eventuella biverkningar
5. Hur VIAGRA CONNECT ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övrig information

1. Vad VIAGRA CONNECT® är och vad det används för

Vad VIAGRA CONNECT är

VIAGRA CONNECT innehåller den aktiva substansen sildenafil, som tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5 (PDE5)-hämmare. Det verkar genom att slappna av blodkärlen i din penis, vilket tillåter blod att flöda in i din penis när du blir sexuellt upphetsad och orsakar en erektion. VIAGRA CONNECT hjälper dig endast att få en erektion om du är sexuellt upphetsad (stimulerad).

Vad VIAGRA CONNECT används för

VIAGRA CONNECT är en behandling för män som är 18 år och äldre med erektil dysfunktion.

Erektil dysfunktion, även känd som impotens, är en oförmåga att uppnå eller bibehålla en erektion som är tillräckligt fast för att ha sex. Erektioner beror på många olika faktorer, inklusive korrekt blodflöde till penis. Minskat blodflöde till penis kan orsaka erektil dysfunktion. Erektil dysfunktion kan påverka män på olika sätt. Vissa kan inte uppnå en erektion. Andra kan uppnå en erektion, men inte tillräckligt fast för att ha sex eller de kan förlora erektionen före eller under sex.

2. Vad du behöver veta innan du tar VIAGRA CONNECT®

Ta inte VIAGRA CONNECT om du:  
inte har ett erektionsproblem

tar någon nitratmedicin för bröstsmärta eller hjärtsvikt (se "Andra läkemedel och VIAGRA CONNECT")  
tar amyl nitrit, så kallade "poppers" som rekreationsdroger  
tar riociguat (eller andra guanylatcyklasstimulerare) för högt blodtryck i lungorna (se "Andra läkemedel och VIAGRA CONNECT")  
tar ritonavir för behandling av HIV (se "Andra läkemedel och VIAGRA CONNECT")  
har blivit rådd av din läkare att undvika sexuell aktivitet på grund av ett problem med ditt hjärta eller blodkärl (se "Varningar och försiktighetsåtgärder")  
har ett allvarligt hjärtproblem som en nyligen hjärtinfarkt eller stroke (inom de senaste 6 månaderna), instabil angina (bröstsmärta) eller svår hjärtsvikt (minskad pumpkapacitet i hjärtat) • har ett allvarligt leverproblem  
har lågt blodtryck (under 90/50 mmHg) vilket kan orsaka symtom som trötthet, yrsel, lättthet, illamående, kallsvettig hud, depression, medvetlöshet eller suddig syn  
någonsin har haft allvarlig synförlust på grund av nervskada i ögonen, såsom icke-arteritisk främre ischemisk optisk neuropati (NAION); eller har en sällsynt ärftlig ögonsjukdom, såsom retinitis pigmentosa (se "Varningar och försiktighetsåtgärder")  
har en deformerad penis  
är en kvinna  
är under 18 år  
är allergisk mot sildenafil eller något av de andra ingredienserna i denna medicin (listade i avsnitt 6)

#### Varningar och försiktighetsåtgärder

Du bör boka en hälsokontroll med din läkare så snart som möjligt inom de första 6 månaderna efter att du börjat använda VIAGRA CONNECT för att säkerställa att dina erektionsproblem inte orsakas av någon allvarlig hälsotillstånd.

Erekttil dysfunktion kan vara ett tidigt tecken på:

- hjärt-kärlsjukdom
- diabetes
- högt blodtryck
- högt kolesterol

Berätta för din läkare om dina problem om du inte redan har gjort det.

#### Kardiovaskulära riskfaktorer

Sexuell aktivitet kan belasta ditt hjärta (se "Ta inte VIAGRA CONNECT om du" ovan).

Prata med din läkare innan du tar VIAGRA CONNECT om du:

- blir mycket andfådd eller känner smärta i bröstet vid lätt eller måttlig aktivitet (t.ex. gå raskt i 20 minuter eller gå uppför två trappor). Din läkare kan behöva kontrollera om ditt hjärta klarar den extra belastningen av att ha sex.
- har ett problem med en klaff i ditt hjärta (klaffsjukdom).
- har en sjukdom där hjärtmuskeln blir inflammerad och inte fungerar så bra som den borde (kardiomyopati).
- har en oregelbunden hjärtrytm (arytmi).
- du har genomgått en operation för att förbättra blodflödet till ditt hjärta, eller du har högt blodtryck som nu är tillräckligt behandlat.
- har högt blodtryck som inte är kontrollerat.

Andra riskfaktorer:

Prata med din läkare innan du tar VIAGRA CONNECT om du:

någonsin har haft en erektion som varade mer än 4 timmar (priapism). Vissa tillstånd kan öka sannolikheten för att få en ihållande erektion, såsom sicklecellanemi (en avvikelse i röda blodkroppar), leukemi (cancer i blodceller) eller multipelt myelom (cancer i benmärg). Användning av impotensmediciner kan öka risken för priapism. Långvarig erektion kan orsaka skador på vävnaden i penis och permanent förlust av förmågan att få erektion.

har magsår eller en blödningsstörning (såsom hemofili).

tidigare har diagnostiserats med mild till måttlig leversjukdom eller allvarliga njurproblem. VIAGRA CONNECT kanske inte är lämpligt för dig, du bör rådfråga din läkare innan du tar VIAGRA CONNECT.

Om du upplever någon plötslig synnedsättning bör du sluta ta VIAGRA CONNECT och omedelbart kontakta din läkare. Fall av synpåverkan har rapporterats vid användning av sildenafil.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte ges till barn eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och VIAGRA CONNECT

Tala om för din apotekare eller läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan komma att ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverkas av VIAGRA CONNECT eller de kan påverka hur VIAGRA CONNECT fungerar och detta kan resultera i biverkningar.

Använd inte VIAGRA CONNECT om du tar:

Nitrater: Ta inte VIAGRA CONNECT om du tar nitrater (såsom glyceryltrinitrat, isosorbidmononitrat, isosorbiddinitrat) mot bröstsmärta (angina pectoris) eller hjärtsvikt eller "poppers" som rekreationsdroger (kväveoxidatorer (såsom amylnitrit), nicorandil eller natriumnitroprussid). Detta beror på att dessa substanser kan leda till ett farligt blodtrycksfall om de tas tillsammans med VIAGRA CONNECT.

Riociguat: Ta inte VIAGRA CONNECT om du tar ett läkemedel som heter riociguat (eller andra läkemedel i en grupp som kallas guanylatcyklasstimulatorer). Riociguat används för att behandla högt blodtryck i lungorna och kan leda till ett farligt blodtrycksfall om det tas tillsammans med VIAGRA CONNECT.

Läkemedel för att behandla HIV-infektioner: Ritonavir är ett läkemedel som används för att behandla HIV-infektioner. Ta inte VIAGRA CONNECT om du tar ritonavir eftersom denna kombination kan leda till ett farligt blodtrycksfall.

Prata med din apotekare eller läkare innan du använder VIAGRA CONNECT om du tar:

Läkemedel för att behandla svampinfektioner och antibiotika: Läkemedel för att behandla svampinfektioner som kallas itrakonazol eller ketokonazol och ett antibiotikum som kallas erytromycin ökar koncentrationen av VIAGRA CONNECT i kroppen och kan resultera i biverkningar. Du bör kontakta din läkare innan du tar VIAGRA CONNECT om du använder dessa läkemedel.

Halsbrännebehandling: Läkemedlet för att behandla halsbränna, cimetidin, ökar koncentrationen av VIAGRA CONNECT i kroppen och kan resultera i biverkningar. Du bör kontakta din läkare innan du tar VIAGRA CONNECT.

Andra behandlingar för erektil dysfunktion: Säkerheten och effekten av kombinationer av VIAGRA CONNECT med andra behandlingar för erektil dysfunktion har inte studerats och denna kombination rekommenderas därför inte. Alfa-blockerare som används för att behandla urineringsproblem eller högt blodtryck: Alfa-blockerare som används för att behandla urineringsproblem på grund av förstora prostata (såsom alfuzosin, doxazosin eller tamsulosin) kan leda till yrsel, lättthet i huvudet, illamående, svimning, brist på koncentration eller dimsyn på grund av lågt blodtryck (symtomatisk hypotension).

VIAGRA CONNECT med mat och dryck

VIAGRA CONNECT kan tas med eller utan mat. När detta läkemedel tas efter en fettrik måltid kan det ta lite längre tid att börja verka.

Ta inte VIAGRA CONNECT med grapefrukt eller grapefruktjuice, eftersom detta kan påverka hur medicinen fungerar.

Att dricka överdrivet mycket alkohol kan tillfälligt minska din förmåga att få erektion. För att få nytta av medicinen rekommenderas du att inte dricka stora mängder alkohol före sexuell aktivitet.

Graviditet, amning och fertilitet Denna medicin ska inte användas av kvinnor.

Körning och användning av maskiner

VIAGRA CONNECT kan orsaka yrsel och kan påverka din syn. Kör inte eller använd maskiner om du lider av dessa biverkningar efter att ha tagit denna medicin.

VIAGRA CONNECT innehåller laktos

Om din läkare har sagt att du har en intolerans mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

VIAGRA CONNECT innehåller natrium

Denna medicin innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, det vill säga i princip 'natriumfri'.

### 3. Hur man tar VIAGRA CONNECT®

Ta alltid denna medicin exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt vad din apotekare eller läkare har sagt till dig. Kontrollera med din apotekare eller läkare om du är osäker.

Ta 1 tablett, vid behov, cirka 1 timme före sexuell aktivitet.

Svälj tabletten hel med vatten.

Ta inte mer än 1 tablett per dag.

VIAGRA CONNECT hjälper dig endast att få erektion om du är sexuellt upphetsad. Du och din partner bör ägna er åt förspel precis som ni skulle göra om ni inte tog en medicin för erektil dysfunktion.

Den tid det tar för denna medicin att verka varierar från person till person, men det tar normalt mellan 30 till 60 minuter. Du kan ta den upp till 4 timmar före sexuell aktivitet.

Slappna av och ha tålamod om VIAGRA CONNECT inte hjälper dig första gången. Du kan försöka igen senare men kom ihåg att du bara kan ta 1 tablett per dag. För de flesta män fungerar VIAGRA CONNECT första eller andra gången de provar det. Om det har gått en tid sedan du kunde få eller behålla en erektion kan det ta ett par försök innan du uppnår önskad effekt. Prata med din läkare om du har provat VIAGRA CONNECT och fortfarande inte kan få och behålla en erektion.

Om du känner att effekten av VIAGRA CONNECT är för stark, prata med din apotekare eller läkare.

Om du tar mer VIAGRA CONNECT än du borde  
Om du tar fler tabletter än rekommenderat, kontakta din apotekare eller läkare omedelbart. Att ta mer än den rekommenderade dosen kan resultera i biverkningar och/eller mer allvarliga biverkningar.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din apotekare eller läkare.

#### 4. Möjliga biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar även om inte alla får dem. Dessa biverkningar är vanligtvis milda till måttliga och av kort varaktighet.

Sök omedelbart medicinsk hjälp om du upplever något av följande allvarliga biverkningar:

Bröstsmärtor: detta förekommer sällan. Om detta inträffar före, under eller efter sexuell aktivitet: Sätt dig i en halvsittande position och försök att slappna av.

Använd INTE nitrater för att behandla din bröstsmärta.

En förlängd och ibland smärtsam erektion som varar längre än 4 timmar: detta förekommer sällan.

En plötslig minskning eller förlust av syn: detta förekommer sällan.

En allergisk reaktion: detta förekommer sällan. Symtom inkluderar plötslig väsande andning, andningssvårigheter eller yrsel, svullnad av ögonlock, ansikte, läppar eller hals.

Allvarliga hudreaktioner såsom Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN): detta förekommer sällan. Symtom kan inkludera svår avflagning och svullnad av huden, blåsor i munnen, könsorganen och runt ögonen samt feber.

Anfall eller kramper: detta förekommer sällan.

#### Andra biverkningar

Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 personer):  
huvudvärk

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer):  
illamående, matsmältningsbesvär, täppt näsa, yrsel  
ansiktsrodnad, värmevallning (en plötslig känsla av värme i överkroppen)  
färgskiftning i synen, dimsyn, synstörning

Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer):

kräkningar, smärta i övre delen av buken, sura uppstötningar (inklusive halsbränna)  
hudutslag, smärta i armar eller ben, näsblod, känsla av värme, trötthet (fatigue)  
ögonirritation, blodsprängda ögon/röda ögon, ögonsmärta, se ljusblixtar, visuell  
ljusstyrka, ljuskänslighet, tårögda ögon  
bultande hjärtslag, snabb hjärtslag  
högt blodtryck  
lågt blodtryck (typiska tecken är yrsel, svimning, dimsyn, illamående och trötthet)  
muskelsmärta, sömnhet, nedsatt känsel, yrsel, ringningar i öronen  
torr mun, blockerade eller täppta bihålor, inflammation i näslemhinnan (kan  
upplevas som rinnande näsa, nysningar och täppt näsa)  
förekomst av blod i urinen

Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1 000 personer):

svimning, torr näsa, svullnad av insidan av näsan, irritabilitet och plötslig minskning  
eller förlust av hörsel  
plötslig oväntad död orsakad av förlust av hjärtfunktion (plötsligt hjärtstopp),  
stroke, hjärtinfarkt, bröstsmärtor (angina), oregelbunden hjärtslag, tillfälligt minskat  
blodflöde till delar av hjärnan  
känsla av åstämning i halsen, domnad mun  
blödning i ögonbotten, dubbelseende, nedsatt synskärpa, onormal känsla i ögat,  
svullnad av ögat eller ögonlocket, små partiklar eller fläckar i synfältet, se ljusglorior  
runt ljus, pupillutvidgning, missfärgning av ögonvitan  
penisblödning, förekomst av blod i sädesvätskan

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.  
Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också  
rapportera biverkningar direkt via Yellow Card Scheme på: [www.mhra.gov.uk/yellowcard](http://www.mhra.gov.uk/yellowcard)  
eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple App Store. Genom att  
rapportera biverkningar kan du hjälpa till att ge mer information om säkerheten för detta  
läkemedel.

## 5. Hur man förvarar VIAGRA CONNECT®

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara inte över 30°C.

Förvara i originalförpackningen för att skydda mot fukt.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på kartongen och blistret.  
Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.

Kasta inte läkemedel i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man  
kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder hjälper till att skydda miljön.

## 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

## Vad VIAGRA CONNECT innehåller

- Den aktiva substansen är sildenafil. Varje tablett innehåller 50 mg sildenafil (som citrat).
- De övriga ingredienserna är:  
Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat (vattenfritt), kroskarmellosnatrium (se avsnitt 2 "VIAGRA CONNECT innehåller natrium") och magnesiumstearat  
Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E 171), laktos (se avsnitt 2 "VIAGRA CONNECT innehåller laktos"), triacetin och indigokarmin aluminiumlack (E 132)

## Hur VIAGRA CONNECT ser ut och förpackningens innehåll

VIAGRA CONNECT är blå filmdragerade tabletter med en rundad diamantform och mäter 11,2 mm x 8,1 mm. De är märkta 'Pfizer' på ena sidan och 'V50' på den andra sidan. Tabletterna tillhandahålls i blisterförpackningar innehållande 2, 4 eller 8 tabletter inom en kartong.

Alla förpackningsstorlekar kanske inte marknadsförs.

## Innehavare av godkännande för försäljning

Upjohn UK Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, UK

## Tillverkare

Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29, Route des Industries, 37530 Pocé sur Cisse, Frankrike

## Företagets kontaktadress

För ytterligare information om denna medicin, vänligen kontakta Medicinsk Information på Pfizer Limited, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey, KT20 7NS. Telefon: 01304 616161

Denna medicin är godkänd i medlemsstaterna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Storbritannien (Nordirland) under följande namn:

Norge:	Viagra Reseptfri
Polen:	VIAGRA CONNECT MAX
Sverige:	Sildenafil Pfizer Consumer Healthcare
Irland, Storbritannien (Nordirland):	VIAGRA CONNECT

Denna bipacksedel uppdaterades senast 06/2021.

Ref: VC 5\_0