

Packungsbeilage: Informationen für den Patienten

Viridal duo® 10/20/40 Mikrogramm/ml Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung Alprostadil

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, da sie wichtige Informationen enthält.

Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie sie später nochmals lesen.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es könnte ihnen schaden, auch wenn deren Krankheitssymptome dieselben sind wie Ihre.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was Viridal Duo ist und wofür es angewendet wird
2. Was Sie vor der Anwendung von Viridal Duo wissen müssen
3. Wie ist Viridal Duo anzuwenden
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Wie ist Viridal Duo aufzubewahren
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

1. Was Viridal Duo ist und wofür es angewendet wird

Viridal Duo enthält den Wirkstoff Alprostadil, der zu einer Gruppe von Arzneimitteln gehört, die zur Behandlung der erektilen Dysfunktion eingesetzt werden. Dieses Arzneimittel wirkt, indem es die Blutgefäße erweitert und den Blutfluss zu Ihrem Penis erhöht.

Viridal Duo wird bei erwachsenen Männern angewendet:

um Ihnen zu helfen, eine Erektion zu bekommen und aufrechtzuerhalten von Ihrem Arzt, um zu testen, ob Sie an Impotenz leiden.

Viridal Duo kommt in einer Glaskartusche mit zwei Kammern.

Eine Kammer enthält Alprostadil, die andere enthält Natriumchloridlösung. Diese werden gemischt, um eine Lösung herzustellen, die in den Penis injiziert wird.

2. Was Sie vor der Anwendung von Viridal Duo wissen müssen

Verwenden Sie Viridal Duo nicht:

wenn Sie allergisch gegen Alprostadil oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind (aufgeführt in Abschnitt 6).

wenn Sie an Sichelzellenanämie (abnormale rote Blutkörperchen) leiden

wenn Sie Leukämie (Krebs der Blutzellen) haben

wenn Sie ein multiples Myelom (Tumor des Knochenmarks) haben

wenn Sie ein Implantat im Penis haben

wenn Ihnen aus gesundheitlichen Gründen wie Herzproblemen oder einem kürzlichen Schlaganfall vom Geschlechtsverkehr abgeraten wurde

wenn Sie an der Peyronie-Krankheit oder an Narbenbildung oder Deformitäten des Penis oder der Vorhaut leiden.

Wenn einer der oben genannten Punkte auf Sie zutrifft, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Viridal Duo anwenden

wenn Sie einen oder mehrere kardiovaskuläre Risikofaktoren haben (dazu können Bluthochdruck, Tabakkonsum, erhöhter Blutzucker, erhöhter Cholesterinspiegel, Übergewicht und Fettleibigkeit gehören)

wenn Sie Herzprobleme haben oder jemals hatten

wenn Sie Ohnmachtsanfälle und Bewusstlosigkeit erlebt haben oder jemals erlebt haben

wenn Sie kurzfristige Veränderungen Ihrer Sprache, Ihres Hörens oder Sehens hatten

wenn Sie an Lungenproblemen leiden

wenn Sie einen oder mehrere Risikofaktoren für einen Schlaganfall haben (dazu können Bluthochdruck, erhöhter Bluthochdruck, koronare Herzkrankheit, Herzrhythmusstörungen, Diabetes gehören)

wenn Sie an einer Blutgerinnungskrankheit leiden

wenn Sie Magenblutungen oder Blutungen aus dem Darm haben oder jemals hatten.

Möglicherweise müssen Sie weitere Tests durchführen lassen, bevor Ihr Arzt Ihnen diese Behandlung geben kann (zum Beispiel einen Belastungstest und Tests zur Überprüfung anderer behandelbarer Ursachen von Impotenz).

Eine Erektion, die länger als vier Stunden anhält, kann gefährlich sein. Daher sollten Sie sofort Ihren Arzt informieren oder, falls dieser nicht verfügbar ist, sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, wenn eine Erektion länger als vier Stunden anhält.

Viridal Duo schützt Sie oder Ihren Partner nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten wie Chlamydien, Gonorrhö, Herpes-simplex-Virus, viraler Hepatitis, HIV, Genitalwarzen oder Syphilis.

Da es zu einer leichten Blutung an der Injektionsstelle kommen kann, ist es besonders wichtig, dass Sie ein Kondom verwenden, um sexuell übertragbare Krankheiten zu vermeiden.

Viridal Duo sollte nicht von Patienten mit Drogenabhängigkeit, psychischen Erkrankungen oder geistiger Behinderung verwendet werden.

Möglicherweise müssen Sie regelmäßige Nachuntersuchungen bei Ihrem Arzt durchführen lassen, um die Bildung von Narbengewebe am Penis zu überprüfen.

#### Andere Medikamente und Viridal Duo

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Medikamente einnehmen, kürzlich eingenommen haben oder einnehmen könnten.

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie eines der folgenden Medikamente einnehmen:

Medikamente zur Behandlung von Depressionen, bekannt als MAO-Hemmer, wie Phenelzin. Bei gleichzeitiger Einnahme mit Viridal Duo können diese sehr hohen Blutdruck verursachen

Andere Medikamente, die in den Penis injiziert werden, zur Behandlung von Erektionsstörungen wie Papaverin oder Phentolamin. Die Einnahme von Viridal Duo zusätzlich könnte eine gefährlich verlängerte Erektion verursachen

Andere Medikamente zur Behandlung von Erektionsstörungen, einschließlich Sildenafil. Bei gleichzeitiger Anwendung mit Viridal Duo könnten sie eine verlängerte Erektion hervorrufen

Medikamente zur Blutverdünnung wie Warfarin. Diese können Blutungen an der Injektionsstelle von Viridal Duo verursachen

Medikamente zur Senkung Ihres Blutdrucks und zur Veränderung des Durchmessers Ihrer Blutgefäße. Viridal Duo kann deren Wirkung verstärken und sehr niedrigen Blutdruck verursachen.

Jedes andere Medikament, einschließlich Medikamenten, die ohne Rezept erhältlich sind.

Andere Medikamente zur Behandlung der Blutgerinnung, da Sie besondere Aufmerksamkeit benötigen könnten.

#### Schwangerschaft, Stillzeit und Fruchtbarkeit

Sie sollten ein Kondom verwenden, wenn Ihre Partnerin schwanger ist, schwanger sein könnte oder schwanger werden könnte. Dies dient dazu, eine Reizung ihrer Vagina zu vermeiden oder möglicherweise das ungeborene Kind zu schädigen.

Wenn Sie Fragen dazu haben oder wenn Ihre Partnerin stillt, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Viridal Duo beeinträchtigt weder die Ejakulation noch die Fruchtbarkeit.

#### Fahren und Bedienen von Maschinen

Wenn Sie sich nach der Anwendung von Viridal Duo schwindelig oder ohnmächtig fühlen, sollten Sie nicht Auto fahren oder Maschinen oder Werkzeuge bedienen.

#### 3. Wie ist Viridal Duo anzuwenden

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau so an, wie es Ihnen Ihr Arzt gesagt hat. Fragen Sie bei Ihrem Arzt nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

##### Wichtig:

Bevor Sie Viridal Duo zu Hause anwenden, müssen Sie von Ihrem Arzt darin unterwiesen werden, wie es vorbereitet und injiziert wird. Sie sollten niemals mit der Behandlung beginnen, ohne vorher mit Ihrem Arzt gesprochen zu haben.

Denken Sie daran: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Hände richtig zu benutzen, oder wenn Sie nicht gut sehen können, kann Ihr Partner darin unterwiesen werden, Ihnen die Injektion zu geben.

Besprechen Sie dies bei Bedarf mit Ihrem Arzt.

#### Wie viel Viridal Duo zu verwenden ist

Um auf Impotenz zu testen und die benötigte Dosis von Viridal Duo zu ermitteln:

Bei erektiler Dysfunktion neurologischen Ursprungs

Ihr Arzt wird Ihnen eine Anfangsdosis von 2,5 oder 5 Mikrogramm geben. Wenn Ihre Impotenz jedoch auf neurologische Probleme zurückzuführen ist, wird Ihnen Ihr Arzt eine Anfangsdosis von 1,25 Mikrogramm geben.

Ihr Arzt wird dann Ihre Dosis jeweils um 2,5 oder 5 Mikrogramm erhöhen  
Ihre richtige Dosis ist diejenige, die eine Erektion hervorruft, die nicht länger als 1 Stunde anhält.

Für eine Erektion:

Die meisten Männer benötigen zwischen 10 und 20 Mikrogramm pro Injektion  
Verwenden Sie nicht mehr als 40 Mikrogramm in einer Injektion.  
Verwenden Sie es nicht mehr als 2 oder 3 Mal pro Woche mit mindestens 24 Stunden Abstand zwischen den Injektionen.

Hinweis zum Aufreißen:

Reißen Sie die weiße Folie an der Seite des Schutzbehälters ab und entnehmen Sie die Doppelkammerpatrone und die Injektionsnadel.  
Legen Sie die Komponenten des Injektionssets vor sich auf eine saubere Oberfläche und stellen Sie sicher, dass keine offensichtlichen Schäden am Injektor vorhanden sind.  
Bereiten Sie einen mit Desinfektionsmittel getränkten Tupfer vor

Wie man Viridal Duo injiziert Abb. 1:

Für jede Injektion benötigen Sie:

- a) Easy-Duo® wiederverwendbar. Wenn Sie Viridal Duo bereits verwendet haben, sollten Sie bereits einen Injektor haben.
- b) Eine Patrone, die aus zwei Kammern besteht.  
Es werden 10, 20 oder 40 Mikrogramm Alprostadil (weißes Pulver) in der oberen Kammer und 1 ml steriles Kochsalzlösung (farblose Flüssigkeit) in der unteren Kammer enthalten sein.
- c) Eine Injektionsnadel mit äußerer Schutzkappe (1) und innerer Schutzkappe (2)

Hinweise:

Bitte überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Easy-Duo® Injektor auf sichtbare Schäden.  
Der Injektor darf nur mit viridal® Patronen und den mitgelieferten Injektionsnadeln (BD Microfine + 0,33 x 12,7 mm) verwendet werden.  
Injektionsnadel (C) und Patrone (B) sind nicht im Easy-Duo®-Gehäuse enthalten.

Überprüfen Sie, ob das Siegel an der Injektionsnadel nicht gebrochen ist. Reißen Sie das Siegel ab.

Setzen Sie die Nadel auf das Ende des Injektors, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest sitzt. Schrauben Sie immer die Injektionsnadel auf, bevor Sie die Patrone einsetzen.

Schrauben Sie den Kolben vom Injektor ab. Nehmen Sie die Patrone und reinigen Sie die Spitze mit einem Alkoholtupfer. Setzen Sie die Patrone in den transparenten Körper des

Injektors ein. Achten Sie darauf, dass der Wulst in die Nut des Injektors vorgeschoben wird.

Schrauben Sie den Kolben auf das hintere Gewinde des Injektorkörpers.

Halten Sie den Injektor mit der Nadel nach oben. Drücken Sie den Kolben nach vorne, bis die beiden grauen Stopfen der Patrone aufeinandertreffen. Sie werden sehen, dass die Flüssigkeit in die vordere Kammer übergeht und sich das Pulver innerhalb weniger Sekunden auflöst. Schütteln Sie den Injektor sanft, bis keine Partikel mehr zu sehen sind. Zunächst kann die Lösung aufgrund der Bläschen leicht trüb erscheinen, aber dies klärt sich nach kurzer Zeit.

Entfernen Sie die äußeren und inneren Schutzkappen der Nadel. Warnung: Berühren Sie nichts mit der Nadelspitze, damit sie sauber und steril (keimfrei) bleibt.

Während Sie den Injektor mit der Nadel nach oben halten, klopfen Sie kräftig gegen den Injektor, bis alle Bläschen nach oben gewandert sind. Schieben Sie den Kolben vorsichtig vor, bis ein Tropfen der Lösung die Nadel verlässt. Stellen Sie sicher, dass alle Luft aus der Patrone entfernt wurde.

Stellen Sie die Dosis ein, die Ihr Arzt Ihnen verschrieben hat. Dazu bewegen Sie den Kolben des Injektors langsam nach oben, bis die obere Kante des vorderen grauen Stopfens die verschriebene Dosis erreicht hat.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Penis gründlich gereinigt wurde.

Reinigen Sie die Injektionsstelle mit einem Alkoholtupfer. Ziehen Sie den Penis leicht von Ihrem Körper weg, bis die vorgesehene Injektionsstelle getrocknet ist.

Nehmen Sie den Injektor und stellen Sie sicher, dass der graue Stopfen auf der verschriebenen Dosis ist und keine Luftblasen in der Patrone sind.

Die Injektionsstelle muss innerhalb des in Abbildung 10 gezeigten Bereichs liegen.

Hinweise:

Vor der Injektion wird ein spezielles Training mit dem Arzt oder Spezialisten empfohlen. Die Verabreichung von Viridal® kann Nebenwirkungen verursachen, obwohl nicht jeder sie bekommt. Lesen Sie die Packungsbeilage von Viridal® für deren Kenntnis.

Halten Sie den Injektor in Ihren Fingern wie gezeigt. Halten Sie ihn immer auf gleicher Höhe mit dem Penis und führen Sie die Nadel fast vollständig gerade in den Penis ein. Der Ort, an dem Sie injizieren, sollte innerhalb des auf dem Bild gezeigten Bereichs liegen. Verwenden Sie eine andere Seite des Penis als beim letzten Mal.

Drücken Sie sanft mit dem Daumen auf den Kolben und injizieren Sie die Lösung langsam über einen Zeitraum von 5 bis 10 Sekunden.

Nach der Injektion entfernen Sie den Injektor und die Nadel aus Ihrem Penis und legen Sie ihn ab. Wenn Blutungen auftreten, üben Sie 3 Minuten lang Druck auf die Injektionsstelle

mit einem sauberen Pad aus, um die Blutung zu stoppen. Wenn sie weiterhin auftritt, üben Sie weiter Druck aus, bis sie aufhört.

Es dauert 5–15 Minuten, bis sich Ihre Erektion entwickelt. Ihre Erektion sollte etwa eine Stunde anhalten. Wenn sie zwischen 2-4 Stunden anhält, besprechen Sie dies mit Ihrem Arzt. Wenn sie länger als 4 Stunden anhält, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt.

Entsorgung der gebrauchten Packung:

Setzen Sie die äußere Schutzkappe auf die Nadel, schrauben Sie die Nadelbasis ab und legen Sie sie in einen Behälter für Nadeln (sogenannter Abfallbehälter für scharfe Gegenstände) (auch bei Ihrem Arzt oder Apotheker erhältlich).

Entfernen Sie die Patrone, indem Sie den Kolben vom Injektorkörper abschrauben und die Patrone herausziehen.

Werfen Sie den Easy-Duo® Injektor nicht weg. Waschen Sie den Injektor mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Nach dem Trocknen bewahren Sie ihn in der Originalverpackung für Ihre nächste Injektion auf.

Legen Sie die Patrone in einen Plastikbeutel und binden Sie ihn sorgfältig zu. Dieser kann mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Es ist wichtig, ungenutzte Medizin zu entsorgen. Die Mischung von Viridal Duo, die Sie hergestellt haben, ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und ungenutzte Inhalte sollten zusammen mit der Patrone entsorgt werden.

Medizinische Untersuchungen

Nach der ersten Anwendung dieses Medikaments und dann etwa alle 3 Monate wird Ihr Arzt Sie zu Untersuchungen auffordern. Diese sollen sicherstellen, dass Ihr Medikament richtig wirkt und die Dosis, die Sie einnehmen, für Sie geeignet ist.

Wenn Sie mehr Viridal Duo verwenden, als Sie sollten

Kontaktieren Sie sofort die nächstgelegene Notaufnahme eines Krankenhauses oder Ihren Arzt. Die Verwendung von zu viel Viridal Duo kann Ihr Risiko für Narbenbildung am Penis erhöhen und kann dazu führen, dass Ihre Erektion zu lange anhält, was eine Behandlung durch einen Facharzt erfordern kann, um die Wirkung umzukehren.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Medikaments haben, fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Ihre Krankenschwester.

#### 4. Mögliche Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Suchen Sie sofort medizinische Hilfe, wenn Sie eines der folgenden Symptome haben:

Eine Erektion, die länger als 4 Stunden anhält

Schwere allergische Reaktionen, die Atembeschwerden oder Schwindel verursachen

Hautreaktionen wie Ausschläge und Blasenbildung.

Andere Nebenwirkungen mit folgender Häufigkeit umfassen:

Sehr häufig: kann mehr als 1 von 10 Personen betreffen

## Schmerzen im Penis

Häufig: kann bis zu 1 von 10 Personen betreffen

- Brennendes Gefühl während der Injektion, das schnell besser wird
- Schmerzen an der Injektionsstelle
- Knoten an der Injektionsstelle oder in Ihrem Penis nach langfristiger Anwendung.
- Flatterndes oder vibrierendes Gefühl aufgrund unkontrollierbarer Muskelbewegungen
- Erektionen können häufiger und länger andauern
- Biegung oder Knick im Penis, insbesondere nach langfristiger Anwendung

Gelegentlich: kann bis zu 1 von 100 Personen betreffen

- Fleckartige Blutergüsse (Blutpunkte unter der Haut) an der Injektionsstelle
- Rötung, Juckreiz, Schwellung, Blasenbildung, Taubheit, Empfindlichkeit oder ein Wärmegefühl an der Injektionsstelle
- Blutungen an der Injektionsstelle
- Kopfschmerzen
- Pilzinfektion
- Erkältung
- Vermindertes Berührungs- oder Empfindungsvermögen
- Erhöhtes Berührungs- oder Empfindungsvermögen
- Präsynkope (Gefühl, dass man ohnmächtig wird)
- Erweiterung der Pupillen
- Veränderungen des Herzrhythmus oder erhöhte Herzfrequenz
- Niedriger Blutdruck
- Erhöhter Kreatininwert
- Verminderter oder veränderter Blutfluss zu den Armen oder Beinen
- Übelkeit
- Trockener Mund
- Müdigkeit
- Hautausschlag
- Übermäßiges Schwitzen
- Schmerzen beim Wasserlassen, häufigeres Wasserlassen oder plötzlicher Harndrang
- Blutung in der Harnröhre, die Blut im Urin verursachen kann
- Allgemeine Erhöhung der Eisenspeicher im Körper
- Probleme, eine Erektion zu erreichen oder aufrechtzuerhalten
- Entzündung der Vorhaut und Eichel (Balanoposthitis)
- Verengung der Vorhaut (Phimose)
- Probleme mit der Ejakulation
- Schmerzhaft oder geschwollene Hoden
- Knoten auf den Hoden
- Schmerzen im Becken
- Schmerzlose, flüssigkeitsgefüllte Zyste im Nebenhoden (Spermatozele)
- Schmerzen, Schwellung oder Rötung des Hodensacks
- Schmerzen, Schwellung oder Rötung an der Spitze des Penis

Selten: kann bis zu 1 von 1.000 Personen betreffen

- Blutdruckabfall, der Schwindel oder Ohnmacht verursachen kann ☐ Narbenbildung im Inneren des Penis nach langfristiger Anwendung.

Seltene Erkrankungen des Nervensystems wie Schwindel (Desorientierung mit Drehgefühl), Schwindel  
Nesselsucht

Wenn eine der Nebenwirkungen schwerwiegend wird oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Sehr selten: kann bis zu 1 von 10.000 Personen betreffen  
Einzelfälle von Thrombozytopenie (abnormer Abfall der Thrombozytenzahl)

Nicht bekannt: Häufigkeit kann aus den verfügbaren Daten nicht abgeschätzt werden  
Gedächtnisverlust  
Schlaganfall  
Unzureichende Blutversorgung des Herzmuskels über die Koronararterien, oft mit Brustschmerzen (Angina pectoris); Herzinfarkt  
Blutungen des Magens und des Darms  
Schwellung des Penis

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies schließt alle möglichen Nebenwirkungen ein, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über folgendes melden:

Yellow Card Scheme

Website: [www.mhra.gov.uk/yellowcard](http://www.mhra.gov.uk/yellowcard) oder suchen Sie nach MHRA Yellow Card im Google Play oder Apple App Store

Durch das Melden von Nebenwirkungen können Sie dazu beitragen, mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels bereitzustellen.

## 5. Wie ist Viridal Duo aufzubewahren

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht nach dem Verfallsdatum, das auf dem Etikett und der Verpackung nach EXP angegeben ist. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25°C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren, um es vor Licht zu schützen.

Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht, wenn Sie Feuchtigkeit im Pulver bemerken.

Wenn Sie das Pulver mit der Flüssigkeit im Injektor gemischt haben, verwenden Sie es sofort. Es kann nicht aufbewahrt werden.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht über Abwasser oder den Hausmüll. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie Sie Arzneimittel entsorgen können, die Sie nicht mehr verwenden. Diese Maßnahmen helfen, die Umwelt zu schützen.

## 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Viridal Duo enthält

Der Wirkstoff ist Alprostadil. Es gibt drei Stärken von Viridal Duo, die den Wirkstoff Alprostadil in 10, 20 oder 40 Mikrogramm enthalten.

Die anderen Bestandteile des Pulvers sind Lactose-Monohydrat und Alfadex. Die Flüssigkeit enthält Natriumchlorid und Wasser für Injektionszwecke.

#### Wie Viridal Duo aussieht und Inhalt der Packung

Viridal Duo ist ein Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung. Viridal Duo wird in einer Glaskartusche mit zwei Kammern geliefert. Eine Kammer enthält ein weißes Pulver mit dem Wirkstoff Alprostadil. Die andere enthält eine klare, farblose Natriumchloridlösung. Diese wird verwendet, um das Pulver aufzulösen.

Es gibt verschiedene Packungen mit:

- 1 Kartusche, 1 Nadel mit und ohne Injektor
- 2 Kartuschen, 2 Nadeln mit und ohne Injektor
- 6 Patronen und 6 Nadeln ohne Injektor.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen vermarktet.

#### Zulassungsinhaber und Hersteller

##### Zulassungsinhaber

Mercury Pharmaceuticals Ltd.  
Dashwood House,  
69 Old Broad Street,  
London, EC2M 1QS, Vereinigtes Königreich

##### Hersteller

Aesica Pharmaceuticals GmbH  
Alfred-Nobel-Strasse 10  
D-40789 Monheim  
Deutschland

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt im März 2024 überarbeitet

Wenn diese Packungsbeilage schwer zu sehen oder zu lesen ist oder Sie sie in einem anderen Format wünschen, kontaktieren Sie bitte:

Mercury Pharmaceuticals Ltd.  
Dashwood House,  
69 Old Broad Street,  
London, EC2M 1QS, Vereinigtes Königreich

#### Telefonische Beratungslinie

Weitere Informationen sind telefonisch erhältlich unter: +44 (0) 208 588 9131