

Kasutusjuhend: Teave kasutajale

viridal® 20 µg

Pulber ja Lahusti süstelahuse valmistamiseks süstelahuse valmistamiseks

Täiskasvanutele kasutamiseks Toimeaine : Alprostadil

Lugegepalun

Lugema enne surm kogu pakendi infoleht hoolikalt läbi, enne te koos selle kasutamisega selle ravimi alustate, sest see sisaldab olulist teavet.

Hoidke Te surm pakendi infoleht peal. Võib-olla soovite te seda hiljem uuesti lugeda. Kui teil on lisaküsimusi , pöörduge Teie ennast oma arsti või apteekri poole. See ravim on teile isiklikult välja kirjutatud. Ärge. seda kolmandatele isikutele edasi. See on. See võib teisi inimesi kahjustada, isegi kui need kellel samad kaebused on nagu teil. Kui te kõrvaltoimeid märkate, pöörduge te arsti poole oma arsti või apteekriga. See kehtib ka kõrvaltoimete kohta, mida sellespakendi infolehes ei ole mainitud. Vaata. 4. Mis on 4.

pakendi infolehes Pakendi infoleht seisab

1. Mis on viridal ja milleks seda kasutatakse ?Mida
2. peaksite teadma enne kasutamist viridal puhul ? Mida arvestada?
3. Kuidas on viridal kasutada?
4. Millised kõrvaltoimed on võimalikud?
5. Kuidas on viridal säilitada?
6. Pakendi sisu ja lisainfo muud Teave

1. Mis on viridal ja milleks seda kasutatakse ?viridal

on ravim , mis sisaldab toimeainetAlprostadil . Alprostadil on. Alprostadil on üks kehasisene aine, mis esineb kõrgetes kontsentratsioonides inimese seemnevedelikus leidub ..

kasutatakse : erektsioonihäirete:

kuni raviks erektsioonihäirete ((erektsioonihäire Düsfunksioon), ka üldiselt impotentsus ehk. puudulik jäikus nimetatakse, täiskasvanutel täiskasvanutel tõttu erinevate (neurogeensete, vaskulaarsete, psühhogeenne või segatud) põhjused. abivahendina diagnostikas erektsioonihäire tuvastamiseks ühe selgitamiseks erektsioonihäire düsfunktsiooni ..

teenib ravim ka eesmärki erektsioonide esilekutsumiseks alates Ereksioonidmis eeldus on edasiste diagnostiliste protseduuride nagunt Doppler-ultraheli (dupleks-sonograafia), korgaskeha mõõtmine (dünaamiline kavernosomeetria), kui need ei saavutada loomulikul teel saavutada ei saa olla.

2. Mida peaksite teadma enne kasutamist kasutamist viridal pöörama tähelepanu?

esinevad Ereksioonid sisenema tõenäolisem juures patsientidel koos anatoomiliste deformatsioonidega peenise peal, nagu nt peenise kõverus, kitsenemine eesnaha ,armistumine korgaskeha , Peyronie tõbi, Peyronie tõbi või nahamuutused. Üks peenise fibroos sealhulgas ühe peenise kõverdumine, fibrootilised sõlmed ja Peyronie tõbi (IPP) võivad tulenevalt intrakavernoosest kasutamisest ravimi viridal poolt esinevad. See risk ühe fibroosi võib pikema ravi kestuse korral olla. Patsiendi kontrollid, mis sisaldavad hoolikat uurimist peenise kaasamisel, on tungivalt soovitatav, um Tunnused ühe peenise fibroos või ühe IPP tuvastada. Kui te ühe peenise kõverus ,korgaskeha fibroos või ühe IPP areneb ,, peaksite Teie ravi lõpetama koos viridaliga lõpetama.

Patsientidel kellel on hüübimishäired või patsientidel, kes ravimeid kasutavad hüübimise pärssimiseks vere hüübimist (Antikoagulandid) nagu Varfariin või Hepariin kasutada, võib kasutamine viridal suurendada kalduvust veritsustele pärast intrakavernooset süsti pärast ühe intrakavernooset Süst suurendama. Kui Teie kuulute nende patsientide hulka, siis peaks Teie arst vere hüübimisinäitajaid tihedalt jälgima . Lisaks Lisaks peaksid Te süstekoha peenisel piisavalt kaua tampooniga suruda. Intrakavernoosne süstimine viridaliga võib.

. Intrakavernoosne süstimine viridaliga võib põhjustada ühte Verejooks juures süstekoha võib põhjustada . Kuihaigused , misvere kaudu levivad , võib see suurendada levikuohtu partnerile . Palun pöörake tähelepanu . kasutage Teie kondoomi ..

psüühikahäiretega või sõltuvushäiretega anamneesis tuleks arvestada potentsiaalse sõltuvuse ohuga . die potentsiaalne Oht ühe Sõltuvus alates viridal kaaluda.

Kasutamine alates viridal koos koos teiste ravimitega

Teavitage Teie oma arst või apteeker kui Te teisi ravimeid manustamakasutama, hiljuti teisi ravimeid manustanudkasutanud on või kavatsevad teisi ravimeid manustadakasutada.

Sümpatomimeetikumid (Ravimid, mis stimuleerivalt mõjuvad sümpaatikusele närvisüsteemile)võivad vähendada toimet ravimi viridal . Toime kombinatsioonikoos ravimitega võib olla vähenenud viridal koos fosfodiesteras-5 inhibiitoritega, Apomorfiin või kusiti kusejuha (intrauretraalne) manustatud Alprostadiil ei ole praegu teada olemas ..

võib võib die toime vererõhku alandavate (antihüpertensiivsed ravimid) ja veresooni laiendavate (vasodilataatorid) ravimite samuti verevedeldajate (antikoagulandid)ja ravimite , mistrombotsüütide agregatsiooni Trombide moodustumine der Trombotsüüdid takistama (trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid), tugevdama.

Kuna viridal trombotsüütide agregatsiooni pidurdab ja seega verejooksu kalduvust suurendab , võib, võib die Toime koos samaaegselt kasutatavate verevedeldajatega tugevneb võib.

Die Toimed koos Alprostadiili kombinatsioonis teiste ravivormidega ravi erektsioonihäirete raviks Düsfunksioon (nt. Sildenafil) või teiste erektsiooni esilekutsuvate ravimitega (nt Papaveriin) ei ole spetsiaalselt uuritud .. toimeaineid ei tohiks kasutada koos koos koos viridal kasutatakse kuna võimalik üks pikenenud erektsiooni kestus põhjustatud võib olla.

Pange tähele palun, et need andmed kehtivad ka enne lühikese rakendatud ravim kehtima võivad.

rasedus, imetamine ja sigimis-sünnitusvõime

Kui teie partner rase on või imetab, või kui teie partner kahtlustab, rase olema olema või kavatseb, rase jääda, küsige teie enne der Kasutamine selle ravimi oma arstiga või apteekriga konsulteerige nõu.

Looduslik sisaldus prostaglandiini (PGE₁ „koos veresooni laiendava toimega vasodilateeriva Omadused) spermas sperma võib läbi den sisaldus kohta PGE₁ sisse viridal suurenenud olla. Juhul raseduse korral rasedus der partneri peaks ajal des vahekorra üks kondoom kasutama, et ärritusi tupes, riski enneaegse sünnituse või üks risk sest den lootele kuni vältida.

Sõiduvõime ja võime kuni käsitsemine masinate Masinad

Ei teostatud ei uuringuid mõju mõju kohta sõiduvõime Sõiduvõime ja sõiduvõime Võime masinate käsitlemiseks teostatud masinad läbi viidud.

Üksikjuhtudel on mõjud vereringele, nagu nt lühiajaline vererõhu langusja või või/või Peapööritus pärast intrakavernooset süsti viridaliga täheldada. Tähelepanuja masinate käsitlemine võib seetõttu kuni 30 minutit pärast süsti olla mõjutatud. Kasutamine mõjutatud olla.

viridal sisaldab naatriumi, aga vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühe topeltkambriga karpuli, s.t. see on peaaegu „naatriumivaba“.

3. Kuidas on viridal kasutada?

Kasutage seda ravimit alati täpselt vastavalt kokkuleppele oma arstiga või apteekriga. Küsige oma. või apteekrilt juures Teie arst või apteeker küsige, kui Te ennast mitte kindel olete.

Enne Te alustate, viridal ise kasutama süstima, peate teie raviv arst põhjalikult ettevalmistamisel süstelahuse ja süstetehnika õpetama. Samuti peab olema õpetatud. Ka peab olema Kodus kasutamiseks määratud annus on arsti määrata kindlaks (vt jaotis Annustamisjuhend). Täpsed juhised teie arsti on eeltingimus selleks ravi kuni kodus.

Kui teil on raskusi, kindlalt ise süstida, nt läbivähenenud manuaalse võimekuse, kui tugevnägemispuue väljendunud Nõrgenenud nägemine või väljendunud Adipositas (Rasvumine), võib Teie partner juhendatud saama, et süste teha.

Vältige Te valesüste, s.t. süstige Te mitte otse alla naha alla vaid ainult sellele kohale, mille teile teie arst näitas, kuna viridal muidu ei toimi korralikult ..

Die Süstimine peaks toimuma hügieenilistes tingimustes, kunamuidu võib tekkida infektsioonid peenisel või korgaskehas. See võib.

erektsiooni. saab umbes umbes 5 kuni 15 minutit pärast süsti süstimist arenema. Kuidas süstimist teha on, lugege palun järgnevat järgmistes jaotistes.

See järgmised andmed kehtivad, kui teile teie arst viridal ei ole teisiti määranud on. Palun järgige te ennast vastavalt kasutusjuhiste , kunaviridal muidu muidu mitte õigesti mõjuda võib.

Ravi erektsioonihäire raviks Düsfunksioon

Annustamine ravi alguses Ravi algus

Diagnostilised Süstid ja Süstid annuse määramiseks tehakse arstilt raviv arst läbi viidud. Ta valib ühe individuaalse annuse, mis ühe diagnostilise uuringu erektsioonihäire tuvastamiseks . Kui.

viridal Teie viridal raviks ravi alates erektsioonihäired määratud saanud on, saab Teie arst ka Teie individuaalset annust praktikas katsetada. Algannusena algannus soovitatakse on juures

patsientidel, kelle erektsioonihäired neurogeenset päritolu on, üks kogus alates 1,25 µg Alprostadiili süstida . Kõigil teistelpatsientidel tuleks alustada 2,5 µg Alprostadiiliga. Annuse kohandamisel Annuse kohandamine on sammud vahel 2,5 ja 5 µg Alprostadiili soovitav .Enamik patsiente vajavad vahel 10 10 20 µg Alprostadiili, s.t. 0,5 ml viridal 20 µg (= 10 µg Alprostadiili) ja 1 ml 1 ml viridal 20 µg (= 20 µg Alprostadiil).

Kuni annustamine üle 20 µg Alprostadiil on teile viridal 40 µg saadaval olemas. Maksimaalse annuse juures 40 µg Alprostadiil on 1 ml viridal 40 µg kuni süstida. See maksimaalne annus ei tohi ületada olla ületatud .

Annustamine kodus ravi kuni kodus

Te peaksite ainult annust süstida, mis alates Teie raviv arst läbi ühe rea süstidest järgi ülalnimetatud skeemi jaoks Teid määratud on .. annustamine peaks peaks kuni kodus kuni ühe mitte kauem kui 1 tund kestva erektsiooni põhjustada. Kui pikenenud erektsioon vahel 2 ja 4 tundi peab Te oma arstile viitama ,et ta peab uuesti annust kohandama . Palun kasutage.

viridal 20 µg ainult kuni ainult kuni kuni 3 süstid nädalas nädalas kell, kusjuures vahel 2 süstid vähemalt üks periood alates 24 tundi peab olema.

Diagnostika ühe erektsioonihäire düsfunktsiooni (teostatakse ainult arsti poolt)Kahtluse korral

mitte vaskulaarse düsfunktsiooni korral näiteks neurogeensevõi düsfunktsiooni või psühhogeenne põhjus, on soovitav algannus jaoks diagnostilise protseduuri 2,5 µg alprostadiili. See algannus tõstetakse kuni suurendatakse, kuni täielik erektsioon saavutatud on on. Vastasel juhul võib tavaliselt koos ühe süstiga alustada 10 µg alprostadiili (= 0,5 ml viridal 20 µg). Süstide vahele üksikute süstide peaks jääma 24 24 tundi. kusjuures see arv süstide on 3 korda nädalas piiratud on ..

kogemused diagnostikas on kuni 40 µg Alprostadiili olemas kuni 40 µg Alprostadiili seemaksimaalne annus see Maksimaalne annus ei tohi ületada olla . Kui annused kuni 10 µg on teile viridal 10 µg saadaval ,ja kui annused vahel 20 µg ja 40 µg Alprostadiil 40 µg Alprostadiil on viridal 40 µg kasutada.

Patsiendi juhend süstimiseks süstimine peenise korgaskehasse

Ettevalmistused

Enne Teie alustamist ettevalmistusega alustate, peaksite Teie oma oma Käed ja oma peenis põhjalikult koos veega ja seebiga pesema.


Valmistage palun ette süstelahus vahetult enne süstimist süstimiseks ette ja kasutage Teie neid kohe. Mitte kasutatud süstelahus on ära visata.

Avamisjuhised

Rebige Teie valge kile külgsuunas ära kui Kaitseümbris alates ja eemaldage Teie die topeltkambriga karpuli ja die süstlanõel.

Asetage Teie die komponendid des süstekomplekt enda ette lauale üks puhas pind ja veenduge teie ,et et süstal ei näita ilmseid kahjustusi ..

Abbildung 1




- A. süstalsüstlanõel
- B. koos koos välimine kaitsekork (1) ja sisemine kaitsekork (2)
- C. topeltkambriga karpula koos kuivainega eeskambris ja lahustiga tagumises kambris, karpulaots (3) ja eesmine hall hall Kummistopper (4)

Märkus

Palun veenduge te ennast enne iga kasutamist, et Easy-Duo-süstal ei näita nähtavaid kahjustusi. Süstal süstal tohib ainult koos viridal topeltkambriga karpuleid ja den kaasasolevate süstlanõeltega (B-D Microfine+ 0,33x12,7 mm) kasutada .




Kontrollige kõigepealt, kas tihendamine süstlanõelal on kahjustamata puutumata on. Eemaldage Te siis see tihend süstlanõela pealt.




Kruvige Te see süstlanõel päripäeva keerates ette eesmine keere Keere des süstla, kuni see kindlalt istub.

Märkus

Kruvige Te alati kõigepealt nõel süstlanõel peale, enne kui te ampulli Karpule sisestama.



Kruvid Te kolvi alates süstal ära. Võtke Te ampull ja puhastage Te ots koos ühe lapiga lapiga desinfitseeriva tampoon. Sisestage Te karpuli karpuli läbipaistvasse keha korpusesse süstla sisse. PöörakeTe tähelepanu, et kumerus karpuli karpuli Karpul soonde süstla sisse lükata.



Kruvige Te kolb uuesti peale den tagumise keermestatud osa des süstla korpuse.



Hoidke Te den süstalt koos der Nõel pärast üles.

Lükake Te kolb ette , kunimõlemad hallid korgid ampulli puutuvad kokku . Selle puudutavad need Protsess jookseb surm Naatriumkloriidi lahus alates der tagumine kamber karpuli sisse eesmine kamber.

Raputage Te nüüd den süstal ettevaatlikult, et kuivainet lahustamine kiirendada kuivaine kiirendamiseks kiirendada. Lahus lahus võib õhumullide õhumullide alguses piimjas hägune näida. Lühikese aja jooksul aeg tekib üks selge lahus.



Eemaldage Te välimine ja sisemine kaitsekork nõela pealt ..

Nüüdsest

peale ei tohi olla die Nõel koos mitte teise Esemega enam kokku Puudutada ei tohi, et seda steriilsena hoida. Injektsioon

Koputage



Seda ,kui samal ajal Te den süstla koos nõelaga ülespoole hoidke üles , tugevalt vastu süstalt , kuni kõikõhumullid üles on liikunud üles poole ..

Lükake te kolbi ettevaatlikult ette , kuniüks tilk lahusest nõelast välja . Veenduge te selle juures, Teie seal kindel, et kõik õhk välja karpuli ampullist eemaldatud on. Veenduge Teie arst määratud annuse järgi arst määratud annus. Vajutage Te selleks templi süstla ettevaatlikult üles , kuniülemine serv esiosa halli korki Teie määratud annus saavutatud on (vaataaken Aken der Joonis).

Asetage te süstla pihusti puhtale pinnale ja veenduge, et nõel ei puutukokku ühegi pinnaga mis võiks saastuda teise ese rohkem sisse kokkupuude tuleb.



Veenduge Teie ,et Teie peenis on hästi pestud . Puhastage.


see Teie see Süstekoht koos ühe desinfitseerimisvahendiga (nt. midagi marli, mis on koos lahjendatud alkoholiga meditsiinilistel eesmärkidel immutatud on),ja hoidke Teie Teie sealjuures peenise alla kerge tõmme kehast eemale, kuni ettenähtud süstekoht kuiv on ..

nüüd süstla ja veenduge et süstla on Te ennast uuesti, et see hall kork on selle määratud annusel seisab ja et pole õhumulle ampullis olemas sisaldama on.



Süstekoht peab olema näidatud piirkonnas joonisel 10 olema. Hoidke süstalt

Abbildung 11



nagu joonisel 11 näidatud . nagu Joonis 11 näidatud.

Sisestage te süstlanõel ,ilma vajutamata süstla kolvile , horisontaalselt japeaaegu täielikult peenisesse , nagu on ette nähtud ., kuidas see Teile Teie Arst näidanud on.

Asetage Te nüüd pöidla põial st kolvi ja süstige Te lahus üle perioodi ühe ajavahemiku alates 5 kuni 10 sekundit.

Märkused

See süste koht tuleks iga iga süstimise korral vahetada. Kui Te paremale poole süstite, võtke Te den süstla paremasse kätte. Süstige te vasakule küljele, võtke te selle vasakusse kätte. Süstimise ajal süstimine võib kerge valu olla esineda.

Kui teie tunnete vastupanu või tugevat , põlevat valu tunnete , muutke ettevaatlikult asendit asendit asendit asendit Süstlanõel. Sisestage Te nõela nõel veidi edasi sisse või tõmmake seda veidi välja , kunilahus kergesti süstida saab saavad võib. Kui süstimine süstimine ikkagi ei lihtsalt ja valutult õnnestuda, tõmmake Te nõel nõel välja süstekohast süste koht. Istuge Teie ennast palun sellel juhul enne järgmist süsti oma raviarstiga ühendust . Pärast süsti Tõmmake.

Pärast Süst

Abbildung 12



Tõmmake Te die süstlanõel välja sellest peenis, ja asetage te den süstal kõrvale. Vajutage te vähemalt 3 minutit peale peal die Süste koht (nt. koos mõne marli), et veritsust vältida. Märkus Kui

tekib

veritsus , vajutage edasi, vajutage Teie edasi peale süste kohta, kuni veritsus lakkab.

Pärast Teie süsti teostamist , pange Teie kaitsekork peale välimine kaitsekork tagasi süste kohta die Nõel, ja keerake Te selle süstlast lahti ..

Te karpuli , tõmmates Te kolvi süstla küljest lahti keha lahti keerata ja die karpuli välja lükata.

Visake ära die süstlanõel ja die karpuli ohutult ja korralikult.

Pärast Easy-Duo- Easy-Duo-Injektor kasutatud on, puhastage palun seda palun sooja veega Vesi ja õrna puhastusvahendiga ..

palun Sina injektor pärast pärast der puhastamine kuiv tagasi oma karpi tagasi.

Kuna viridal täitepakendid ei sisalda süstalt , hoidke Teie EasyDuo-süstal oma järgmise jaoks oma järgmised Süstid peal.

Üks ilmne kahjustatud või mitte töökorras süstal peaks mitte kasutama olema. Veenduge Teie ennast enne iga järgmist Süstimine, et der süstal täielikult töökorras on.

Märkus

Soovitav on soovitatav, pärast lõpetamist der süstimist ja ajal des vahekorda välja ohutuse huvides kondoomi kasutada kasutada kasutada.

Kestus rakenduse kasutamine

See peaks regulaarselt kontrolluuringud ravivalt arstilt arst läbi viima saada. Seejuures on siis otsustada , kason korrektsioon annuse vajalik on ja kui kaua ravi jätkata tuleks . saavad peab.

Palun rääkige oma arstiga või apteekriga, kui teil on mulje, et viridali toime on liiga nõrk või liiga tugev. kuni tugev või liiga nõrk on.

Kui Te suurema koguse viridal kasutanud olete , kui Te pidite Kliinilistes

uuringutes kliiniliste Uuringud koos Alprostadiil ei ole üleannustamisi täheldatud .. üleannustamise võib pikaajaline , mõnikord valulik erektsioonilmneda . Kuni kõik valulik Ereksioon esineda. Kuni kõik süsteemsete mõjude taandunud on javõi kuni peenise alandamine toimunud on, peaks te arsti järelevalve all jälgitud olema. Seetõttu peaksite te kohe pöörduma oma raviva arsti või mõne kliiniku uroloogia osakonna poole, sest pikenenud erektsioon pöörduma, kuna üks pikendatud Ereksioon see erektiline kude peenise kahjustada võib. Ravi priapismini (pikaajalineerektsioon)peaks mitte hiljem kui pärast 6 6 Tundi algatud saavad.

4. Millised kõrvaltoimed on võimalikud?

Nagu kõik ravimid võib ka see ravim kõrvaltoimeid põhjustada, kuid ei esine mitte kõigil igal ajal esineda peavad.

Järgmiste sagedusnäitajate kohta kõrvaltoimete on järgmised sagedusnäitajad aluseks ::

| | |
|-------------|--|
| sageli :: | kui 1 ravitud Töödeldud st 10 |
| Sageli: | 1 kuni 10 Ravitud st 100 |
| Aeg-ajalt: | 1 kuni 10 Ravitud st 1000 |
| Harva: | 1 kuni 10 Ravitud st 10000 |
| Väga harva: | vähem kui 1 ravitud 10000-st 10000 |
| Pole teada: | Sagedus põhineb andmetel saadaval olemasolevate andmete põhjal hinnata |

See aastal kõige sagedasem teatatud kõrvaltoime pärast ühe intrakavernoose süsti oli valu peenises. Kolmkümmend protsenti patsientidest teatasid vähemalt korra valust üks kord alates

Valu. Valu oli 11% koos süstiga seotud . Enamikuljuhtudel hinnati valu kui kerge kuni mõõdukas . 3% juhtudest oli. seotud Patsiendid lõpetasid ravi ravi valu tõttu valu.

Peenisefibroos sealhulgas peenise kõverus, fibrootilised sõlmed ja Peyronie tõbi avastati 3% kõigist patsientidest, kes osalesid kliinilistes Uuringud osalemine, teatatud. In ühes uuringus iseeneslikule süstimisele iseeneslikule süstimisele, mis üle 18 kuud kestis, oli esinevus ühe peenise fibroosi suurem ja asus ligikaudu 8%.

verevalu (hematoom) ja nahaverejooks (ekhümoos) süstimiskohal , onpigem seoses koos süstimisega . koos süstetehnikaga süstetehnika kui toime alates Alprostadiil ja teatati 3 % ja. 2 % patsientidest teatatud.

Pikenenud erektsioonid (üks erektsioon üle 4-6 tunni) arenes 4 % patsientidest. Priapism (valulik erektsioon rohkem kui 6 tundi)ilmnes 0,4 % 0,4 % juures peal. Enamasti enamikul juhtudel taandusid need spontaanselt tagasi ..

Aeg-ajalt

::

- vererõhk Suurenenud
- südame löögisagedus Suurenenud
- kreatiniini sisaldus veres Südamehaigused

Südamehaigused

Aeg-ajalt:

- Sagenenud esinevad südamepekslemised väljaspool südamerütmi südamerütmi, mis tekivad ühes kodadest kodadest (Supraventrikulaarsedekstrasüstolid) Pole teada Vereringehäire
- vereringehäire des Südame (Müokardiisheemia)
- Südameatakk

Haigused närvisüsteemi Närvisüsteemi

Aeg-ajalt:

- Vähenenud Puute- ja Survetundlikkus nahal (Hüpesteesia)
- Ülitundlikkus puutestimulatsioonide Puudutusaistingud (Hüperesteesia)
- Peapööritus
- Peavalu
- Lühike, püsiv Teadvusetus (Sünkoop)
- Sümptomid algava minestuse nagu Uimasus ,Nägemis -Kuulmisprobleemid, Kahvatus, Higistamine, liveldus ilma järgneva teadvusekaotuseta (nn. Presünkoop)

Pole teada

- Mäluhäire
- Insult

Silmade haigused

Aeg-ajalt:

- Laiendamine der Pupillid (Müdriaas)

Haigused des Kõrv ja labürindi

Harva

- Peapööritus

Haigused seedetraktiTraktid

Aeg-ajalt:

- liveldus
- Kuiv Suu

Haigused neerude ja kuseteede Aeg-ajalt

::

- võib-olla .. põie tühjendamine (düsuuria)Sage
- urineerimine väikestes kogustes uriin väikestes kogustes Uriin (Pollakisuuria)
- Kusepakitsus
- Verejooksud der Kusiti (Uretraalverejooks)
- Suurenenud Esinemine von punaste Vereliblede uriinis (Hematuuria)Haigused

der der Nahk ja nahaaluse koe

Aeg-ajalt:

- Lööve
- Sügelus (Pruritus)
- Naha punetus munandikoti piirkonnas (Eritem munandikoti piirkonnas)
- Naha punetus
- Suurenenud higistamine (Hüperhidroos)

Skeletilihaskond-, Sidekude- ja luuhaigused

Sage

- Lihaskrambid

Aeg-ajalt:

- Seljavalu

Infektsioonid ja parasiitide Haigused

Aeg-ajalt:

- Seeninfektsioonid
- Infektsioonid ülemiste hingamisteede Hingamisteed
- Tavaline Külmetus

Veresoonkonna haigused

Sageli:

- Sümptomatiline Vererõhu langus (Hüpotensioon)
- Sinised verevalumid (Hematoodid)

Aeg-ajalt:

- Vererõhu langus (Hüpotensioon)
- Verejooksud (Hemorraagia)
- Laiendamine der Veresoones (Vasodilatatsioon)
- Perifeerne Veresoonkonna haigus
- Venosne Verejooks
- Vereringehäired
- Veenide haigused

Üldised Haigused ja Kaebused kehal Manustamiskoht

Sageli:

- Väikesed verejooksud nahal (ekhümoosid)süstekoha nahal Sinised laigud
- (hematoomid) süstekohanahalFibroos süstekoha Süstekoht
- Fibroos juures Süstekoht (nt. naastud süstekoht, fibrootilised sõlmed)
- Valu süstekohal Aeg-ajalt

- ::
- (Hemorraagia)süstekoha juures , Süstekoht, Ärritused süstekoha juures süstekoht, tuimus süstekoha juures süstekoht, soojatunne süstekoha juures süstekoht, sügelus süstekoha juures süstekoht, Eryteem sisse süstekoha süstekoht, mahu suurenemine sisse süstekoha süstekoht, turse sisse süstekoha süstekoht, tursed sisse süstekoha süstekoht, Põletikud juures süstekoha põletik
 - Põletikud
 - Ärritused
 - Tursed
 - Koe tursed vedelikupeetuse tõttu Vedelikukogunemine (Tursed)
 - Perifeersed Tursed
 - Nõrkus (Asteenial)

Haigused der Suguelundid ja der Rinnanääre

Väga sageli:

- Peenisevalu

Sageli:

- Pikenenud Ereksioonid
- Kohati Kõvastumine peenis, mis võib Deformatsioon erekteerunud peenis Peenis põhjustab
- (Peyronie tõbi, IPP)

- Kudede vohamine des sidekoe peenise (peenisefibroos) - peenisehaigused (peenise kõverdumine, peenise deviatsioon)

Aeg-ajalt:

- balaniit (Balanitis)
- Valulik Pikaajaline erektsioon (Priapism)
- Eesnaha kitsenemine (Fimoos)
- Valulikud Ereksioonid
- Ejakulatsioonihäired
- Ereksioonihäired
- Munandi-, Munandikoti- ja Vaagna valu
- Munandi- ja Munandikoti tursed
- Haigused des munandikott
- Moodustumine alates vedelikuga täidetud tsüstid ma piirkonnas der munandimanus või harvem ma piirkonnas der seemnejuha (spermatocoele)
- Munandite talitlushäired
- Soojustunne munanditel
- Munandite turse
- Munandite suurenemine

Haigused des immuunsüsteemi

Harva

- Ülitundlikkus koos allergilise nahapõletikuga/nahareaktsioon (dermatiit), Nõgestõbi (Urtikaaria) kuni hin zu anafülaktiliste2Fanafülaktoidsete reaktsioonide

haigused des vere ja lümfisüsteemi

Väga harva

- trombotsüütide puudus veres (trombotsütopeenia)Teade

Teade alates kõrvaltoimetest

Kui Teie kõrvaltoimeid märkate, pöörduge Teie poole oma arsti või apteekri poole. See kehtib ka nende kõrvaltoimete kohta, mis ei ole selles pakendi infolehes märgitud on. Teie saate kõrvaltoimeid ka otse riikliku teavitussüsteemi kaudu Liitvabariigi Instituut Ravimite jaoks Ravimid ja Meditsiiniseadmed, osakond Farmakovigilaansus, Kurt-Georg-Kiesinger allee 3, D53175 Bonn, veebisait: <http://www.bfarm.de> kuva . Sellega teie kõrvaltoimeid teatades, saate teie sellest aidata, et rohkem teavet selle ravimi ohutuse selle ravimi kättesaadavaks tehtud saada. saada.

5. Kuidas on viridal säilitada?

Hoidke seda ravimit lastele kättesaamatus kohas. ligipääsmatu Te.

Sina tohib seda ravimit järgi pakendil olevale kuupäevale karbil järgi „Kõlblik kuni“ märgitud aegumiskuupäeva ei tohi kasutada. Aegumiskuupäev viitab ainult pakendile den viimase päeva kuu.

Säilitamistingimused

Mitte üle 25°C hoida.

Kahekambriised kolbampullid karbis säilitada ,et sisu kaitsta Sisu eest Valgus kaitsta kaitsma.

Te ei tohi seda ravimit kasutada, kui te järgmist märkate

Kui juhtum kahjustuse korral topeltkambriga süstal võib eesmine tavaliselt kuiv sisu eesmine kamber niiske ja kleepuv muutuma ja märgatavalt kaotama maht kaotama. viridal ei tohi selles juhtum olla mitte kasutatud saada.

Märkus kohta kõlblikkusaeg pärast avamist või valmistamist

Valmis süstimisvedelik peab otsekohe enne kasutamist värskelt valmistatud kasutamiseks valmistatud tuleb. Mitte kasutatud süstelahus peab ära viskama tuleb.

Pulber lahustub ennast pärast lisamist naatriumkloriidi lahusele kohe ära. Alguses võib lahus Lahus piimjas hägune ilmuma. See on tingitud õhumullidest ja ei oma tähendust .. aja jooksul tekib selge lahus . Lahus.

6. Sisu pakendis ja täiendav teave Mis

viridal 20 µg sisaldab Toimeaine

on Alprostadiil. 1 topeltkambriga karp

1 48,2 mg pulbriga ja 48,2 mg pulber ja 1 ml Lahusti sisaldab 20 µg alprostadiili pulbris. Pulber.

See muud koostisosad on:

Pulber: laktoos, alfadeks

Lahusti: naatriumkloriid, vesi süstelahuse jaoks (= Naatriumkloriidi lahus 0,9 %)

Kuidas viridal välja näeb ja Sisu pakendi Pakend

Eesmine sisu esikambris topeltkambriga karpuli koosneb valgest ja kuivast pulbrist, mis Pulber, mis ühe kompaktse koogi koos ühe kõrgusega umbes 8 mm moodustab .. kook võib pragusid näidata ja veidi pudeneda , misei mõjuta Tõhusus mitte mõjutatud. Tagumine kamber sisaldab selget, värvitu naatriumkloriidi lahust (lahusti).viridal

20 µg on kui stardikomplekt koos 2 2 Kahekambrilised karpuleid samuti kui täitepakend koos 2 või 6 kahekambrilised karpuleid saadaval.

Üks stardikomplekt sisaldab:

2 kahekambrilised karpuleid koos kumbki 48,2 mg pulbrit ja 1 ml steriilne Naatriumkloriidi lahus 0,9 %

2 Süstlanõelad 29 G x ½ (0,33 mm x 12,7 mm)

taaskasutatav Süstal (Easy-Duo)

Pakendid täitepakendid sisaldavad:

või. 6 Kahekambrilised karpules koos igaüks 48,2 mg pulbrit ja 1 ml steriilne Naatriumkloriidi lahus 0,9 %

2 või. 6 Süstlanõelad 29 G x ½ (0,33 mm x 12,7 mm)

Võib-olla ei ole kõik pakendisuurused turule viidud. Farmatseutiline

ettevõtja UCB

Pharma Pharma GmbH

Alfred-Nobel-Straße 10
40789 Monheim
Telefon: 02173/48-4848
Telefaks: 02173/48-4841

Tootja
Aesica Pharmaceuticals GmbH
Alfred-Nobel-Straße 10
40789 Monheim

See pakendi infoleht on viimati im juulis 2013 üle vaadatud.

Teave kohta nende meditsiiniseadmete
Palun pange tähele Te kasutusjuhendit nende järgmiste meditsiiniseadmete , mis on viridalpakendis viridal Pakend sisaldavad on, jaos jaotis „Patsiendi juhend süstimiseks süstimiseks peenise korgaskehasse “..

Süstlanõelad B-D Micro-Fine+ 29 G x ½ (0,33 mm x 12,7 mm) firmalt
Becton Dickinson Europe CE 0050 Easy-Duo®

taaskasutatav

taaskasutatav Injektor jaoks viridal topeltkambriised karpuleid (ainult sisse stardikomplektis sisaldub) ettevõttelt Androsystems Srl
CE