

Prospecto: Información para el usuario

Warticon® 0.15% w/w CREMA  
Podofilotoxina

Lea todo este prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento porque contiene información importante para usted.

Conserve este prospecto. Puede que necesite leerlo de nuevo.

Si tiene alguna pregunta adicional, consulte a su médico o farmacéutico.

Este medicamento ha sido recetado para usted. No lo pase a otras personas. Puede perjudicarlas, incluso si sus síntomas son los mismos que los suyos.

Si experimenta cualquier efecto secundario, hable con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este prospecto. Ver sección 4.

Qué contiene este prospecto

1. Qué es Warticon Crema y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de usar Warticon Crema
3. Cómo usar Warticon Crema
4. Posibles efectos secundarios
5. Cómo almacenar Warticon Crema
6. Contenido del envase y otra información

1. Qué es Warticon Crema y para qué se utiliza

Warticon Crema contiene un medicamento llamado podofilotoxina. Este es un extracto de planta que pertenece a un grupo de medicamentos llamados 'antivirales'.

Warticon Crema se utiliza para tratar verrugas genitales. Se usa para verrugas en el pene en hombres o verrugas externas en la vagina en mujeres.

2. Qué necesita saber antes de usar Warticon Crema

No use Warticon Crema si:

es alérgico (hipersensible) a la podofilotoxina o a cualquiera de los otros ingredientes de Warticon Crema (enumerados en la sección 6)

sus verrugas están en áreas de piel rota/dañada o sangrante

ya está usando otro medicamento que contiene podofilotoxina.

Advertencias y precauciones

Hable con su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento si:

sus verrugas cubren un área mayor de 4 centímetros (aproximadamente el tamaño de un sello postal). Puede que necesite que este medicamento sea aplicado por una enfermera/médico en una clínica.

Warticon Crema solo debe usarse en la piel afectada. No tome Warticon Crema por vía oral.

No aplique Warticon Crema en verrugas dentro del pene, vagina o recto. Warticon Crema solo debe aplicarse en verrugas en la piel externa.

Evite aplicar Warticon Crema en la piel sana que rodea la verruga.

Evite que Warticon Crema entre en sus ojos ya que puede causar irritación. Si accidentalmente Warticon Crema entra en sus ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua y consulte a un médico.

No ponga un vendaje (como una tirita) sobre el área tratada con Warticon Crema.

→ Consulte con su médico si cree que alguna de estas situaciones puede aplicarse a usted.

Qué evitar mientras usa Warticon Crema

Es aconsejable evitar el sexo durante el tratamiento con Warticon Crema. Debe esperar hasta que sus verrugas hayan desaparecido y su piel haya sanado

Las verrugas genitales son contagiosas. Puede transmitírselas o recibirlas de una pareja sexual.

→ Si tiene relaciones sexuales, debe usar un condón para ayudar a prevenir la propagación de las verrugas genitales y proteger a su pareja del contacto con podofilotoxina (ya que es irritante).

Otros medicamentos y Warticon Crema

Informe a su médico o farmacéutico si está usando otros medicamentos, ha usado recientemente o podría usar otros medicamentos. Esto incluye medicamentos comprados sin receta.

Niños

No se recomienda el uso de Warticon Crema en niños menores de 18 años, ya que no se ha establecido su uso en esta edad.

Embarazo y lactancia

No se recomienda el uso de Warticon Crema durante el embarazo.

Informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada

Use un método anticonceptivo confiable para prevenir el embarazo mientras usa Warticon Crema

Si queda embarazada durante el tratamiento con Warticon Crema, informe a su médico.

No se recomienda la lactancia durante el tratamiento con Warticon Crema. Discuta con su médico si elige amamantar o usar podofilotoxina.

Información importante sobre algunos de los ingredientes en Warticon Crema

Warticon Crema contiene butilhidroxianisol (E320), ácido sórbico, alcoholes estearílico y cetílico que pueden causar reacciones locales en la piel (por ejemplo, dermatitis de contacto).

El butilhidroxianisol también puede causar irritación en los ojos y las membranas mucosas.

Warticon Crema también contiene metil y propil parahidroxibenzoatos, E218 y E216, que pueden causar reacciones alérgicas (posiblemente retardadas).

3. Cómo usar Warticon Crema

Use siempre la Crema Warticon exactamente como le ha indicado su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si no está seguro.

## Uso de la Crema Warticon

Aplique la Crema Warticon dos veces al día, por la mañana y por la noche (cada 12 horas) durante 3 días.

No aplique ninguna crema durante los siguientes 4 días. Esto completa un ciclo de tratamiento.

Cuando aplique la crema Warticon, después de dos o tres días puede notar una leve irritación en las áreas tratadas. Esto indica que la Crema Warticon está comenzando a funcionar. Sin embargo, la crema Warticon puede causar reacciones cutáneas severas. Si esto ocurre, deje de usar la Crema Warticon y busque atención médica. Consulte 'Posibles efectos secundarios' en la sección 4 para más información.

Si aún tiene verrugas 7 días después de haber comenzado a usar la crema, repita el ciclo de tratamiento (dos veces al día durante 3 días seguidos de 4 días en los que no use la crema).

Se puede aplicar un máximo de 4 ciclos de tratamiento.

Si quedan verrugas después de 4 ciclos de tratamiento, consulte a su médico.

## Cómo aplicar la Crema Warticon

1. Lave las áreas afectadas con agua y jabón. Seque el área suavemente con una toalla limpia.
2. Con la yema del dedo, aplique la Crema Warticon para cubrir cada verruga. Use solo la cantidad necesaria de crema para cubrir cada verruga.
3. Frote la crema en la verruga. Tenga cuidado de no aplicar la crema en la piel sana. Si esto ocurre, lave la crema con agua y jabón.
4. Lávese bien las manos.
5. Asegúrese de haber cerrado bien la tapa.

## Si le entra Crema Warticon en los ojos o si la ingiere

Si le entra Crema Warticon en el ojo, enjuague el ojo a fondo con agua y hable con su médico.

Si accidentalmente le entra Crema Warticon en la boca, enjuague inmediatamente con agua.

Si accidentalmente ingiere algo de la crema, consulte a su médico o vaya al hospital de inmediato. Lleve el tubo de crema con usted para que el médico sepa qué ha ingerido.

## Si usa más Crema Warticon de la que debería

Si accidentalmente usa demasiada crema, lave la crema del área de tratamiento inmediatamente y consulte a un médico.

## Si olvida usar Warticon Crema

Aplique Warticon Crema tan pronto como lo recuerde. Si ya casi es hora de su próxima dosis, espere hasta entonces. No use una dosis doble para compensar una dosis olvidada.

## 4. Posibles efectos secundarios

Como todos los medicamentos, Warticon Crema puede causar efectos secundarios, aunque no todos los sufran.

Si experimenta alguno de los siguientes efectos secundarios graves, deje de usar Warticon Crema y busque atención médica:

quemazón severa, escozor, dolor, sangrado, picazón o hinchazón de la piel tratada. Si ocurren estos síntomas, lave Warticon Crema de su piel con agua y jabón inmediatamente.

→ Contacte a su médico lo antes posible.

Efectos secundarios muy comunes

Estos pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas:

desgaste de las capas superiores de la piel, irritación en el sitio de aplicación  
incluyendo enrojecimiento, picazón, sensación de quemazón

Otros efectos secundarios con frecuencias que no pueden estimarse a partir de los datos disponibles incluyen:

reacción alérgica, dolor, hinchazón, sangrado  
daño o pérdida de la capa superior de la piel, herida supurante  
úlceras en la piel, costra, decoloración de la piel, piel seca, ampolla.

Estos efectos pueden ocurrir en el área de la piel donde usa la crema.

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto secundario, hable con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este prospecto. También puede informar de los efectos secundarios directamente a través de (ver detalles abajo). Al informar de los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

Reino Unido

el Esquema de Tarjeta Amarilla en: [www.mhra.gov.uk/yellowcard](http://www.mhra.gov.uk/yellowcard).

Irlanda

HPRA Farmacovigilancia, Earlsfort Terrace, IRL - Dublín 2; Tel: +353 1 6764971; Fax: +353 1 6762517.

Sitio web: [www.hpra.ie](http://www.hpra.ie); Correo electrónico: [medsafety@hpra.ie](mailto:medsafety@hpra.ie)

## 5. Cómo almacenar Warticon Crema

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No use Warticon Crema después de la fecha de caducidad que se indica en el tubo y la caja (después de "EXP:"). La fecha de caducidad se refiere al último día de ese mes.

Warticon Crema no requiere condiciones especiales de almacenamiento.

No deseche los medicamentos a través de aguas residuales o residuos domésticos. Pregunte a su farmacéutico cómo desechar los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

## 6. Contenido de el paquete y otra información

Qué contiene la Crema Warticon

La sustancia activa es podofilotoxina 0.15% p/p (1.5 miligramos por gramo de Crema Warticon).

Los otros ingredientes son: agua purificada, metilparahidroxibenzoato (E218), propilparahidroxibenzoato (E216), ácido sórbico, ácido fosfórico, alcohol estearílico, alcohol cetílico, miristato de isopropilo, parafina líquida, triglicéridos – cadena media, butilhidroxianisol (E320), macrogol – 7 éter de estearilo, macrogol – 10 éter de estearilo.

Cómo se ve la Crema Warticon y contenido del paquete

La Crema Warticon viene en tubos que contienen 5 gramos de una crema blanca.

Titular de la Autorización de Comercialización y Fabricante Titular de la Autorización de Comercialización:

Phoenix Labs

Suite 12, Bunkilla Plaza,

Bracetown Business Park,

Clonee, County Meath, Irlanda

Fabricante:

Delpharm Bladel BV

Industrieweg 1, 5531 AD Bladel, Países Bajos

Industrieweg 1, 5531 AD Bladel, Países Bajos

Phoenix Healthcare Limited

Phoenix Healthcare Limited

Unit 31, 2<sup>nd</sup> Avenue,

Cookstown Industrial Estate,

Dublin 24, D24 TP60,

Ireland

O

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

Pol. Ind. Consorci Zona Franca. c/ C, 12-14

08040 Barcelona

España

[Solo el sitio responsable de la liberación del lote se incluirá en el prospecto incluido en el paquete].

Otros formatos:

Si este prospecto es difícil de ver o leer o si desea obtenerlo en un formato diferente, por favor contacte:

Phoenix Labs, Suite 12, Bunkilla Plaza, Bracetown Business Park, Clonee, County Meath, Irlanda.

Este medicamento está autorizado en los Estados Miembros del EEE bajo los siguientes nombres:

Irlanda: Warticon 0.15% w/w Crema

España: Wartec Crema

Países Bajos: Wartec, crème 1,5 mg/g

Reino Unido: Warticon 0.15% w/w Crema

Este prospecto fue revisado por última vez en enero 2023.

PL 35104/0023  
PA 1113/017/001

Warticon es una marca registrada de Phoenix Labs.

Transtoyou