

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Warticon® 0,15 % w/w VOIDE
Podofyllotoksiini

Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön, koska se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle. Älä anna sitä muille. Se voi vahingoittaa heitä, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä sisältää mahdolliset haittavaikutukset, joita ei ole mainittu tässä selosteessa. Katso kohta 4.

Mitä tämä seloste sisältää

1. Mitä Warticon-voide on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Warticon-voidetta
3. Miten Warticon-voidetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Warticon-voiteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Warticon-voide on ja mihin sitä käytetään

Warticon-voide sisältää lääkettä nimeltä podofyllotoksiini. Tämä on kasviuute, joka kuuluu lääkeryhmään nimeltä 'viruslääkkeet'.

Warticon-voidetta käytetään sukupuolielinten syylien hoitoon. Sitä käytetään miesten peniksen syyliin tai naisten emättimen ulkoisiin syyliin.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Warticon-voidetta

Älä käytä Warticon-voidetta, jos:

olet allerginen (yliherkkä) podofyllotoksiinille tai jollekin muulle Warticon-voiteen aineosalle (lueteltu kohdassa 6)

syyllät ovat rikkoutuneella/vahingoittuneella tai vuotavalla iholla
käytät jo toista lääkettä, joka sisältää podofyllotoksiinia.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä, jos:

syyllät peittävät alueen, joka on suurempi kuin 4 senttimetriä (noin postimerkin kokoinen). Saatat tarvita tämän lääkkeen levittämistä sairaanhoitajan/lääkärin toimesta klinikalla.

Warticon-voidetta saa käyttää vain sairastuneelle iholle. Älä ota Warticon-voidetta suun kautta.

Älä levitä Warticon-voidetta peniksen, emättimen tai peräsuolen sisäpuolella oleviin syyliin. Warticon-voidetta tulee levittää vain ulkoisille (ulkoisille) syyliille.

Vältä Warticon-voiteen levittämistä syylän ympärillä olevalle terveelle iholle.

Vältä Warticon-voiteen joutumista silmiin, sillä se voi aiheuttaa ärsytystä. Jos saat Warticon-voidetta silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.

Älä laita sidettä (kuten laastaria) Warticon-voiteella käsitellyn alueen päälle.

→ Kysy lääkäriltäsi, jos luulet, että jokin näistä koskee sinua.

Mitä välttää käyttäessäsi Warticon-voidetta

On suositeltavaa välttää seksiä Warticon-voiteen käytön aikana. Sinun tulisi odottaa, kunnes syylät ovat hävinneet ja ihosi on parantunut.

Sukupuolielinten syylät ovat tarttuvia. Voit tartuttaa ne seksikumppanillesi tai saada ne häneltä.

→ Jos harrastat seksiä, sinun on käytettävä kondomia estääksesi sukupuolielinten syylien leviämisen ja suojellaksesi kumppaniasi joutumasta kosketuksiin podofylloksiinin kanssa (koska se on ärsyttävä).

Muut lääkkeet ja Warticon-voide

Kerro lääkärillesi tai apteekkarillesi, jos käytät muita lääkkeitä, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös ilman reseptiä ostettuja lääkkeitä.

Lapset

Warticon-voiteen käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska käyttöä tässä iässä ei ole vahvistettu.

Raskaus ja imetys

Warticon-voidetta ei suositella käytettäväksi raskauden aikana.

Kerro lääkärillesi, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta.

Käytä luotettavaa ehkäisymenetelmää raskauden ehkäisemiseksi, kun käytät Warticon-voidetta.

Jos tulet raskaaksi Warticon-voiteen käytön aikana, kerro siitä lääkärillesi.

Imetystä ei suositella Warticon-voiteen käytön aikana. Keskustele lääkärisi kanssa siitä, valitsetko imetyksen vai podofylloksiinin käytön.

Tärkeää tietoa joistakin Warticon-voiteen ainesosista

Warticon-voide sisältää butyylihydroksianisolia (E320), sorbiinihappoa, stearyyli- ja setyylialkoholeja, jotka voivat aiheuttaa paikallisia iho-oireita (esim. kosketushottumaa). Butyylihydroksianisoli voi myös ärsyttää silmiä ja limakalvoja.

Warticon-voide sisältää myös metyyli parahydroksibentsoattia ja propyyli parahydroksibentsoattia, E218 ja E216, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

3. Kuinka käyttää Warticon-voidetta

Käytä Warticon-voidetta aina juuri siten kuin lääkärisi on määrännyt. Kysy lääkäriltäsi tai apteekista, jos olet epävarma.

Warticon-voiteen käyttö

Levitä Warticon-voidetta kahdesti päivässä, aamulla ja illalla (12 tunnin välein) 3 päivän ajan.

Älä levitä voidetta seuraavien 4 päivän aikana. Tämä täydentää yhden hoitojakson.

Kun levität Warticon-voidetta, kahden tai kolmen päivän kuluttua saatat huomata lievää ärsytystä hoidetuilla alueilla. Tämä osoittaa, että Warticon-voide alkaa vaikuttaa.

Kuitenkin, Warticon-voide voi aiheuttaa vakavia ihoreaktioita. Jos näin tapahtuu, lopeta Warticon-voiteen käyttö ja hakeudu lääkäriin. Katso lisätietoja kohdasta 4 'Mahdolliset haittavaikutukset'.

Jos sinulla on vielä syyliä jäljellä 7 päivän kuluttua voiteen käytön aloittamisesta, toista hoitojakso (kahdesti päivässä 3 päivän ajan, jota seuraa 4 päivää ilman voidetta).

Enintään 4 hoitojaksoa voidaan käyttää.

Jos syyliä on jäljellä 4 hoitojakson jälkeen, ota yhteys lääkäriisi.

Kuinka levittää Warticon-voidetta

1. Pese hoidettavat alueet saippualla ja vedellä. Kuivaa alue varovasti puhtaalla pyyhkeellä.
2. Levitä Warticon-voidetta sormenpäällä peittämään jokainen syyliä. Käytä vain sen verran voidetta, että syyliä peittyi.
3. Hiero voide syyliään. Varo, ettei voidetta joudu terveelle iholle. Jos näin käy, pese voide pois saippualla ja vedellä.
4. Pese kätesi huolellisesti.
5. Varmista, että olet kiertänyt korkin tiukasti takaisin paikoilleen.

Jos saat Warticon-voidetta silmiisi tai nielaiset sitä

Jos saat Warticon-voidetta silmäsi, huuhtelee silmä huolellisesti vedellä ja ota yhteys lääkäriin.

Jos saat Warticon-voidetta suuhusi, huuhtelee heti vedellä.

Jos nielaiset vahingossa voidetta, ota yhteys lääkäriin tai mene heti sairaalaan. Ota voideputkilo mukaasi, jotta lääkäri tietää, mitä olet niellyt.

Jos käytät enemmän Warticon-voidetta kuin pitäisi

Jos käytät vahingossa liikaa voidetta, pese voide heti pois hoitoalueelta ja ota yhteys lääkäriin.

Jos unohdat käyttää Warticon-voidetta

Levitä Warticon-voidetta heti kun muistat. Jos seuraavan annoksen aika on lähellä, odota siihen asti. Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Warticon-voide voi aiheuttaa haittavaikutuksia, vaikka kaikki eivät niitä saakaan.

Jos koet jonkin seuraavista vakavista haittavaikutuksista, lopeta Warticon-voiteen käyttö ja hakeudu lääkäriin:

voimakas polttelu, kirvely, kipu, verenvuoto, kutina tai turvotus hoidetulla iholla. Jos näitä oireita ilmenee, pese Warticon-voide iholtasi heti saippualla ja vedellä.

→ Ota yhteyttä lääkäriisi mahdollisimman pian.

Hyvin yleiset haittavaikutukset

Nämä voivat vaikuttaa useampaan kuin 1 henkilöön 10:stä:

ihon pintakerrosten kuluminen, levityskohdan ärsytys, mukaan lukien punoitus, kutina, polttava tunne

Muut haittavaikutukset, joiden esiintymistiheyttä ei voida arvioida saatavilla olevien tietojen perusteella, ovat:

allerginen reaktio, kipu, turvotus, verenvuoto
ihon pintakerroksen vaurio tai menetys, vuotava haava
ihon haavauma, rupi, ihon värimuutos, kuiva iho, rakkula.

Nämä vaikutukset voivat esiintyä sillä ihoalueella, johon käytät voidetta.

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos saat haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan (katso alla olevat tiedot). Haittavaikutuksista ilmoittamalla voit auttaa saamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

Yhdistynyt kuningaskunta

Yellow Card -järjestelmässä osoitteessa: www.mhra.gov.uk/yellowcard.

Irlanti

HPRA Lääketurvatoiminta, Earlsfort Terrace, IRL - Dublin 2; Puh: +353 1 6764971; Faksi: +353 1 6762517.

Verkkosivusto: www.hpra.ie; Sähköposti: medsafety@hpra.ie

5. Warticon-voiteen säilyttäminen

Säilytä tämä lääke lasten ulottumattomissa ja näkyvissä.

Älä käytä Warticon-voidetta viimeisen käyttöpäivän jälkeen, joka on merkitty tuubiin ja pakkaukseen (kohdan "EXP:" jälkeen). Viimeinen käyttöpäivä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Warticon-voide ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä hävitä lääkkeitä viemäriin tai talousjätteen mukana. Kysy apteekista, miten hävittää lääkkeet, joita ei enää tarvita. Nämä toimenpiteet auttavat suojelemaan ympäristöä.

6. Sisältö pakkaus ja muut tiedot

Mitä Warticon-voide sisältää

Vaikuttava aine on podofyllotoksiini 0,15 % w/w (1,5 milligrammaa grammaa Warticon-voidetta kohden).

Muut aineet ovat: puhdistettu vesi, metyyli parahydroksibentsoaatti (E218), propyyli parahydroksibentsoaatti (E216), sorbiinihappo, fosforihappo, stearyylialkoholi, setyylialkoholi, isopropyylimyristaatti, nestemäinen parafiini, triglyseridit – keskipitkäketjuiset, butyylihydroksianisoli (E320), makrogoli – 7 stearyylieetteri, makrogoli – 10 stearyylieetteri.

Miltä Warticon-voide näyttää ja pakkauskoko

Warticon-voide on valkoista voidetta sisältävässä 5 gramman tuubissa.

Myyntiluvan haltija ja valmistajaMyyntiluvan haltija:

Phoenix Labs

Suite 12, Bunkilla Plaza,
Bracetown Business Park,
Clonee, County Meath, Irlanti
Valmistaja:

Delpharm Bladel BV
Industrieweg 1, 5531 AD Bladel, Alankomaat
TAI

Phoenix Healthcare Limited

Phoenix Healthcare Limited
Unit 31, 2nd Avenue,
Cookstown Industrial Estate,
Dublin 24, D24 TP60,
Ireland

TAI

LABORATORI FUNDACIÓ DAU
Pol. Ind. Consorci Zona Franca. c/ C, 12-14
08040 Barcelona
Spain

[Ainoastaan erän vapauttamisesta vastaava paikka mainitaan pakkaukseen sisältyvässä pakkausselosteessa].

Muut muodot:

Jos tämän pakkausselosteen lukeminen on vaikeaa tai haluat sen eri muodossa, ota yhteyttä:
Phoenix Labs, Suite 12, Bunkilla Plaza, Bracetown Business Park, Clonee, County Meath,
Ireland.

Tämä lääkevalmiste on hyväksytty ETA:n jäsenvaltioissa seuraavilla nimillä:

Irlanti: Warticon 0,15 % w/w voide

Espanja: Wartec Crema

Alankomaat: Wartec, crème 1,5 mg/g

Yhdistynyt kuningaskunta: Warticon 0,15% w/w voide

Tätä pakkausselostetta tarkistettiin viimeksi tammikuussa 2023.

PL 35104/0023
PA 1113/017/001

Warticon on Phoenix Labsin rekisteröity tavaramerkki.