

Prospecto: información para el paciente

Wegovy 0,25 mg solución para inyección en una pluma precargada  
Wegovy 0,5 mg solución para inyección en una pluma precargada  
Wegovy 1 mg solución para inyección en una pluma precargada  
Wegovy 1,7 mg solución para inyección en una pluma precargada  
Wegovy 2,4 mg solución para inyección en una pluma precargada  
semaglutida

Este medicamento está sujeto a una monitorización adicional. Esto permite identificar rápidamente nueva información de seguridad. Puede contribuir informando de cualquier efecto secundario que pueda experimentar. Al final de la sección 4 se explica cómo hacerlo.

Lea detenidamente todo el prospecto antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto. Puede necesitar leerlo de nuevo.
- ¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con su médico, farmacéutico o enfermero.
- No comparta este medicamento con otras personas, ya que ha sido recetado solo para usted. Puede ser perjudicial para otros, incluso si tienen los mismos síntomas que usted.
- ¿Experimenta alguno de los efectos secundarios mencionados en la sección 4? ¿O experimenta un efecto secundario que no está en este prospecto? Póngase en contacto con su médico, farmacéutico o enfermero.

Contenido de este prospecto

1. ¿Qué es Wegovy y para qué se utiliza este medicamento?
2. ¿Cuándo no debe usar este medicamento o debe tener especial cuidado?
3. ¿Cómo usar este medicamento?
4. Posibles efectos secundarios
5. ¿Cómo almacenar este medicamento?
6. Contenido del envase e información adicional

1. ¿Qué es Wegovy y para qué se utiliza este medicamento?

¿Qué es Wegovy?

Wegovy es un medicamento para la pérdida y control de peso que contiene el principio activo semaglutida. Es similar a una hormona natural llamada 'péptido similar al glucagón tipo 1' (GLP-1) que se libera del intestino después de una comida. Funciona actuando sobre lugares (receptores) en el cerebro que regulan su apetito, lo que le hace sentirse satisfecho y menos hambriento, y tener menos antojos de comida. Esto le ayudará a comer menos y perder peso. Wegovy también puede ayudar a prevenir una enfermedad cardíaca.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

Wegovy se utiliza en combinación con dieta y ejercicio para perder peso y mantenerlo. Se utiliza en adultos con un IMC de 30 kg/m<sup>2</sup> o superior (obesidad) o

un IMC de al menos 27 kg/m<sup>2</sup>, pero menos de 30 kg/m<sup>2</sup> (sobrepeso) que tienen problemas de salud relacionados con el peso (como diabetes, hipertensión, niveles anormales de grasa en la sangre, dificultades respiratorias durante el sueño llamadas 'apnea obstructiva del sueño', o antecedentes de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o problemas vasculares).

El IMC (Índice de Masa Corporal) es una medida del peso en relación con la altura corporal.

Wegovy se utiliza en combinación con dieta y ejercicio para el control de peso en jóvenes de 12 años o más con  
obesidad y  
peso corporal > 60 kg.

Como paciente joven de entre 12 y 18 años, debe continuar usando Wegovy solo si después de 12 semanas con la dosis de 2,4 mg o la dosis máxima tolerada (ver sección 3) su IMC se ha reducido al menos un 5%. Consulte a su médico antes de continuar.

2. ¿Cuándo no debe usar este medicamento o debe tener especial cuidado?

¿Cuándo no debe usar este medicamento?

Es alérgico a alguno de los componentes de este medicamento. Puede encontrar estos componentes en la sección 6.

¿Cuándo debe tener especial cuidado con este medicamento?

Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de usar este medicamento.

No se recomienda el uso de Wegovy si usted:

- usa otros productos para la pérdida de peso;
- tiene diabetes tipo 1;
- tiene una función renal gravemente reducida;
- tiene una función hepática gravemente reducida;
- tiene insuficiencia cardíaca grave;
- tiene una enfermedad ocular diabética (retinopatía).

Hay poca experiencia con Wegovy en pacientes:

- de 85 años o más;
- con problemas hepáticos;
- con problemas graves de estómago o intestinos que conducen a un vaciado gástrico retardado (esto se llama gastroparesia), o con una enfermedad inflamatoria intestinal.

Consulte con su médico si alguna de las situaciones mencionadas anteriormente se aplica a usted.

Si sabe que debe someterse a una cirugía en la que será anestesiado (dormido), informe a su médico que está usando Wegovy.

Deshidratación

Durante el tratamiento con Wegovy, puede experimentar náuseas, vómitos o diarrea. Estos efectos secundarios pueden causar deshidratación (pérdida de líquidos). Es importante que beba mucho para evitar la deshidratación. Esto es especialmente

importante si tiene problemas renales. Consulte a su médico si tiene preguntas o preocupaciones.

#### Inflamación del páncreas

Póngase en contacto inmediatamente con un médico si tiene dolor severo y persistente en el área del estómago (ver sección 4). Esto puede indicar un páncreas inflamado (pancreatitis aguda).

#### Personas con diabetes tipo 2

Wegovy no puede ser utilizado como sustituto de la insulina. No use Wegovy en combinación con otros medicamentos que contengan agonistas del receptor GLP-1 (como liraglutida, dulaglutida, exenatida o lixisenatida).

#### Bajo nivel de azúcar en sangre (hipoglucemia)

Si usa Wegovy junto con un derivado de sulfonilurea o insulina, esto puede aumentar el riesgo de un bajo nivel de azúcar en sangre (hipoglucemia). Consulte la sección 4 para conocer los signos de advertencia de un bajo nivel de azúcar en sangre. Su médico puede pedirle que controle sus niveles de azúcar en sangre. Esto ayudará a su médico a decidir si se debe ajustar la dosis del derivado de sulfonilurea o la insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia.

#### Enfermedad ocular diabética (retinopatía)

Si tiene una enfermedad ocular debido a la diabetes y usa insulina, este medicamento puede llevar a un empeoramiento de su visión y puede necesitar tratamiento. Las mejoras rápidas en el control del azúcar en sangre pueden llevar a un empeoramiento temporal de una enfermedad ocular debido a la diabetes. Póngase en contacto con su médico si tiene una enfermedad ocular diabética y experimenta problemas oculares al usar este medicamento.

#### Cambios repentinos en su visión

Si de repente no puede ver o ve menos durante el tratamiento con este medicamento, contacte inmediatamente a su médico para obtener asesoramiento. Esto puede ser causado por un efecto secundario muy raro llamado neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION) (ver sección 4: Efectos secundarios graves). Su médico puede derivarlo a un examen ocular y tal vez deba suspender el tratamiento con este medicamento.

#### Niños y adolescentes hasta 18 años

La seguridad y eficacia de Wegovy en niños menores de 12 años no han sido estudiadas, no se recomienda el uso de este medicamento en este grupo de edad.

#### ¿Está usando otros medicamentos?

¿Está usando otros medicamentos además de Wegovy, lo ha hecho recientemente o existe la posibilidad de que pronto use otros medicamentos? Informe a su médico, farmacéutico o enfermero.

Póngase en contacto especialmente con su médico, farmacéutico o enfermero si está tomando medicamentos que contengan lo siguiente:

warfarina u otros medicamentos orales que reduzcan la coagulación de su sangre (anticoagulantes orales). Cuando comience el tratamiento con, por ejemplo, warfarina

o medicamentos similares, pueden ser necesarios análisis de sangre más frecuentes para probar la capacidad de coagulación de su sangre.

#### Embarazo y lactancia

Este medicamento no debe usarse durante el embarazo ya que no se sabe si es perjudicial para su hijo no nacido. Por lo tanto, se recomienda el uso de anticonceptivos (métodos anticonceptivos) durante el uso de este medicamento. Si desea quedar embarazada, debe dejar de usar este medicamento al menos dos meses antes. ¿Está embarazada, cree que podría estarlo o desea quedar embarazada mientras usa este medicamento? Entonces, contacte inmediatamente a su médico ya que su tratamiento debe ser suspendido.

No use este medicamento si está amamantando ya que no se sabe si pasa a la leche materna.

#### Conducción y uso de máquinas

Es poco probable que Wegovy afecte su capacidad para conducir y usar máquinas. Algunos pacientes pueden sentirse mareados al usar Wegovy, especialmente durante los primeros 4 meses de tratamiento (ver sección 4). Si se siente mareado, tenga especial cuidado al conducir y usar máquinas. Para más información, contacte a su médico, farmacéutico o enfermero.

#### Personas con diabetes tipo 2

Si usa este medicamento en combinación con un derivado de sulfonilurea o insulina, puede experimentar niveles bajos de azúcar en sangre (hipoglucemia), lo que puede disminuir su capacidad de concentración. Evite conducir o usar maquinaria cuando tenga síntomas de niveles bajos de azúcar en sangre. Consulte la sección 2 '¿Cuándo debe tener especial cuidado con este medicamento?' para obtener información sobre el mayor riesgo de niveles bajos de azúcar en sangre y la sección 4 para los signos de advertencia de niveles bajos de azúcar en sangre. Comuníquese con su médico para obtener más información.

#### Wegovy contiene sodio

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis, es decir, esencialmente 'libre de sodio'.

### 3. ¿Cómo usar este medicamento?

Use este medicamento siempre exactamente como le ha indicado su médico. ¿Tiene dudas sobre el uso correcto? Entonces, póngase en contacto con su médico, farmacéutico o enfermero.

#### ¿Cuánto de este medicamento debe usar?

##### Adultos

La dosis recomendada es de 2,4 mg una vez por semana.

Su tratamiento comenzará con una dosis baja que se incrementará gradualmente durante 16 semanas de tratamiento.

Quando comience a usar Wegovy, la dosis inicial es de 0,25 mg una vez por semana.

Su médico le dará instrucciones para aumentar su dosis gradualmente cada 4 semanas hasta alcanzar la dosis recomendada de 2,4 mg una vez por semana.

Quando haya alcanzado la dosis recomendada de 2,4 mg, no debe aumentarla más.

Si experimenta mucha náusea o vómito, consulte con su médico sobre posponer el aumento de dosis o reducirla a la dosis anterior, hasta que los síntomas disminuyan.

Por lo general, deberá seguir la siguiente tabla.

Aumento de dosis	Dosis semanal
Semana 1–4	0,25 mg
Semana 5–8	0,5 mg
Semana 9–12	1 mg
Semana 13–16	1,7 mg
A partir de la semana 17	2,4 mg

Su médico controlará su tratamiento regularmente.

Adolescentes (mayores de 12 años)

Para los adolescentes se debe aplicar el mismo esquema de aumento de dosis que para los adultos (ver arriba). La dosis debe aumentarse hasta 2,4 mg (dosis de mantenimiento) o hasta que se alcance la dosis máxima tolerada. No se recomiendan dosis superiores a 2,4 mg por semana.

¿Cómo se administra este medicamento?

Wegovy se administra como una inyección subcutánea. No lo inyecte en una vena o músculo.

Los mejores lugares para aplicar la inyección son la parte frontal de su brazo superior, muslos o abdomen.

Antes de usar el bolígrafo por primera vez, su médico, farmacéutico o enfermero le mostrará cómo usar el bolígrafo.

Instrucciones detalladas sobre el uso del bolígrafo se encuentran al otro lado de este prospecto.

Personas con diabetes tipo 2

Informe a su médico si tiene diabetes tipo 2. Su médico puede ajustar la dosis de sus medicamentos para la diabetes para evitar que tenga un nivel bajo de azúcar en sangre.

¿Cuándo usa este medicamento?

Use este medicamento una vez por semana, si es posible, cada semana el mismo día.

Puede inyectarse en cualquier momento del día, independientemente de las comidas.

Si es necesario, puede cambiar el día de su inyección semanal de este medicamento, siempre que hayan pasado al menos 3 días desde su última inyección de este medicamento. Después de seleccionar un nuevo día de administración, la administración debe continuar una vez por semana.

¿Ha usado demasiado de este medicamento?

Póngase en contacto con su médico de inmediato. Puede experimentar efectos secundarios como náuseas, vómitos o diarrea, lo que puede llevar a deshidratación (pérdida de líquidos).

¿Ha olvidado usar este medicamento?

Si olvida inyectarse una dosis y:

han pasado 5 días o menos desde que debió usar Wegovy, úselo tan pronto como lo recuerde. Luego, inyecte su próxima dosis como de costumbre en su día programado.  
han pasado más de 5 días desde que debió usar Wegovy, omita la dosis olvidada.  
Luego, inyecte su próxima dosis como de costumbre en su día programado.

No use una dosis doble para compensar una dosis olvidada.

Si deja de usar este medicamento

No deje de usar este medicamento sin discutirlo con su médico.

¿Tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento? Entonces, póngase en contacto con su médico, farmacéutico o enfermero.

#### 4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede tener efectos secundarios, aunque no todas las personas los sufran.

##### Efectos secundarios graves

Frecuentes (ocurren en menos de 1 de cada 10 usuarios)

Complicaciones de enfermedad ocular por diabetes (retinopatía diabética). Si tiene diabetes, informe a su médico si experimenta problemas oculares durante el tratamiento con este medicamento, como cambios en la visión.

A veces (ocurren en menos de 1 de cada 100 usuarios)

Inflamación del páncreas (pancreatitis aguda). Los síntomas de un páncreas inflamado incluyen dolor severo y prolongado en el estómago, que puede irradiarse hacia la espalda. Debe contactar inmediatamente a su médico si experimenta estos síntomas.

Rara vez (ocurren en menos de 1 de cada 1,000 usuarios)

Reacciones alérgicas graves (reacciones anafilácticas, angioedema). Busque ayuda médica de inmediato e informe a su médico lo antes posible si presenta síntomas como dificultad para respirar, hinchazón, sensación de mareo, ritmo cardíaco rápido, sudoración y pérdida de conciencia o hinchazón rápida bajo la piel en lugares como la cara, la garganta, los brazos y las piernas, lo cual puede ser potencialmente mortal si la hinchazón de la garganta bloquea las vías respiratorias.

Muy raramente (ocurren en menos de 1 de cada 10,000 usuarios)

una afección médica del ojo llamada neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION) que puede hacer que, sin dolor alguno, vea menos o no vea nada con uno de sus ojos. Contacte inmediatamente a su médico si nota que de repente no ve nada o ve menos gradualmente (ver sección 2: 'Cambios repentinos en su visión').

Desconocido (no puede determinarse con los datos disponibles)

Obstrucción intestinal. Una forma grave de obstrucción con síntomas como dolor abdominal, hinchazón, vómitos, etc.

##### Otros efectos secundarios

Muy a menudo (ocurren en más de 1 de cada 10 usuarios)

dolor de cabeza  
náuseas  
vómitos  
diarrea  
estreñimiento (constipación)  
dolor abdominal  
sentirse débil o cansado

- estos ocurren principalmente durante el aumento de dosis y generalmente desaparecen después de un tiempo.

A menudo (ocurren en menos de 1 de cada 10 usuarios)

mareos  
molestias gástricas o dificultades digestivas  
eructos  
formación de gases (flatulencia o ventosidades)  
sensación de hinchazón en el estómago  
estómago inflamado (gastritis) - los síntomas incluyen dolor de estómago, náuseas o vómitos  
reflujo o acidez estomacal - también conocida como enfermedad por reflujo gastroesofágico  
cálculos biliares  
pérdida de cabello  
reacciones en el lugar de la inyección  
la comida y la bebida saben diferente de lo normal  
más o menos sensibilidad en la piel  
bajo nivel de azúcar en sangre (hipoglucemia) en pacientes con diabetes tipo 2.

Los síntomas de advertencia de un nivel bajo de azúcar en sangre pueden aparecer repentinamente. Estos pueden incluir: sudor frío, piel fría y pálida, dolor de cabeza, ritmo cardíaco rápido, náuseas o hambre intensa, cambios en la visión, sentirse somnoliento o débil, sentirse nervioso, ansioso o confundido, dificultad para concentrarse o temblores. Su médico le indicará cómo tratar el nivel bajo de azúcar en sangre y qué hacer si experimenta estos síntomas de advertencia.

Es más probable que ocurra un nivel bajo de azúcar en sangre si también está tomando un derivado de sulfonilurea o insulina. Su médico puede reducir la dosis de estos medicamentos antes de comenzar a usar este medicamento.

A veces (ocurre en menos de 1 de cada 100 usuarios)

baja presión arterial  
mareos o sensación de desvanecimiento al levantarse o sentarse debido a una caída de la presión arterial  
ritmo cardíaco rápido  
aumento de enzimas pancreáticas (como lipasa y amilasa) demostrado en análisis de sangre  
los alimentos permanecen más tiempo de lo normal en el estómago (retardo en el vaciado gástrico).

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta efectos secundarios, póngase en contacto con su médico, farmacéutico o enfermero. Esto también se aplica a posibles efectos secundarios que no se mencionan en este prospecto. También puede notificar los efectos secundarios directamente a través del sistema nacional de notificación como se menciona en el apéndice V. Al notificar efectos secundarios, puede ayudarnos a obtener más información sobre la seguridad de este medicamento.

## 5. ¿Cómo debe conservar este medicamento?

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta del bolígrafo y en la caja de cartón después de EXP. Esta fecha se refiere al último día de ese mes.

Conservar en el refrigerador (2°C – 8°C). No congelar. Mantener alejado del elemento refrigerante. Conservar siempre el bolígrafo en su embalaje original para protegerlo de la luz. Wegovy puede conservarse sin refrigerar durante un máximo de 28 días a una temperatura inferior a 30°C.

Deseche el bolígrafo si ha estado expuesto a la luz o a temperaturas superiores a 30°C, ha estado fuera del refrigerador más de 28 días o ha sido congelado.

No utilice este medicamento si nota que la solución no es clara e incolora.

Después de usar: el bolígrafo es de un solo uso y contiene solo una dosis. Deseche el bolígrafo después de usarlo.

No tire los medicamentos por el desagüe ni los arroje a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos que ya no utiliza. Si elimina los medicamentos de manera adecuada, se destruyen de manera responsable y no llegan al medio ambiente.

## 6. Contenido del envase e información adicional

¿Qué sustancias contiene este medicamento?

- La sustancia activa de este medicamento es semaglutida.  
Wegovy 0,25 mg solución para inyección  
Cada bolígrafo precargado contiene 0,25 mg de semaglutida en 0,5 ml (0,5 mg/ml).

Wegovy 0,5 mg solución para inyección  
Cada pluma precargada contiene 0,5 mg de semaglutida en 0,5 ml (1 mg/ml).

Wegovy 1 mg solución para inyección  
Cada pluma precargada contiene 1,0 mg de semaglutida en 0,5 ml (2 mg/ml).

Wegovy 1,7 mg solución para inyección  
Cada pluma precargada contiene 1,7 mg de semaglutida en 0,75 ml (2,27 mg/ml).

Wegovy 2,4 mg solución para inyección  
Cada pluma precargada contiene 2,4 mg de semaglutida en 0,75 ml (3,2 mg/ml).

- Los otros componentes de este medicamento son dihidratado de fosfato disódico, cloruro de sodio, ácido clorhídrico/hidróxido de sodio (para ajuste de pH), agua para inyecciones. Consulte también la sección 2 'Wegovy contiene sodio' para información sobre el sodio.

¿Cómo se presenta Wegovy y qué contiene el envase?

Wegovy es una solución clara e incolora para inyección en una pluma precargada de un solo uso.

Cada pluma contiene solo una dosis.

Tamaño del envase de 4 plumas precargadas.

Titular de la autorización de comercialización y fabricante Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dinamarca

Este prospecto fue aprobado por última vez en

Este prospecto fue aprobado por última vez en

Otras fuentes de información

Más información sobre este medicamento está disponible en el sitio web de la Agencia

Europea de

Medicamentos: <http://www.ema.europa.eu>

Prospecto: información para el paciente

Wegovy

0.25 mg

0.5 mg

1 mg

1.7 mg

2.4 mg

Wegovy 0,25 mg solución para inyección en una pluma precargada

Wegovy 0,5 mg solución para inyección en una pluma precargada

Wegovy 1 mg solución para inyección en una pluma pluma

Wegovy 1,7 mg solución para inyección en una pluma precargada

Wegovy 2,4 mg solución para inyección en una pluma precargada

Semaglutida

Use Wegovy una vez a la semana

Instrucciones para el uso de Wegovy

Información importante antes de comenzar

El paquete contiene un prospecto y cuatro plumas precargadas de Wegovy.

Esta parte del prospecto trata sobre el uso de la pluma. Consulte el otro lado de este prospecto para obtener más información sobre su medicamento.

Cada pluma es solo para un solo uso.

Se suministra con:

- una dosis preestablecida;
- un protector de aguja que oculta la aguja incorporada antes, durante y después del uso;
- un mecanismo de dosificación automática que comienza cuando el protector de aguja se presiona contra su piel, como le ha explicado su médico o enfermera.

Durante la inyección de la dosis, aparecerá una barra amarilla en la ventana de la pluma. No retire la pluma de su piel hasta que la barra amarilla se detenga. Si lo hace, la administración automática continuará, pero es posible que no reciba su dosis completa.

El protector de aguja se bloqueará cuando se retire la pluma de su piel. No puede detener la inyección a mitad de camino y continuar más tarde.

Las personas ciegas o con discapacidad visual no deben usar la pluma de Wegovy sin la ayuda de una persona capacitada en el uso de Wegovy.

Siga siempre estas instrucciones de uso y cualquier indicación de su médico o enfermera.

Cómo usar su Wegovy

#### 1. Preparar su inyección.

Revise su pluma de Wegovy y asegúrese de que su pluma no se utiliza como:

1. la fecha de caducidad ha pasado
2. parece que el bolígrafo ha sido usado o está dañado, por ejemplo, si se ha caído o no se ha almacenado correctamente
3. el medicamento parece turbio.

Elija su lugar de inyección

Elija un lugar de inyección en una de las partes del cuerpo, como se indica a continuación. Puede elegir sus brazos superiores, muslos o abdomen (mantenga una distancia de 5 cm de su ombligo).

Puede inyectar cada semana en la misma parte del cuerpo, pero asegúrese de no usar el mismo lugar que la vez anterior

#### 2. Retire la tapa del bolígrafo. Tire de la tapa del bolígrafo directamente de su bolígrafo.

### 3. Inyectar Wegovy.

Presione el bolígrafo firmemente contra su piel hasta que la barra amarilla se detenga.

Si la barra amarilla no comienza a moverse, presione el bolígrafo un poco más firmemente contra su piel.

#### ¿Cómo manejo mi bolígrafo de manera segura?

Para obtener información sobre su medicamento, puede consultar el otro lado de este prospecto.

El bolígrafo es para una inyección subcutánea de Wegovy una vez por semana y es solo para uso de una persona.

Consulte siempre las instrucciones en el otro lado de este prospecto y asegúrese de que su médico o enfermera le haya mostrado cómo usar estos bolígrafos.

Mantenga Wegovy siempre fuera de la vista y del alcance de los niños. Además, mantenga la tapa del bolígrafo fuera del alcance de los niños para evitar que la traguen.

Trate su bolígrafo con el cuidado necesario y no lo exponga a la humedad. Un manejo brusco o un uso incorrecto puede hacer que su bolígrafo administre menos de la dosis completa o ninguna dosis.

Mantenga la tapa en el bolígrafo hasta que esté listo para inyectar. Su bolígrafo ya no es estéril si guarda un bolígrafo sin usar sin la tapa, si quita la tapa y la vuelve a poner o si falta la tapa. Esto puede provocar una infección.

Tenga cuidado al manipular su bolígrafo antes de usarlo y no toque la aguja ni el protector de la aguja. La aguja oculta puede causar un pinchazo accidental.

Cada bolígrafo contiene una dosis semanal y no se puede reutilizar. Deséchelo después de usarlo.

#### ¿Cómo debo almacenar mis bolígrafos no utilizados?

Para información sobre cómo almacenar los bolígrafos, consulte la sección 5 al otro lado de este prospecto.

#### ¿Cómo puedo desechar mis bolígrafos?

No tire los medicamentos por el desagüe o el inodoro ni los arroje a la basura. Pregunte a su farmacéutico qué hacer con los medicamentos que ya no usa. Serán destruidos de manera responsable y no llegarán al medio ambiente.