

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Wegovy 0,25 mg süstelahus eeltäidetud süstlas

Wegovy 0,5 mg süstelahus eeltäidetud süstlas

Wegovy 1 mg süstelahus eeltäidetud süstlas

Wegovy 1,7 mg süstelahus eeltäidetud süstlas

Wegovy 2,4 mg süstelahus eeltäidetud süstlasnjectie in een voorgevulde pen semaglutiid

See ravim on täiendava järelevalve all. See võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutus alast teavet. Saate sellele kaasa aidata, teatades kõigist kõrvaltoimetest, mida te võite kogeda. Kuidas seda teha, leiate 4. jaotise lõpus.

Lugege kogu pakendi infoleht hoolikalt läbi enne, kui hakkate seda ravimit kasutama, sest see sisaldab teie jaoks olulist teavet.

- Hoidke see pakendi infoleht alles. Teil võib seda hiljem vaja minna.
- Kas teil on veel küsimusi? Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
- Ärge andke seda ravimit teistele, sest see on määratud ainult teile. See võib olla teistele kahjulik, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.
- Kas teil tekib mõni kõrvaltoime, mis on loetletud jaotises 4? Või tekib teil kõrvaltoime, mida selles infolehes ei ole mainitud? Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Selle infolehe sisu

1. Mis on Wegovy ja milleks seda ravimit kasutatakse?
2. Millal ei tohi seda ravimit kasutada või millal peate olema eriti ettevaatlik?
3. Kuidas seda ravimit kasutada?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas seda ravimit säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on Wegovy ja milleks seda ravimit kasutatakse?

Mis on Wegovy?

Wegovy on kaalulangetamiseks ja kaalu kontrollimiseks mõeldud ravim, mis sisaldab toimeainet semaglutiid. See on sarnane loodusliku hormooniga, mida nimetatakse glükagoonilaadseks peptiidiks-1 (GLP-1), mis vabaneb soolestikust pärast sööki. See toimib ajus asuvatele kohtadele (retseptoritele), mis reguleerivad teie söögiisu, muutes teid täiskõhutundeks ja vähem näljaseks ning vähendades toiduisu. See aitab teil süüa vähem ja kaalust alla võtta. Wegovy võib aidata ka südamehaigusi ennetada.

Milleks seda ravimit kasutatakse?

Wegovy't kasutatakse koos dieedi ja kehalise aktiivsusega kaalulangetamiseks ja kaalu säilitamiseks. Seda kasutatakse täiskasvanutel, kellel on

KMI 30 kg/m² või rohkem (rasvumine) või

KMI vähemalt 27 kg/m², kuid vähem kui 30 kg/m² (ülekaal), kellel on kaaluga seotud

tervisprobleemid (nagu diabeet, kõrge vererõhk, ebanormaalsed rasvatasemed veres,

uneaegsed hingamisraskused, mida nimetatakse obstruktiivseks uneapnoeks, või südameataki, insuldi või veresoonte probleemide ajalugu).

KMI (kehamassiindeks) on mõõt, mis näitab kaalu suhet kehapikkusega.

Wegovy't kasutatakse koos dieedi ja kehalise aktiivsusega kaalu kontrollimiseks noorukitel alates 12. eluaastast, kellel on

rasvumine ja
kehakaal > 60 kg.

Kui olete 12-18-aastane nooruk, peaksite Wegovy't jätkama ainult siis, kui pärast 12 nädalat 2,4 mg annuse või maksimaalselt talutava annusega (vt lõik 3) on teie KMI vähenenud vähemalt 5%. Enne jätkamist võtke ühendust oma arstiga.

2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?

Millal ei tohi te seda ravimit kasutada?

Te olete allergiline selle ravimi mõne koostisosa suhtes. Neid aineid leiate lõigust 6.

Millal peate selle ravimiga eriti ettevaatlik olema?

Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega enne selle ravimi kasutamist.

Wegovy kasutamine ei ole soovitatav, kui te:

kasutate teisi kaalulangetustooteid;
teil on 1. tüüpi diabeet;
teil on tõsiselt vähenenud neerufunktsioon;
teil on tõsiselt vähenenud maksafunktsioon;
teil on raske südamepuudulikkus;
teil on diabeetiline silmahaigus (retinopaatia).

Wegovy kasutamise kogemus on piiratud patsientidel:

vanuses 85 aastat ja vanemad;
maksaprobleemidega;
raske mao- või sooleprobleemidega, mis põhjustavad mao tühjenemise aeglustumist (seda nimetatakse gastropareesiks), või soolepõletikuga.

Konsulteerige oma arstiga, kui mõni ülaltoodud asjaolu kehtib teie kohta.

Kui te teate, et peate läbima operatsiooni, mille käigus teid hoitakse narkoosis (unes), rääkige oma arstile, et kasutate Wegovy't.

Dehüdratsioon

Wegovy raviga võivad kaasnedä iiveldus, oksendamine või kõhulahtisus. Need kõrvaltoimed võivad põhjustada dehüdratsiooni (vedelikukaotust). On oluline, et te joote palju, et vältida dehüdratsiooni. See on eriti oluline, kui teil on neeruprobleemid. Võtke ühendust oma arstiga, kui teil on küsimusi või muresid.

Kõhunäärme põletik

Võtke viivitamatult ühendust arstiga, kui teil on tugev ja püsiv valu kõhupiirkonnas (vt lõik 4). See võib viidata põletikulisele kõhunäärmele (äge pankreatiit).

Inimesed, kellel on 2. tüüpi diabeet

Wegovy't ei tohi kasutada insuliini asendajana. Ärge kasutage Wegovy't koos teiste ravimitega, mis sisaldavad GLP-1 retseptori agoniste (nagu liraglutiid, dulaglutiid, eksenatiid või liksisenatiid).

Madal veresuhkur (hüpoglükeemia)

Kui kasutate Wegovy't koos sulfonüüluurea derivaatide või insuliiniga, võib see suurendada madala veresuhkru (hüpoglükeemia) riski. Vaadake jaotist 4 madala veresuhkru hoiatavate sümptomite kohta. Teie arst võib paluda teil kontrollida oma veresuhkru taset. See aitab teie arstil otsustada, kas sulfonüüluurea derivaatide või insuliini annust tuleb kohandada, et vähendada madala veresuhkru riski.

Diabeetiline silmahaigus (retinopaatia)

Kui teil on diabeedist tingitud silmahaigus ja kasutate insuliini, võib see ravim põhjustada teie nägemise halvenemist ning see võib vajada ravi. Kiired paranemised veresuhkru reguleerimises võivad põhjustada diabeedist tingitud silmahaiguse ajutist halvenemist. Võtke ühendust oma arstiga, kui teil on diabeetiline silmahaigus ja kogete selle ravimi kasutamisel silmaprobleeme.

Äkilised muutused teie nägemises

Kui te ei näe äkki midagi või näete kiiresti halvemini selle ravimi kasutamise ajal, võtke kohe ühendust oma arstiga nõu saamiseks. Selle põhjuseks võib olla väga haruldane kõrvaltoime, mida nimetatakse mitteaarteriitiliseks eesmiseks isheemiliseks optilise neuropaatia (NAION) (vt jaotis 4: Tõsised kõrvaltoimed). Teie arst võib teid suunata silmauringule ja võib-olla peate selle ravimi kasutamise lõpetama.

Lapsed ja noorukid kuni 18 aastat

Wegovy ohutust ja efektiivsust alla 12-aastastel lastel ei ole uuritud, seetõttu ei ole soovitatav seda ravimit selles vanuserühmas kasutada.

Kas kasutate veel teisi ravimeid?

Kas kasutate lisaks Wegovy'le veel teisi ravimeid, olete seda hiljuti teinud või on võimalus, et hakkate varsti teisi ravimeid kasutama? Rääkige sellest oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele.

Võtke eriti ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega, kui kasutate ravimeid, mis sisaldavad järgmist:

varfariin või teised suu kaudu manustatavad (oraalsed) ravimid, mis vähendavad teie vere hüübimist (oraalsed antikoagulandid). Kui alustate ravi näiteks varfariini või sarnaste ravimitega, võib vere hüübimisvõime testimiseks olla sagedamini vaja vereanalüüse.

Rasedus ja imetamine

Seda ravimit ei tohi kasutada raseduse ajal, kuna ei ole teada, kas see on teie sündimata lapsele kahjulik. Seetõttu on soovitatav kasutada rasestumisvastaseid vahendeid (rasestumisvastaseid vahendeid) selle ravimi kasutamise ajal. Kui soovite rasestuda, peate selle ravimi kasutamise lõpetama vähemalt kaks kuud ette. Kas olete rase, arvate, et olete rase või soovite rasestuda selle ravimi kasutamise ajal? Võtke kohe ühendust oma arstiga, sest teie ravi tuleb lõpetada.

Ärge kasutage seda ravimit, kui toidate last rinnaga, kuna ei ole teada, kas see jõuab rinnapiima.

Sõiduvõime ja masinate kasutamine

Wegovy ei mõjuta tõenäoliselt teie sõiduvõimet ja masinate kasutamise võimet. Mõned patsiendid võivad Wegovy kasutamisel tunda pearinglust, eriti ravi esimese 4 kuu jooksul (vt jaotis 4). Kui tunnete pearinglust, olge autojuhtimisel ja masinate kasutamisel eriti ettevaatlik. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Inimesed, kellel on 2. tüüpi diabeet

Kui kasutate seda ravimit koos sulfonüüluurea derivaatide või insuliiniga, võib teil tekkida madal veresuhkur (hüpoglükeemia), mis võib vähendada teie keskendumisvõimet. Vältige autojuhtimist või masinate kasutamist, kui teil esinevad madala veresuhkru sümptomid. Lisateabe saamiseks madala veresuhkru riski kohta vaadake jaotist 2 'Millal peate selle ravimiga olema eriti ettevaatlik?' ja jaotist 4 madala veresuhkru hoiatavate sümptomite kohta. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma arstiga.

Wegovy sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, mis tähendab, et see on sisuliselt 'naatriumivaba'.

3. Kuidas seda ravimit kasutada?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile öelnud. Kui teil on kahtlusi õige kasutamise osas, võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui palju seda ravimit peate kasutama?

Täiskasvanud

Soovitav annus on 2,4 mg üks kord nädalas.

Teie ravi alustatakse madala annusega, mida suurendatakse järk-järgult 16-nädalase ravi jooksul.

Kui alustate Wegovy kasutamist, on algannus 0,25 mg üks kord nädalas.

Teie arst annab teile juhised, kuidas oma annust iga 4 nädala järel järk-järgult suurendada, kuni jõuate soovitatava annuseni 2,4 mg üks kord nädalas.

Kui olete saavutanud soovitatava annuse 2,4 mg, ei tohi te seda annust enam suurendada.

Kui teil tekib tugev iiveldus või oksendamine, pidage nõu oma arstiga annuse suurendamise edasilükkamise või eelmise annuse vähendamise kohta, kuni sümptomid vähenevad.

Tavaliselt peate järgima järgmist tabelit.

Annuse suurendamine	Nädalaannus
Nädal 1–4	0,25 mg
Nädal 5–8	0,5 mg
Nädal 9–12	1 mg
Nädal 13–16	1,7 mg
Alates 17. nädalast	2,4 mg

Teie arst kontrollib regulaarselt teie ravi.

Noorukid (vanemad kui 12 aastat)

Noorukitele tuleb rakendada sama annuse suurendamise skeemi nagu täiskasvanutele (vt eespool). Annust tuleb suurendada kuni 2,4 mg-ni (säilitusannus) või kuni maksimaalselt talutava annuseni. Annuseid, mis ületavad 2,4 mg nädalas, ei soovitata.

Kuidas seda ravimit manustatakse?

Wegovy manustatakse nahaaluse süstina (subkutaanne süst). Ärge süstige seda veeni või lihasesse.

Parimad kohad süstimiseks on teie õlavarre esikülg, reied või kõht.

Enne kui kasutate pliiaatsit esimest korda, näitab teie arst, apteeker või õde teile, kuidas pliiaatsit kasutada.

Üksikasjalikud juhised pliiaatsi kasutamise kohta leiate selle infolehe teiselt poolt.

2. tüüpi diabeediga inimesed

Teavitage oma arsti, kui teil on 2. tüüpi diabeet. Teie arst võib kohandada teie diabeediravimite annust, et vältida madalat veresuhkrut.

Millal seda ravimit kasutada?

Kasutage seda ravimit kord nädalas, kui võimalik, iga nädal samal päeval.

Võite endale süsti teha igal ajal päeval - sõltumata söögikordadest.

Vajadusel võite muuta selle ravimi iganädalase süsti päeva, kui see on olnud vähemalt 3 päeva pärast teie viimast süsti. Pärast uue manustamispäeva valimist tuleb manustamist jätkata kord nädalas.

Kas olete seda ravimit liiga palju kasutanud?

Võtke kohe ühendust oma arstiga. Teil võivad tekkida kõrvaltoimed, nagu iiveldus, oksendamine või kõhulahtisus, mis võivad viia dehüdratsioonini (vedelikukaotus).

Kas unustasite seda ravimit kasutada?

Kui unustate annuse süstida ja:

kui Wegovy oleks pidanud kasutama 5 päeva või vähem tagasi, kasutage seda kohe, kui meelde tuleb. Seejärel süstige oma järgmine annus tavapärasel planeeritud päeval.

kui Wegovy oleks pidanud kasutama rohkem kui 5 päeva tagasi, jätke vahelejäädud annus vahele. Seejärel süstige oma järgmine annus tavapärasel planeeritud päeval.

Ärge kasutage kahekordset annust, et unustatud annust tasa teha.

Kui lõpetate selle ravimi kasutamise

Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist ilma arstiga konsulteerimata.

Kas teil on veel küsimusi selle ravimi kasutamise kohta? Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu iga ravim, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi mitte kõigil ei pruugi neid tekkida.

Tõsised kõrvaltoimed

Sageli (esinevad vähem kui 1-l kasutajal 10-st)

Diabeedist tingitud silmahaiguse tüsistused (diabeetiline retinopaatia). Kui teil on diabeet, teavitage oma arsti, kui teil tekivad selle ravimi kasutamise ajal silmaprobleemid, nagu nägemise muutused.

Mõnikord (esinevad vähem kui 1-l kasutajal 100-st)

Kõhunäärme põletik (äge pankreatiit). Kõhunäärme põletiku sümptomiteks on muu hulgas tugev ja pikaajaline valu kõhus, mis võib kiirguda selga. Kui teil esinevad need sümptomid, peate viivitamatult pöörduma arsti poole.

Harva (esineb vähem kui 1-l kasutajal 1000-st)

Tõsised allergilised reaktsioonid (anafülaktilised reaktsioonid, angioödeem). Otsige viivitamatult meditsiinilist abi ja teavitage oma arsti nii kiiresti kui võimalik, kui teil tekivad sellised sümptomid nagu hingamisraskused, turse, peapööritus, kiire südametegevus, higistamine ja teadvusekaotus või kiire turse naha all sellistes kohtades nagu nägu, kõri, käed ja jalad, mis võivad olla eluohtlikud, kui kõri turse tõttu hingamisteed sulguvad.

Väga harva (esineb vähem kui 1-l kasutajal 10 000-st)

silma meditsiiniline seisund, mida nimetatakse mittearteriitiliseks eesmiseks isheemiliseks optilise neuropaatia (NAION), mis võib põhjustada, et te näete ühe silmaga vähem või üldse mitte, ilma igasuguse valuta. Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui märkate, et äkki ei näe midagi või nägemine halveneb aeglaselt (vt jaotis 2: 'Äkilised muutused teie nägemises').

Pole teada (ei saa olemasolevate andmete põhjal määrata)

Soole ummistus. Tõsine ummistuse vorm koos selliste sümptomitega nagu kõhuvalu, puhitus, oksendamine jne.

Muud kõrvaltoimed

Väga sageli (esineb rohkem kui 1-l kasutajal 10-st)

peavalu
iiveldus
oksendamine
kõhulahtisus
kõhukinnisus (obstipatsioon)
kõhuvalu
nõrkuse või väsimuse tunne

- need esinevad peamiselt annuse suurendamise ajal ja kaovad tavaliselt mõne aja pärast.

Sageli (esineb vähem kui 1-l kasutajal 10-st)

peapööritus
maoärevused või seedehäired
rõhitsemine

gaaside teke (flatulentsus või kõhupuhitus)
puhitustunne maos
maopõletik (gastriit) - sümptomiteks on muu hulgas kõhuvalu, iiveldus või oksendamine
refluks või kõrvetised - tuntud ka kui gastroösofageaalne reflukshaigus
sapikivid
juuste väljalangemine
reaktsioonid süstekohal
toit ja jook maitsevad teisiti kui tavaliselt
rohkem või vähem tundlikkust nahas
madal veresuhkru tase (hüpoglükeemia) II tüüpi diabeediga patsientidel.

Madala veresuhkru hoiatavad sümptomid võivad tekkida äkki. Need võivad olla: külm higi, jahe kahvatu nahk, peavalu, kiire südametegevus, iiveldus või tugev näljatunne, nägemise muutused, unisuse või nõrkuse tunne, närvilisuse, ärevuse või segaduse tunne, keskendumisraskused või värisemine.

Teie arst ütleb teile, kuidas madalat veresuhkrut ravida ja mida teha, kui teil need hoiatavad sümptomid tekivad.

Madal veresuhkur tekib tõenäolisemalt, kui kasutate ka sulfonüüluurea derivaati või insuliini. Teie arst võib nende ravimite annust vähendada enne, kui alustate selle ravimi kasutamist.

Mõnikord (esineb vähem kui 1-l 100-st kasutajast)

madal vererõhk
pearinglus või kerge peapööritus püsti tõustes või istudes vererõhu languse tõttu
kiire südametegevus
kõhunäärmeensüümide (nagu lipaas ja amülaas) taseme tõus, mida näitavad vereanalüüsid
toit püsib maos kauem kui tavaliselt (aeglustunud mao tühjenemine).

Kõrvaltoimete teatamine

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. See kehtib ka võimalike kõrvaltoimete kohta, mida selles infolehes ei ole loetletud. Kõrvaltoimetest saate teatada ka otse riikliku teavitussüsteemi kaudu, nagu on märgitud lisas V.

Kõrvaltoimetest teatades saate aidata meil saada rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

5. Kuidas seda ravimit säilitada?

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu. See on märgitud pliiatsi etiketil ja karbil pärast EXP. Seal on kuu ja aasta. Selle kuu viimane päev on kõlblikkusaja lõpp.

Hoida külmkapis (2°C – 8°C). Mitte hoida sügavkülmas. Hoida eemal külmaelemendist. Hoidke pliiats alati originaalpakendis, et kaitsta seda valguse eest. Wegovy't võib hoida külmkapist väljas kuni 28 päeva temperatuuril alla 30°C.

Visake pliiats ära, kui see on olnud valguse või temperatuuride üle 30°C käes, olnud külmkapist väljas rohkem kui 28 päeva või olnud külmunud.

Ärge kasutage seda ravimit, kui märkate, et lahus ei ole selge ja värvitu.

Pärast kasutamist: pliiats on ühekordseks kasutamiseks ja sisaldab ainult ühte annust. Visake pliiats pärast kasutamist ära.

Ärge visake ravimeid kraanikaussi või WC-sse ega prügikasti. Küsige oma apteekrilt, mida teha ravimitega, mida te enam ei kasuta. Kui te hävitate ravimeid õigesti, hävitatakse need vastutustundlikult ja need ei satu keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Millised ained on selles ravimis?

- Selle ravimi toimeaine on semaglutiid.

Wegovy 0,25 mg süstelahus

Iga eeltäidetud pliiats sisaldab 0,25 mg semaglutiidi 0,5 ml-s (0,5 mg/ml).

Wegovy 0,5 mg süstelahus

Iga eeltäidetud pen sisaldab 0,5 mg semaglutiidi 0,5 ml-s (1 mg/ml).

Wegovy 1 mg süstelahus

Iga eeltäidetud pen sisaldab 1,0 mg semaglutiidi 0,5 ml-s (2 mg/ml).

Wegovy 1,7 mg süstelahus

Iga eeltäidetud pen sisaldab 1,7 mg semaglutiidi 0,75 ml-s (2,27 mg/ml).

Wegovy 2,4 mg süstelahus

Iga eeltäidetud pen sisaldab 2,4 mg semaglutiidi 0,75 ml-s (3,2 mg/ml).

- Selle ravimi teised ained on dinaatriumfosfaatdihüdraat, naatriumkloriid, soolhape/naatriumhüdrosiid (pH kohandamiseks), süstevesi. Vaata ka jaotist 2 'Wegovy sisaldab naatriumi' teabe saamiseks naatriumi kohta.

Kuidas Wegovy välja näeb ja kui palju on pakendis?

Wegovy on selge ja värvitu süstelahus ühekordseks kasutamiseks mõeldud eeltäidetud pen-süstlas.

Iga pen sisaldab ainult ühte annust.

Pakendi suurus: 4 eeltäidetud pen-süstalt.

Müügiloa hoidja ja tootja Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Taani

See pakendi infoleht on viimati heaks kiidetud

Seda pakendi infolehte on viimati heaks kiidetud

Muud teabeallikad

Lisateavet selle ravimi kohta leiate Euroopa veebisaidilt

Ravimiamet: <http://www.ema.europa.eu>

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Wegovy

0.25 mg 0.5 mg 1 mg 1.7 mg 2.4 mg

Wegovy 0,25 mg süstelahus eeltäidetud süstlis

Wegovy 0,5 mg süstelahus eeltäidetud süstlis

Wegovy 1 mg süstelahus eeltäidetud süstlis

Wegovy 1,7 mg süstelahus eeltäidetud süstlis

Wegovy 2,4 mg lahus süstimiseks eeltäidetud pliiatsis

Semaglutiid

Kasutage Wegovy't kord nädalas

Wegovy kasutusjuhised

Oluline teave enne alustamist

Pakend sisaldab ühte infolehte ja nelja Wegovy eeltäidetud pliiatsit.

See osa infolehest käsitleb pliiatsi kasutamist. Lisateabe saamiseks oma ravimi kohta vaadake infolehe teist poolt.

Iga pliiats on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.

See sisaldab:

- üht eelnevalt määratud annust;
- nõelakaitset, mis varjab sisseehitatud nõela enne, ajal ja pärast kasutamist;
- automaatselt doseerivat mehhanismi, mis käivitub, kui nõelakaitse surutakse vastu teie nahka, nagu arst või õde on selgitanud.

Annuse süstimise ajal muutub pliiatsi aknas nähtavaks kollane riba. Ärge eemaldage pliiatsit nahalt enne, kui kollane riba on peatunud. Kui te seda teete, jätkub automaatne manustamine, kuid te ei pruugi saada kogu annust.

Nõelakaitse lukustub, kui pliiats eemaldatakse teie nahalt. Te ei saa süstimist vahepeal peatada ja hiljem jätkata.

Pimedad või vaegnägijad ei tohi Wegovy pliiatsit kasutada ilma Wegovy kasutamises kogunud inimese abita.

Järgige alati neid kasutusjuhiseid ja oma arsti või õe juhiseid.

Kuidas kasutada oma Wegovy't

1. Valmistage oma süst ette.

Kontrollige oma Wegovy pliiatsit ja veenduge, et teie pliiats nkasutatakse kui:

1. aegumiskuupäevon möödunud
2. tundub, et pliiatsit on kasutatud või see on kahjustatud, näiteks kui see on kukkunud või mitte õigesti säilitatud
3. ravimnäeb hägune välja.

Valige oma süstekohtkoht

Valige süstekoht ühel kehaosadest, nagu allpool näidatud. Võite valida oma õlavarred, reied või kõhu (hoidke 5 cm kaugusel naba). Võite igal nädalal süstida samasse kehaossa, kuid veenduge, et te ei kasutaks sama kohta kui eelmine kord.

2. Eemaldage pliiatsikork. Tõmmake pliiatsikork otse pliiatsilt.
3. Süstige Wegovy.

Vajutage pliiats kindlalt oma naha vastu, kuni kollane riba peatub.

Kui kollane riba ei hakka liikuma, vajutage pliiatsit veidi tugevamalt oma naha vastu.

Kuidas ma oma pliiatsit ohutult käsitsen?

Teabe saamiseks oma ravimi kohta vaadake selle infolehe teist poolt.

Pliiats on mõeldud üheks nahaaluseks süsteks Wegovy'ga kord nädalas ja on mõeldud ainult ühe inimese kasutamiseks.

Vaadake alati selle infolehe teisel poolel olevaid juhiseid ja veenduge, et teie arst või õde on teile näidanud, kuidas neid pliiatseid kasutada.

Konsulteerige alati selle infolehe teisel poolel olevaid juhiseid ja veenduge, et teie arst või meditsiiniõde on teile näidanud, kuidas neid pliiatseid kasutada.

Hoidke Wegovy alati laste silmade ja käte alt eemal. Lisaks hoidke pliiatsi korki laste käeulatusest eemal, et vältida selle allaneelamist.

Käsitsege oma pliiatsit hoolikalt ja ärge jätke seda niiskuse kätte. Karm käsitsemine või vale kasutamine võib põhjustada, et teie pliiats ei anna täisannust või ei anna üldse annust.

Hoidke kork pliiatsil, kuni olete valmis süstima. Teie pliiats ei ole enam steriilne, kui hoiate kasutamata pliiatsit ilma korgita, kui eemaldate korgi ja panete selle tagasi või kui kork puudub. See võib põhjustada infektsiooni.

Olge enne kasutamist ettevaatlik oma pliiatsi käsitsemisel ja ärge puudutage nõela ega nõelakaitset. Peidetud nõel võib põhjustada juhuslikku nõelatorke.

Iga pliiats sisaldab ühte nädalast annust ja seda ei saa uuesti kasutada. Visake see pärast kasutamist ära.

Kuidas ma oma kasutamata pliiatseid säilitan?

Teabe saamiseks pliiatsite säilitamise kohta vaadake selle infolehe teisel poolel jaotist 5.

Kuidas ma saan oma pliiatseid ära visata?

Ärge loputage ravimeid kraanikausist või WC-st alla ja ärge visake neid prügikasti. Küsige oma apteekrilt, mida teha ravimitega, mida te enam ei kasuta. Need hävitatakse vastutustundlikult ja ei satu keskkonda.