

## Pakkausseloste: tietoa potilaalle

Wegovy 0,25 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä  
Wegovy 0,5 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä  
Wegovy 1 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä  
Wegovy 1,7 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä  
Wegovy 2,4 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä  
semaglutidi

Tämä lääkevalmiste on lisäseurannan alainen. Näin voidaan nopeasti tunnistaa uutta turvallisuustietoa. Voit auttaa raportoimalla kaikista mahdollisista haittavaikutuksista, joita saatat kokea. Kohdassa 4 kerrotaan, miten voit tehdä tämän.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin uudelleen.
- Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä lääkäriisi, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.
- Älä anna tätä lääkettä muille, sillä se on määrätty vain sinulle. Se voi olla haitallista muille, vaikka heillä olisi samanlaisia oireita kuin sinulla.
- Saatko jonkin kohdassa 4 mainituista haittavaikutuksista? Tai saatko haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa? Ota yhteyttä lääkäriisi, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.

Tämän pakkausselosteen sisältö

1. Mitä Wegovy on ja mihin sitä käytetään?
2. Milloin et saa käyttää tätä lääkettä tai milloin sinun on oltava erityisen varovainen?
3. Miten tätä lääkettä käytetään?
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Miten tätä lääkettä säilytetään?
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

### 1. Mikä Wegovy on ja mihin sitä käytetään?

Mikä Wegovy on?

Wegovy on laihtumiseen ja painonhallintaan tarkoitettu lääke, joka sisältää vaikuttavana aineena semaglutidia. Se on samanlainen kuin luonnollinen hormoni nimeltä 'glukagonin kaltainen peptidi-1' (GLP-1), joka vapautuu suolistosta aterian jälkeen. Se vaikuttaa aivojen alueisiin (reseptoreihin), jotka säätelevät ruokahalua, jolloin tunnet olosi kylläiseksi ja vähemmän nälkäiseksi ja sinulla on vähemmän halua syödä. Tämä auttaa sinua syömään vähemmän ja laihtumaan. Wegovy voi myös auttaa ehkäisemään sydänsairauksia.

Mihin tätä lääkettä käytetään?

Wegovyä käytetään yhdessä ruokavalion ja liikunnan kanssa laihtumiseen ja painon ylläpitämiseen. Sitä käytetään aikuisilla, joilla on

BMI 30 kg/m<sup>2</sup> tai enemmän (liikalihavuus) tai

BMI vähintään 27 kg/m<sup>2</sup>, mutta alle 30 kg/m<sup>2</sup> (ylipaino), joilla on painoon liittyviä

terveysongelmia (kuten diabetes, korkea verenpaine, epänormaali veren rasva-arvot,

unenaikaiset hengitysvaikeudet, joita kutsutaan 'obstruktiiviseksi uniapneaksi', tai sydänkohtauksen, aivohalvauksen tai verisuoniongelmien historia).

BMI (Body Mass Index) on mitta painosta suhteessa pituuteen.

Wegovyä käytetään yhdessä ruokavalion ja liikunnan kanssa painonhallintaan 12-vuotiailla ja sitä vanhemmilla nuorilla, joilla on

liikalihavuus ja  
paino > 60 kg.

Jos olet nuori potilas, joka on 12–18-vuotias, sinun tulee jatkaa Wegovyn käyttöä vain, jos 12 viikon jälkeen annoksella 2,4 mg tai suurimmalla siedettävällä annoksella (katso kohta 3) BMI:si on laskenut vähintään 5 %. Ota yhteyttä lääkäriisi ennen kuin jatkat.

2. Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää tai on oltava erityisen varovainen?

Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää?

Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineelle. Nämä aineet löydät kohdasta 6.

Milloin sinun tulee olla erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?

Ota yhteyttä lääkäriisi, apteekkiin tai sairaanhoitajaan ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Wegovyn käyttöä ei suositella, jos:

käytät muita painonpudotustuotteita;  
sinulla on tyypin 1 diabetes;  
sinulla on vakavasti heikentynyt munuaisten toiminta;  
sinulla on vakavasti heikentynyt maksan toiminta;  
sinulla on vakava sydämen vajaatoiminta;  
sinulla on diabeettinen silmänsairaus (retinopatia).

Wegovyn käytöstä on vähän kokemusta potilailla:

85-vuotiailla ja vanhemmilla;  
joilla on maksavaivoja;  
joilla on vakavia maha- tai suolisto-ongelmia, jotka johtavat mahalaukun tyhjentymisen hidastumiseen (tätä kutsutaan gastropareesiksi), tai joilla on suolistotulehdus.

Keskustele lääkärisi kanssa, jos jokin edellä mainituista koskee sinua.

Jos tiedät, että sinulle tehdään leikkaus, jossa sinut pidetään nukutuksessa (unessa), kerro lääkärillesi, että käytät Wegovyä.

Nestehukka

Wegovy-hoidon aikana voit kokea pahoinvointia, oksentelua tai ripulia. Nämä haittavaikutukset voivat aiheuttaa nestehukkaa (nesteen menetystä). On tärkeää juoda runsaasti nesteitä nestehukan välttämiseksi. Tämä on erityisen tärkeää, jos sinulla on munuaisongelmia. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla on kysyttävää tai olet huolissasi.

Haimatulehdus

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos sinulla on voimakasta ja jatkuvaa kipua vatsan alueella (katso kohta 4). Tämä voi viitata tulehtuneeseen haimaan (akuutti haimatulehdus).

Tyypin 2 diabetesta sairastavat ihmiset

Wegovyä ei voida käyttää insuliinin korvikkeena. Älä käytä Wegovyä yhdessä muiden lääkkeiden kanssa, jotka sisältävät GLP-1-reseptoriagonisteja (kuten liraglutidi, dulaglutidi, exenatidi tai liksisenatidi).

Matala verensokeri (hypoglykemia)

Jos käytät Wegovyä yhdessä sulfonyyliureajohdannaisten tai insuliinin kanssa, se voi lisätä matalan verensokerin (hypoglykemian) riskiä. Katso kohta 4 matalan verensokerin varoitusmerkeistä. Lääkärisi saattaa pyytää sinua seuraamaan verensokeritasojasi. Tämä auttaa lääkäriäsi päättämään, onko sulfonyyliureajohdannaisen tai insuliinin annosta tarpeen muuttaa matalan verensokerin riskin vähentämiseksi.

Diabeettinen silmäsairaus (retinopatia)

Jos sinulla on diabeteksen aiheuttama silmäsairaus ja käytät insuliinia, tämä lääke voi johtaa näkökyvyn heikkenemiseen, ja se saattaa vaatia hoitoa. Nopeat parannukset verensokerin säätelyssä voivat johtaa diabeteksen aiheuttaman silmäsairauden tilapäiseen pahenemiseen. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla on diabeettinen silmäsairaus ja koet silmäoireita käyttäessäsi tätä lääkettä.

Äkilliset muutokset näkökyvyssäsi

Jos et yhtäkkiä näe mitään tai näkösi heikkenee nopeasti tämän lääkkeen käytön aikana, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi saadaksesi neuvoja. Tämä voi johtua erittäin harvinaisesta haittavaikutuksesta, jota kutsutaan ei-arteriittiseksi anterioriseksi iskeemiseksi optikusneuropatiaksi (NAION) (katso kohta 4: Vakavat haittavaikutukset). Lääkärisi voi ohjata sinut silmätutkimukseen, ja saatat joutua lopettamaan tämän lääkkeen käytön.

Lapset ja nuoret alle 18-vuotiaat

Wegovyn turvallisuutta ja tehoa alle 12-vuotiailla lapsilla ei ole tutkittu, eikä tämän lääkkeen käyttöä suositella tässä ikäryhmässä.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Käytätkö Wegovyn lisäksi muita lääkkeitä, oletko äskettäin käyttänyt tai aiotko mahdollisesti käyttää muita lääkkeitä lähitulevaisuudessa? Kerro siitä lääkärillesi, apteekkarillesi tai sairaanhoitajallesi.

Ota erityisesti yhteyttä lääkäriisi, apteekkariisi tai sairaanhoitajaasi, jos käytät lääkkeitä, jotka sisältävät seuraavia:

varfariini tai muut suun kautta otettavat lääkkeet, jotka vähentävät veren hyytymistä (oraaliset antikoagulantit). Kun aloitat hoidon esimerkiksi varfariinilla tai vastaavilla lääkkeillä, verikokeet veren hyytymiskyvyn testaamiseksi voivat olla tarpeen useammin.

Raskaus ja imetys

Tätä lääkettä ei saa käyttää raskauden aikana, koska ei tiedetä, onko se haitallista syntymättömälle lapsellesi. Siksi suositellaan ehkäisyä

(ehkäisyvälineiden) käyttöä tämän lääkkeen käytön aikana. Jos haluat tulla raskaaksi, sinun on lopetettava tämän lääkkeen käyttö vähintään kaksi kuukautta etukäteen. Oletko raskaana, epäiletkö olevasi raskaana tai haluatko tulla raskaaksi tämän lääkkeen käytön aikana? Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, koska hoitosi on lopetettava.

Älä käytä tätä lääkettä, jos imetät, koska ei tiedetä, erittyykö se äidinmaitoon.

#### Ajaminen ja koneiden käyttö

Wegovy ei todennäköisesti vaikuta ajokykyysi tai kykyysi käyttää koneita. Jotkut potilaat voivat tuntea huimausta Wegovyn käytön aikana, erityisesti hoidon ensimmäisten 4 kuukauden aikana (katso kohta 4). Jos tunnet huimausta, ole erityisen varovainen ajaessasi ja käyttäessäsi koneita. Ota lisätietoja varten yhteyttä lääkäriisi, apteekkariisi tai sairaanhoitajaasi.

#### Ihmiset, joilla on tyypin 2 diabetes

Jos käytät tätä lääkettä yhdessä sulfonyyliureajohdannaisten tai insuliinin kanssa, voit saada matalan verensokerin (hypoglykemia), mikä voi heikentää keskittymiskykyäsi. Vältä autolla ajamista tai koneiden käyttöä, kun sinulla on matalan verensokerin oireita. Katso kohta 2 'Milloin sinun tulee olla erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?' saadaksesi tietoa lisääntyneestä matalan verensokerin riskistä ja kohta 4 matalan verensokerin varoitusoireista. Ota yhteyttä lääkäriisi saadaksesi lisätietoja.

#### Wegovy sisältää natriumia

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) annosta kohden, eli se on käytännössä 'natriumvapaa'.

### 3. Miten käytät tätä lääkettä?

Käytä tätä lääkettä aina juuri siten kuin lääkärisi on sinulle kertonut. Epäiletkö oikeaa käyttöä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi, apteekkihenkilökuntaan tai sairaanhoitajaan.

#### Kuinka paljon tätä lääkettä sinun tulee käyttää?

##### Aikuiset

Suosittelun annos on 2,4 mg kerran viikossa.

Hoitosi aloitetaan pienellä annoksella, jota nostetaan asteittain 16 viikon hoidon aikana.

Kun aloitat Wegovyn käytön, aloitusannos on 0,25 mg kerran viikossa.

Lääkärisi antaa sinulle ohjeet annoksen asteittaisesta nostamisesta joka 4. viikko, kunnes saavutat suositellun annoksen 2,4 mg kerran viikossa.

Kun olet saavuttanut suositellun annoksen 2,4 mg, älä nosta annosta enempää.

Jos sinulla on paljon pahoinvointia tai oksentelua, keskustele lääkärisi kanssa annoksen noston lykkäämisestä tai annoksen alentamisesta edelliseen annokseen, kunnes oireet vähenevät.

Yleensä sinun tulee noudattaa seuraavaa taulukkoa.

#### Annosnosto Viikoittainen annos

Viikko 1–4	0,25 mg
Viikko 5–8	0,5 mg
Viikko 9–12	1 mg

Viikko 13–16 1,7 mg  
Viikosta 17 alkaen 2,4 mg

Lääkärisi tarkistaa hoitosi säännöllisesti.

Nuoret (yli 12-vuotiaat)

Nuorille tulee soveltaa samaa annoksenkorotusaikataulua kuin aikuisille (katso yllä). Annos tulee nostaa 2,4 mg:aan (ylläpitoannos) tai kunnes suurin siedetty annos on saavutettu. Yli 2,4 mg:n viikkoannoksia ei suositella.

Miten tätä lääkettä annetaan?

Wegovy annetaan ihonalaisena injektiona (subkutaaninen injektio). Älä injektioi sitä laskimoon tai lihakseen.

Parhaat paikat injektion antamiseen ovat olkavarren etupuoli, reidet tai vatsa. Ennen kuin käytät kynää ensimmäistä kertaa, anna lääkärisi, apteekkarisi tai sairaanhoitajasi näyttää, miten kynää käytetään.

Yksityiskohtaiset ohjeet kynän käytöstä löydät tämän pakkausselosteen toiselta puolelta.

Tyypin 2 diabetesta sairastavat

Kerro lääkäriillesi, jos sinulla on tyypin 2 diabetes. Lääkärisi voi säätää diabeteslääkkeidesi annosta estääkseen matalan verensokerin.

Milloin käytät tätä lääkettä?

Käytä tätä lääkettä kerran viikossa, jos mahdollista, aina samana viikonpäivänä. Voit pistää itsesi mihin aikaan päivästä tahansa - riippumatta aterioista.

Tarvittaessa voit muuttaa tämän lääkkeen viikoittaisen injektioipäivän, kunhan se on vähintään 3 päivää edellisen injektion jälkeen. Uuden antopäivän valinnan jälkeen hoitoa tulee jatkaa kerran viikossa.

Oletko käyttänyt liikaa tätä lääkettä?

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi. Saatat saada haittavaikutuksia, kuten pahoinvointia, oksentelua tai ripulia, mikä voi johtaa nestehukkaan.

Oletko unohtanut käyttää tätä lääkettä?

Jos unohtat pistää annoksen ja:

jos Wegovy olisi pitänyt käyttää 5 päivän sisällä tai vähemmän, käytä se heti kun muistat. Seuraavaksi pistä seuraava annos tavalliseen tapaan suunniteltuna päivänäsi.

jos Wegovy olisi pitänyt käyttää yli 5 päivää sitten, jätä unohtunut annos väliin.

Seuraavaksi pistä seuraava annos tavalliseen tapaan suunniteltuna päivänäsi.

Älä käytä kaksinkertaista annosta unohtuneen annoksen korvaamiseksi.

Jos lopetat tämän lääkkeen käytön

Älä lopeta tämän lääkkeen käyttöä keskustelematta siitä lääkärisi kanssa.

Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä? Ota yhteyttä lääkäriisi, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.

#### 4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös tämä lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia, vaikka kaikki eivät niitä saakaan.

##### Vakavat haittavaikutukset

###### Yleiset (esiintyvät alle 1 käyttäjällä 10:stä)

Diabeteksen aiheuttamat silmäsairauden komplikaatiot (diabeettinen retinopatia). Jos sinulla on diabetes, kerro lääkärillesi, jos saat silmäoireita tämän lääkkeen käytön aikana, kuten näkökyvyn muutoksia.

###### Joskus (esiintyvät alle 1 käyttäjällä 100:sta)

Haimatulehdus (akuutti haimatulehdus). Haimatulehduksen oireita ovat muun muassa voimakas ja pitkäkestoinen vatsakipu, joka voi säteillä selkään. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos koet näitä oireita.

###### Harvoin (esiintyy alle 1 käyttäjällä 1 000:sta)

Vakavat allergiset reaktiot (anafylaktiset reaktiot, angioedeema). Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon ja kerro lääkärillesi mahdollisimman pian, jos saat oireita kuten hengitysvaikeuksia, turvotusta, huimausta, nopeaa sydämen sykettä, hikoilua ja tajunnan menetystä tai nopeaa turvotusta ihon alla paikoissa kuten kasvot, kurkku, käsivarret ja jalat, mikä voi olla hengenvaarallista, jos kurkun turpoaminen tukkii hengitystiet.

###### Hyvin harvoin (esiintyy alle 1 käyttäjällä 10 000:sta)

silmän sairaus nimeltä ei-arteriittinen anteriorinen iskeeminen optikusneuropatia (NAION), joka voi aiheuttaa kivutonta näön heikkenemistä tai näön menettämistä toisessa silmässä. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos huomaat, että näkösi heikkenee äkillisesti tai hitaasti (katso kohta 2: 'Äkilliset muutokset näössäsi').

###### Tuntematon (ei voida määrittää saatavilla olevien tietojen perusteella)

Suolen tukkeuma. Vakava ummetuksen muoto, johon liittyy oireita kuten vatsakipu, turvotus, oksentelu jne.

##### Muut haittavaikutukset

###### Hyvin yleinen (esiintyy yli 1 käyttäjällä 10:stä)

päänsärky  
pahoinvointi  
oksentelu  
ripuli  
ummetus  
vatsakipu  
heikkouden tai väsymyksen tunne

- näitä esiintyy erityisesti annoksen nostamisen aikana ja ne häviävät yleensä ajan myötä.

###### Yleinen (esiintyy alle 1 käyttäjällä 10:stä)

huimaus  
mahaongelmat tai ruoansulatusvaikeudet

röyhtäily  
ilmavaivat (flatulenssi tai piereskely)  
turvonnut tunne mahassa  
mahatulehdus (gastriitti) - oireita ovat mm. mahakipu, pahoinvointi tai oksentelu  
refluksi tai närästys - myös gastroesofageaalinen refluksitauti  
sappikivet  
hiustenlähtö  
reaktiot injektiokohdassa  
ruoka ja juoma maistuvat erilaisilta kuin normaalisti  
enemmän tai vähemmän tuntoa iholla  
matala verensokeri (hypoglykemia) tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla.

Matala verensokeri voi ilmaantua äkillisesti. Oireita voivat olla: kylmä hiki, viileä kalpea iho, päänsärky, nopea syke, pahoinvointi tai voimakas nälkä, näkömuutokset, uneliaisuus tai heikkous, hermostuneisuus, ahdistuneisuus tai sekavuus, keskittymisvaikeudet tai vapina. Lääkärisi kertoo sinulle, miten matalaa verensokeria hoidetaan ja mitä tehdä, jos saat näitä varoituseireita.

Matala verensokeri on todennäköisempää, jos käytät myös sulfonyyliureajohdannaisia tai insuliinia. Lääkärisi saattaa pienentää näiden lääkkeiden annosta ennen tämän lääkkeen käytön aloittamista.

Joskus (esiintyy alle 1 käyttäjällä 100:sta)

matala verenpaine  
huimaus tai kevyt olo pään noustessa tai istuessa johtuen verenpaineen laskusta  
nopea syke  
haiman entsyymien (kuten lipaasi ja amylaasi) nousu verikokeissa  
ruoka pysyy mahassa pidempään kuin normaalisti (hidastunut mahan tyhjeneminen).

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos koet haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi, apteekkiin tai sairaanhoitajaan. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta, kuten liitteessä V on mainittu. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa meitä saamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

## 5. Miten säilytät tätä lääkettä?

Pidä poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Se löytyy kynän etiketistä ja pahvilaatikosta EXP:n jälkeen. Siinä on kuukausi ja vuosi. Kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivämäärä.

Säilytä jääkaapissa (2°C – 8°C). Älä säilytä pakastimessa. Pidä poissa kylmäelementistä. Säilytä kynä aina alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna. Wegovy voidaan säilyttää huoneenlämmössä enintään 28 päivää alle 30°C lämpötilassa.

Hävitä kynä, jos se on altistunut valolle tai yli 30°C lämpötiloille, ollut jääkaapin ulkopuolella yli 28 päivää tai ollut jäätyneenä.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että liuos ei ole kirkas ja väritön.

Käytön jälkeen: kynä on kertakäyttöinen ja sisältää vain yhden annoksen. Hävitä kynä käytön jälkeen.

Älä huuhtelee lääkkeitä viemäriin tai WC:hen äläkä heitä niitä roskakoriin. Kysy apteekista, mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Kun hävität lääkkeitä oikein, ne tuhotaan vastuullisesti eivätkä päädy ympäristöön.

## 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä aineita tämä lääke sisältää?

- Tämän lääkkeen vaikuttava aine on semaglutidi.

Wegovy 0,25 mg injektioneste, liuos

Jokainen esitäytetty kynä sisältää 0,25 mg semaglutidia 0,5 ml:ssa (0,5 mg/ml).

Wegovy 0,5 mg injektioneste, liuos

Jokainen esitäytetty kynä sisältää 0,5 mg semaglutidia 0,5 ml:ssa (1 mg/ml).

Wegovy 1 mg injektioneste, liuos

Jokainen esitäytetty kynä sisältää 1,0 mg semaglutidia 0,5 ml:ssa (2 mg/ml).

Wegovy 1,7 mg injektioneste, liuos

Jokainen esitäytetty kynä sisältää 1,7 mg semaglutidia 0,75 ml:ssa (2,27 mg/ml).

Wegovy 2,4 mg injektioneste, liuos

Jokainen esitäytetty kynä sisältää 2,4 mg semaglutidia 0,75 ml:ssa (3,2 mg/ml).

- Tämän valmisteen muut aineet ovat dinatriumfosfaattidihydraatti, natriumkloridi, suolahappo/natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen), injektionesteisiin käytettävä vesi. Katso myös kohta 2 'Wegovy sisältää natriumia' saadaksesi tietoa natriumista.

Miltä Wegovy näyttää ja mitä pakkaus sisältää?

Wegovy on kirkas ja väritön injektioneste, liuos, esitäytetyssä kertakäyttöisessä kynässä.

Jokainen kynä sisältää vain yhden annoksen.

Pakkauskoko: 4 esitäytettyä kynää.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja markkinoille saattaminen ja valmistaja

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Tanska

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty

Muut tietolähteet

Lisätietoja tästä lääkkeestä on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla: <http://www.ema.europa.eu>

Pakkausseloste: tietoa potilaalle

Wegovy

0,25 mg      0,5 mg                      1 mg                      1,7 mg                      2,4 mg

Wegovy 0,25 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä Wegovy 0,5 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä

Wegovy 1 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä

Wegovy 1,7 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä

Wegovy 1,7 mg liuos injektiota varten injektio esitäytetyssä kynässä

Wegovy 2,4 mg liuos injektio esitäytetyssä kynässä

Semaglutidi

Käytä Wegovy kerran viikossa

Ohjeet Wegovyn käyttöön

Tärkeää tietoa ennen aloittamista

Pakkaus sisältää yhden pakkausselosteen ja neljä Wegovy-esitäytettyä kynää.

Tämä osa pakkausselosteesta käsittelee kynän käyttöä. Lisätietoja lääkkeestäsi löydät tämän pakkausselosteen toiselta puolelta.

Jokainen kynä on tarkoitettu vain kertakäyttöön.

Se toimitetaan seuraavilla:

- yksi ennalta asetettu annos;
- neulasuoja, joka peittää sisäänrakennetun neulan ennen, aikana ja jälkeen käytön;
- automaattinen annostelumekanismi, joka käynnistyy, kun neulasuoja painetaan ihoa vasten, kuten lääkärisi tai sairaanhoitajasi on selittänyt.

Annosta injektoitaessa kynän ikkunassa näkyy keltainen palkki. Älä poista kynää iholtasi ennen kuin keltainen palkki on pysähtynyt. Jos teet niin, automaattinen annostelu jatkuu, mutta et ehkä saa koko annostasi.

Neulasuoja lukittuu, kun kynä poistetaan iholtasi. Et voi keskeyttää injektiota ja jatkaa sitä myöhemmin.

Sokeat tai heikkonäköiset henkilöt eivät saa käyttää Wegovy-kynää ilman Wegovyn käyttöön perehtyneen henkilön apua.

Noudata aina näitä käyttöohjeita ja lääkärisi tai sairaanhoitajasi antamia ohjeita.

Kuinka käyttää Wegovyasi

1. Valmistele injektiosi.

Tarkista Wegovy-kynäsi ja varmista, että kynäsi käytetään kun:

1. viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut
2. näyttää siltä, että kynää on käytetty tai se on vahingoittunut, esimerkiksi jos se on pudonnut tai ei on säilytetty oikein
3. lääke näyttää samealta.

Valitse pistoskohta Valitse pistoskohta kehon osasta, kuten alla on esitetty. Voit valita olkavartesi, reitesisi tai vatsasi (p

idä 5 cm etäisyys navastasi). Voit pistää joka viikko samaan kehon osaan, mutta varmista, ettet käytä samaa kohtaa kuin edellisellä kerralla

2. Poista kynän korkki. Vedä kynän korkki suoraan pois kynästäsi.

3. Pistä Wegovy.

Paina kynä tiukasti ihoa vasten, kunnes keltainen palkki pysähtyy.

Jos keltainen palkki ei ala liikkua, paina kynää hieman tiukemmin ihoa vasten.

Miten käsittelen kynääni turvallisesti?

Lisätietoja lääkkeestäsi saat tämän pakkausselosteen toiselta puolelta.

Kynä on tarkoitettu yhteen ihonalaiseen Wegovy-injektioon kerran viikossa ja on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön.

Tarkista aina ohjeet tämän pakkausselosteen toiselta puolelta ja varmista, että lääkärisi tai sairaanhoitajasi on näyttänyt sinulle, miten näitä kyniä käytetään.

Kysy aina ohjeet tämän pakkausselosteen toiselta puolelta ja varmista, että lääkärisi tai sairaanhoitajasi on näyttänyt sinulle, miten näitä kyniä käytetään.

Pidä Wegovy aina lasten ulottumattomissa ja näkyvistä. Pidä myös kynän korkki poissa lasten ulottuvilta, jotta he eivät niele sitä.

Käsittele kynääsi huolellisesti äläkä altista sitä kosteudelle. Karkea käsittely tai väärä käyttö voi johtaa siihen, että kynäsi antaa vähemmän kuin täyden annoksen tai ei annosta lainkaan.

Pidä korkki kynässä, kunnes olet valmis injektoimaan. Kynäsi ei ole enää steriili, jos säilytät käyttämättömä kynää ilman korkkia, jos otat korkin pois ja laitat sen takaisin tai jos korkki puuttuu. Tämä voi johtaa infekioon.

Ole varovainen käsitellessäsi kynäsi ennen käyttöä äläkä koske neulaan tai neulansuojukseen. Piilotettu neula voi johtaa vahingossa tapahtuvaan neulanpistoon.

Jokainen kynä sisältää yhden viikoittaisen annoksen eikä sitä voi käyttää uudelleen. Hävitä se käytön jälkeen.

Miten säilytän käyttämättömät kynäni?

Katso tietoa kynien säilyttämisestä tämän pakkausselosteen toisella puolella olevasta kohdasta 5.

Miten voin hävittää kynäni?

Älä huuhtelee lääkkeitä viemäriin tai WC:hen äläkä heitä niitä roskakoriin. Kysy apteekista, mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Ne hävitetään vastuullisesti, jotta ne eivät päädy ympäristöön.