

Notice : information pour le patient

Wegovy 0,25 mg solution injectable en stylo prérempli  
Wegovy 0,5 mg solution injectable en stylo prérempli  
Wegovy 1 mg solution injectable en stylo prérempli  
Wegovy 1,7 mg solution injectable en stylo prérempli  
Wegovy 2,4 mg solution pour injection en stylo prérempli  
sémaglutide

Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire. Cela permet d'identifier rapidement de nouvelles informations de sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous pourriez ressentir. À la fin de la rubrique 4, vous trouverez comment faire cela.

Lisez attentivement toute la notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Conservez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Avez-vous des questions ? Contactez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.
- Ne donnez pas ce médicament à d'autres personnes, car il vous a été prescrit uniquement. Cela pourrait être dangereux pour d'autres personnes, même si elles présentent les mêmes symptômes que vous.
- Ressentez-vous un des effets indésirables mentionnés dans la rubrique 4 ? Ou ressentez-vous un effet indésirable non mentionné dans cette notice ? Contactez alors votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Wegovy et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament ou devez-vous faire particulièrement attention ?
3. Comment utiliser ce médicament ?
4. Effets indésirables possibles
5. Comment conserver ce médicament ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Wegovy et dans quel cas est-il utilisé?

Qu'est-ce que Wegovy?

Wegovy est un médicament pour la perte de poids et le contrôle du poids qui contient la substance active sémaglutide. Il est similaire à une hormone naturelle appelée « peptide-1 de type glucagon » (GLP-1) qui est libérée par les intestins après un repas. Il agit en se fixant sur des sites (récepteurs) dans le cerveau qui régulent votre appétit, vous faisant sentir rassasié et moins affamé, et réduisant votre envie de manger. Cela vous aidera à manger moins et à perdre du poids. Wegovy peut également aider à prévenir une maladie cardiaque.

Dans quel cas est-il utilisé?

Wegovy est utilisé en combinaison avec un régime alimentaire et de l'exercice physique pour perdre du poids et maintenir le poids. Il est utilisé chez les adultes avec un IMC de 30 kg/m<sup>2</sup> ou plus (obésité) ou

un IMC d'au moins 27 kg/m<sup>2</sup>, mais moins de 30 kg/m<sup>2</sup> (surpoids) qui ont des problèmes de santé liés au poids (comme le diabète, l'hypertension artérielle, des taux de lipides anormaux dans le sang, des difficultés respiratoires pendant le sommeil appelées « apnée obstructive du sommeil », ou des antécédents de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de problèmes vasculaires).

L'IMC (Indice de Masse Corporelle) est une mesure du poids par rapport à la taille.

Wegovy est utilisé en combinaison avec un régime alimentaire et de l'exercice physique pour le contrôle du poids chez les jeunes de 12 ans et plus avec obésité et un poids corporel > 60 kg.

En tant que jeune patient âgé de 12 à 18 ans, vous devez continuer à utiliser Wegovy uniquement si après 12 semaines avec la dose de 2,4 mg ou la dose maximale tolérée (voir rubrique 3) votre IMC a diminué d'au moins 5%. Contactez votre médecin avant de continuer.

2. Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament ou devez-vous être particulièrement prudent?

Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament?

Vous êtes allergique à l'une des substances contenues dans ce médicament. Vous pouvez trouver ces substances à la rubrique 6.

Quand devez-vous faire preuve de prudence avec ce médicament ?

Contactez votre médecin, pharmacien ou infirmier avant d'utiliser ce médicament.

L'utilisation de Wegovy n'est pas recommandée si vous :

- utilisez d'autres produits pour la perte de poids ;
- avez un diabète de type 1 ;
- avez une insuffisance rénale sévère ;
- avez une insuffisance hépatique sévère ;
- avez une insuffisance cardiaque sévère ;
- avez une affection oculaire diabétique (rétinopathie).

Il y a peu d'expérience avec Wegovy chez les patients :

- de 85 ans et plus ;
- ayant des problèmes hépatiques ;
- ayant des problèmes gastriques ou intestinaux sévères entraînant un retard de vidange de l'estomac (appelé gastroparésie), ou une maladie inflammatoire de l'intestin.

Consultez votre médecin si l'une des situations ci-dessus s'applique à vous.

Si vous savez que vous devez subir une opération sous anesthésie générale (sommeil), informez votre médecin que vous utilisez Wegovy.

Déshydratation

Pendant le traitement avec Wegovy, vous pouvez ressentir des nausées, des vomissements ou de la diarrhée. Ces effets secondaires peuvent provoquer une déshydratation (perte de liquide). Il est important de boire beaucoup pour éviter la

déshydratation. Cela est particulièrement important si vous avez des problèmes rénaux. Contactez votre médecin si vous avez des questions ou des préoccupations.

#### Inflammation du pancréas

Contactez immédiatement un médecin si vous ressentez une douleur intense et persistante dans la région de l'estomac (voir rubrique 4). Cela peut indiquer une pancréatite aiguë (inflammation du pancréas).

#### Personnes atteintes de diabète de type 2

Wegovy ne peut pas être utilisé comme substitut de l'insuline. N'utilisez pas Wegovy en combinaison avec d'autres médicaments contenant des agonistes des récepteurs GLP-1 (comme le liraglutide, le dulaglutide, l'exénatide ou le lixisénatide).

#### Hypoglycémie

Si vous utilisez Wegovy avec un dérivé de sulfonylurée ou de l'insuline, cela peut augmenter le risque d'hypoglycémie. Voir la rubrique 4 pour les signes d'alerte d'une hypoglycémie. Votre médecin peut vous demander de contrôler votre glycémie. Cela aidera votre médecin à décider si la dose du dérivé de sulfonylurée ou de l'insuline doit être ajustée pour réduire le risque d'hypoglycémie.

#### Rétinopathie diabétique

Si vous avez une affection oculaire due au diabète et que vous utilisez de l'insuline, ce médicament peut entraîner une détérioration de votre vision et un traitement peut être nécessaire. Des améliorations rapides de la régulation de la glycémie peuvent entraîner une aggravation temporaire d'une affection oculaire due au diabète. Contactez votre médecin si vous avez une rétinopathie diabétique et que vous ressentez des problèmes oculaires en utilisant ce médicament.

#### Changements soudains de votre vision

Si vous ne voyez soudainement plus rien ou que votre vision diminue rapidement pendant le traitement avec ce médicament, contactez immédiatement votre médecin pour obtenir des conseils. Cela peut être causé par un effet secondaire très rare appelé neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NAION) (voir rubrique 4 : Effets indésirables graves). Votre médecin peut vous orienter vers un examen ophtalmologique et il se peut que vous deviez arrêter le traitement avec ce médicament.

#### Enfants et adolescents jusqu'à 18 ans

La sécurité et l'efficacité de Wegovy chez les enfants de moins de 12 ans n'ont pas été étudiées, il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament dans ce groupe d'âge.

#### Prenez-vous d'autres médicaments ?

Prenez-vous d'autres médicaments en plus de Wegovy, l'avez-vous fait récemment ou envisagez-vous de prendre d'autres médicaments prochainement ? Informez-en votre médecin, pharmacien ou infirmier.

Contactez en particulier votre médecin, pharmacien ou infirmier si vous prenez des médicaments contenant :

warfarine ou d'autres médicaments oraux qui réduisent la coagulation de votre sang (anticoagulants oraux). Lorsque vous commencez un traitement avec, par exemple, la

warfarine ou des médicaments similaires, des tests sanguins pour tester la capacité de coagulation de votre sang peuvent être nécessaires plus fréquemment.

#### Grossesse et allaitement

Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse car on ne sait pas s'il est nocif pour votre enfant à naître. Il est donc recommandé d'utiliser une contraception (moyens de contraception) pendant l'utilisation de ce médicament. Si vous souhaitez devenir enceinte, vous devez arrêter l'utilisation de ce médicament au moins deux mois à l'avance. Êtes-vous enceinte, pensez-vous être enceinte ou souhaitez-vous devenir enceinte pendant que vous utilisez ce médicament ? Contactez immédiatement votre médecin car votre traitement doit alors être arrêté.

N'utilisez pas ce médicament si vous allaitez car on ne sait pas s'il passe dans le lait maternel.

#### Aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Wegovy n'a probablement pas d'effet sur votre aptitude à conduire et à utiliser des machines. Certains patients peuvent se sentir étourdis en utilisant Wegovy, surtout pendant les 4 premiers mois de traitement (voir rubrique 4). Si vous vous sentez étourdi, soyez particulièrement prudent lors de la conduite et de l'utilisation de machines. Pour plus d'informations, contactez votre médecin, pharmacien ou infirmier.

#### Personnes atteintes de diabète de type 2

Si vous utilisez ce médicament en combinaison avec un dérivé de sulfonylurée ou de l'insuline, vous pouvez avoir une hypoglycémie (baisse de sucre dans le sang) qui peut réduire votre capacité de concentration. Évitez de conduire ou d'utiliser des machines lorsque vous présentez des symptômes d'hypoglycémie. Voir la rubrique 2 'Quand devez-vous faire particulièrement attention avec ce médicament ?' pour des informations sur un risque accru d'hypoglycémie et la rubrique 4 pour les signes d'alerte d'une hypoglycémie. Contactez votre médecin pour plus d'informations.

#### Wegovy contient du sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par dose, c'est-à-dire qu'il est essentiellement 'sans sodium'.

### 3. Comment utiliser ce médicament ?

Utilisez toujours ce médicament exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Vous avez des doutes sur la bonne utilisation ? Contactez alors votre médecin, pharmacien ou infirmier/infirmière.

#### Quelle quantité de ce médicament devez-vous utiliser ?

##### Adultes

La dose recommandée est de 2,4 mg une fois par semaine.

Votre traitement commence par une faible dose qui est progressivement augmentée sur une période de 16 semaines.

Lorsque vous commencez à utiliser Wegovy, la dose initiale est de 0,25 mg une fois par semaine.

Votre médecin vous donnera des instructions pour augmenter progressivement votre dose toutes les 4 semaines jusqu'à atteindre la dose recommandée de 2,4 mg une fois par semaine.

Lorsque vous avez atteint la dose recommandée de 2,4 mg, vous ne devez pas augmenter davantage cette dose.

Si vous ressentez beaucoup de nausées ou de vomissements, consultez votre médecin pour reporter l'augmentation de la dose ou pour réduire à la dose précédente, jusqu'à ce que les symptômes diminuent.

Vous devrez généralement suivre le tableau suivant.

Augmentation de la dose	Dose hebdomadaire
Semaine 1–4	0,25 mg
Semaine 5–8	0,5 mg
Semaine 9–12	1 mg
Semaine 13–16	1,7 mg
À partir de la semaine 17	2,4 mg

Votre médecin contrôlera régulièrement votre traitement.

Adolescents (plus de 12 ans)

Pour les adolescents, le même schéma d'augmentation de la dose doit être appliqué que pour les adultes (voir ci-dessus). La dose doit être augmentée jusqu'à 2,4 mg (dose d'entretien) ou jusqu'à ce que la dose maximale tolérée soit atteinte. Des doses supérieures à 2,4 mg par semaine ne sont pas recommandées.

Comment ce médicament est-il administré ?

Wegovy est administré par injection sous-cutanée. Ne l'injectez pas dans une veine ou un muscle.

Les meilleurs endroits pour faire l'injection sont l'avant de votre bras, vos cuisses ou votre abdomen.

Avant d'utiliser le stylo pour la première fois, demandez à votre médecin, pharmacien ou infirmier de vous montrer comment utiliser le stylo.

Des instructions détaillées sur l'utilisation du stylo se trouvent de l'autre côté de cette notice.

Personnes atteintes de diabète de type 2

Informez votre médecin si vous avez un diabète de type 2. Votre médecin peut ajuster la dose de vos médicaments pour le diabète afin d'éviter une hypoglycémie.

Quand utilisez-vous ce médicament ?

Utilisez ce médicament une fois par semaine, si possible, chaque semaine le même jour. Vous pouvez vous injecter à tout moment de la journée - indépendamment des repas.

Si nécessaire, vous pouvez changer le jour de votre injection hebdomadaire de ce médicament, tant qu'il s'est écoulé au moins 3 jours depuis votre dernière injection de ce médicament. Après avoir choisi un nouveau jour d'administration, l'administration doit être poursuivie une fois par semaine.

Avez-vous utilisé trop de ce médicament ?

Contactez immédiatement votre médecin. Vous pouvez ressentir des effets secondaires, tels que des nausées, des vomissements ou de la diarrhée, ce qui peut entraîner une déshydratation (perte de liquide).

Avez-vous oublié d'utiliser ce médicament ?

Si vous oubliez d'injecter une dose et :

il y a 5 jours ou moins que vous auriez dû utiliser Wegovy, utilisez-le dès que vous vous en souvenez. Ensuite, injectez votre prochaine dose comme d'habitude le jour prévu.

il y a plus de 5 jours que vous auriez dû utiliser Wegovy, sautez la dose oubliée. Ensuite, injectez votre prochaine dose comme d'habitude le jour prévu.

N'utilisez pas de dose double pour compenser une dose oubliée.

Si vous arrêtez d'utiliser ce médicament

N'arrêtez pas d'utiliser ce médicament sans en discuter avec votre médecin.

Avez-vous d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament ? Contactez alors votre médecin, pharmacien ou infirmier.

#### 4. Effets secondaires possibles

Comme tout médicament, ce médicament peut avoir des effets secondaires, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Effets secondaires graves

Fréquent (surviennent chez moins de 1 utilisateur sur 10)

Complications d'une affection oculaire due au diabète (rétinopathie diabétique). Si vous êtes diabétique, informez votre médecin si vous ressentez des problèmes oculaires pendant le traitement avec ce médicament, tels que des changements de vision.

Parfois (surviennent chez moins de 1 utilisateur sur 100)

Inflammation du pancréas (pancréatite aiguë). Les symptômes d'un pancréas enflammé incluent notamment une douleur sévère et prolongée dans votre estomac, qui peut irradier vers votre dos. Vous devez contacter immédiatement votre médecin si vous ressentez ces symptômes.

Rare (surviennent chez moins de 1 utilisateur sur 1 000)

Réactions allergiques graves (réactions anaphylactiques, angio-œdème). Obtenez immédiatement une aide médicale et informez votre médecin dès que possible si vous présentez des symptômes tels que des difficultés à respirer, un gonflement, une sensation de légèreté dans la tête, un rythme cardiaque rapide, des sueurs et une perte de conscience ou un gonflement rapide sous la peau à des endroits tels que le visage, la gorge, les bras et les jambes, ce qui peut être mortel si le gonflement de la gorge bloque les voies respiratoires.

Très rare (surviennent chez moins de 1 utilisateur sur 10 000)

une affection oculaire appelée neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NAION) qui peut entraîner une perte de vision, sans douleur, dans un de

vos yeux. Contactez immédiatement votre médecin si vous remarquez que vous ne voyez soudainement plus rien ou que votre vision diminue lentement (voir rubrique 2 : 'Changements soudains de votre vision').

Inconnu (ne peut être déterminé avec les données disponibles)

Occlusion intestinale. Une forme sévère d'occlusion avec des symptômes tels que douleurs abdominales, ballonnements, vomissements, etc.

Autres effets secondaires

Très fréquent (surviennent chez plus de 1 utilisateur sur 10)

maux de tête

nausées

vomissements

diarrhée

constipation

douleurs abdominales

se sentir faible ou fatigué

- ceux-ci surviennent principalement lors de l'augmentation de la dose et disparaissent généralement après un certain temps.

Fréquent (surviennent chez moins de 1 utilisateur sur 10)

étourdissements

troubles gastriques ou difficultés digestives

éructations

formation de gaz (flatulence ou météorisme)

sensation de ballonnement dans l'estomac

estomac enflammé (gastrite) - les symptômes incluent entre autres douleurs à l'estomac, nausées ou vomissements

reflux ou brûlures d'estomac - également appelé maladie de reflux gastro-œsophagien

calculs biliaires

perte de cheveux

réactions au site d'injection

nourriture et boissons ont un goût différent de la normale

plus ou moins de sensation dans la peau

hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) chez les patients atteints de diabète de type 2.

Les signes d'alerte d'une hypoglycémie peuvent survenir soudainement. Ils peuvent inclure : sueurs froides, peau froide et pâle, maux de tête, rythme cardiaque rapide, nausées ou sensation de faim intense, changements de la vision, sensation de somnolence ou de faiblesse, sensation de nervosité, d'anxiété ou de confusion, difficulté à se concentrer ou tremblements.

Votre médecin vous indiquera comment traiter une hypoglycémie et quoi faire si vous ressentez ces signes d'alerte.

Une hypoglycémie est plus probable si vous utilisez également un dérivé de sulfonilurée ou de l'insuline. Votre médecin pourrait réduire la dose de ces médicaments avant de commencer ce traitement.

Parfois (surviennent chez moins de 1 utilisateur sur 100)

hypotension

étourdissements ou sensation de tête légère en se levant ou en s'asseyant en raison d'une baisse de la pression artérielle

rythme cardiaque rapide

augmentation des enzymes pancréatiques (comme la lipase et l'amylase) révélée par des analyses de sang

les aliments restent plus longtemps que d'habitude dans l'estomac (vidange gastrique retardée).

#### Déclaration des effets indésirables

Si vous ressentez des effets indésirables, contactez votre médecin, pharmacien ou infirmier. Cela s'applique également aux effets indésirables possibles qui ne sont pas mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets indésirables directement via le système national de déclaration mentionné à l'annexe V. En signalant les effets indésirables, vous pouvez nous aider à obtenir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

#### 5. Comment conserver ce médicament ?

Conserver hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette du stylo et sur la boîte en carton après EXP. Cette date se compose d'un mois et d'une année. Le dernier jour de ce mois est la date de péremption.

Conserver au réfrigérateur (2°C – 8°C). Ne pas congeler. Garder à l'écart de l'élément réfrigérant. Conserver toujours le stylo dans l'emballage d'origine pour le protéger de la lumière. Wegovy peut être conservé non réfrigéré pendant un maximum de 28 jours à une température inférieure à 30°C.

Jetez le stylo s'il a été exposé à la lumière ou à des températures supérieures à 30°C, s'il est resté hors du réfrigérateur plus de 28 jours ou s'il a été congelé.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez que la solution n'est pas limpide et incolore.

Après utilisation : le stylo est à usage unique et ne contient qu'une seule dose. Jetez le stylo après utilisation.

Ne jetez pas les médicaments dans l'évier ou les toilettes et ne les mettez pas à la poubelle. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments que vous n'utilisez plus. Si vous éliminez les médicaments correctement, ils seront détruits de manière responsable et ne pollueront pas l'environnement.

#### 6. Contenu de l'emballage et autres informations

Quelles sont les substances contenues dans ce médicament ?

- La substance active de ce médicament est le sémaglutide.

Wegovy 0,25 mg solution injectable

Chaque stylo prérempli contient 0,25 mg de sémaglutide dans 0,5 ml (0,5 mg/ml).

Wegovy 0,5 mg solution injectable

Chaque stylo prérempli contient 0,5 mg de sémaglutide dans 0,5 ml (1 mg/ml).

Wegovy 1 mg solution injectable

Chaque stylo prérempli contient 1,0 mg de sémaglutide dans 0,5 ml (2 mg/ml).

Wegovy 1,7 mg solution injectable

Chaque stylo prérempli contient 1,7 mg de sémaglutide dans 0,75 ml (2,27 mg/ml).

Wegovy 2,4 mg solution injectable

Chaque stylo prérempli contient 2,4 mg de sémaglutide dans 0,75 ml (3,2 mg/ml).

- Les autres composants de ce médicament sont le dihydrogénophosphate de disodium, le chlorure de sodium, l'acide chlorhydrique/hydroxyde de sodium (pour l'ajustement du pH), l'eau pour préparations injectables. Voir également la rubrique 2 « Wegovy contient du sodium » pour des informations sur le sodium.

À quoi ressemble Wegovy et combien y a-t-il dans un emballage ?

Wegovy est une solution injectable claire et incolore dans un stylo prérempli à usage unique.

Chaque stylo contient une seule dose.

Taille de l'emballage de 4 stylos préremplis.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danemark

Cette notice a été approuvée pour la dernière fois en

Ce dépliant a été approuvé pour la dernière fois en

Autres sources d'information

Plus d'informations sur ce médicament sont disponibles sur le site de l'Agence européenne des médicaments : <http://www.ema.europa.eu>

Notice : information pour le patient

Wegovy

0,25 mg

0,5 mg

1 mg

1,7 mg

2,4 mg

Wegovy 0,25 mg solution pour injection en stylo prérempli

Wegovy 0,5 mg solution pour injection en stylo prérempli

Wegovy 1 mg solution pour injection en stylo prérempli

Wegovy 1,7 mg solution pour injection en stylo prérempli

Wegovy 2,4 mg solution pour injection dans un stylo prérempli

Sémaglutide

Utilisez Wegovy une fois par semaine

Instructions pour l'utilisation de Wegovy

Informations importantes avant de commencer

L'emballage contient une notice et quatre stylos préremplis Wegovy.

Cette partie de la notice concerne l'utilisation du stylo. Consultez l'autre côté de cette notice pour plus d'informations sur votre médicament.

Chaque stylo est à usage unique uniquement.

Il est fourni avec :

- une dose prédéfinie ;
- un protège-aiguille qui cache l'aiguille intégrée avant, pendant et après l'utilisation ;
- un mécanisme de dosage automatique qui démarre lorsque le protège-aiguille est pressé contre votre peau, comme expliqué par votre médecin ou infirmier.

Pendant l'injection de la dose, une barre jaune sera visible dans la fenêtre du stylo. Ne retirez pas le stylo de votre peau tant que la barre jaune ne s'est pas arrêtée. Si vous le faites, l'administration automatique continue, mais vous pourriez ne pas recevoir votre dose complète.

Le protège-aiguille se verrouille lorsque le stylo est retiré de votre peau. Vous ne pouvez pas interrompre l'injection et la reprendre plus tard.

Les personnes aveugles ou malvoyantes ne doivent pas utiliser le stylo Wegovy sans l'aide d'une personne formée à l'utilisation de Wegovy.

Respectez toujours ces instructions d'utilisation et les indications de votre médecin ou infirmier.

Comment utiliser votre Wegovy

1. Préparer votre injection.

Vérifiez votre stylo Wegovy et assurez-vous que votre stylo n'utilisé comme :

1. la date de péremption est dépassée
2. s'il semble que le stylo a été utilisé ou est endommagé, par exemple s'il est tombé ou n'a pas été conservé correctement
3. le médicament semble trouble.

Choisissez votre site d'injection Choisissez un site d'injection sur l'une des parties du corps, comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez choisir vos bras, cuisses ou abdomen (g

ardez une distance de 5 cm de votre nombril). Vous pouvez injecter chaque semaine dans la même partie du corps, mais assurez-vous de ne pas utiliser le même endroit que la fois précédente

2. Retirez le capuchon du stylo. Tirez le capuchon droit de votre stylo.

3. Injectez Wegovy.

Appuyez fermement le stylo contre votre peau jusqu'à ce que la barre jaune s'arrête.

Si la barre jaune ne commence pas à bouger, appuyez le stylo un peu plus fermement contre votre peau.

Comment manipuler mon stylo en toute sécurité ?

Pour des informations sur votre médicament, vous pouvez consulter l'autre côté de cette notice.

Le stylo est destiné à une injection sous-cutanée de Wegovy une fois par semaine et est uniquement à usage d'une seule personne.

Consultez toujours les instructions de l'autre côté de cette notice et assurez-vous que votre médecin ou infirmier vous a montré comment utiliser ces stylos.

Consultez toujours les instructions au verso de cette notice et assurez-vous que votre médecin ou infirmier vous a montré comment utiliser ces stylos.

Gardez Wegovy toujours hors de la vue et de la portée des enfants. De plus, gardez le capuchon de la seringue hors de portée des enfants pour éviter qu'ils ne l'avalent.

Manipulez votre stylo avec soin et ne l'exposez pas à l'humidité. Une manipulation brutale ou une utilisation incorrecte peut entraîner une administration de moins que la dose complète ou aucune dose du tout.

Gardez le capuchon sur le stylo jusqu'à ce que vous soyez prêt à injecter. Votre stylo n'est plus stérile si vous conservez un stylo inutilisé sans capuchon, si vous retirez le capuchon et le remettez ou si le capuchon est manquant. Cela peut entraîner une infection.

Soyez prudent lors de la manipulation de votre stylo avant utilisation et ne touchez pas l'aiguille ou le protecteur d'aiguille. L'aiguille cachée peut entraîner des piqûres accidentelles.

Chaque stylo contient une dose hebdomadaire et ne peut pas être réutilisé. Jetez-le après utilisation.

Comment conserver mes stylos inutilisés ?

Pour des informations sur la conservation des stylos, voir la rubrique 5 de l'autre côté de cette notice.

Comment puis-je jeter mes stylos ?

Ne jetez pas les médicaments dans l'évier ou les toilettes et ne les mettez pas à la poubelle. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments que vous n'utilisez plus. Ils seront alors détruits de manière responsable et ne finiront pas dans l'environnement.

Transtoyou