

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Wegovy 0,25 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte
Wegovy 0,5 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte
Wegovy 1 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte
Wegovy 1,7 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte
Wegovy 2,4 mg injekcinis tirpalas švirkšte
semaglutidas

Šis vaistas yra papildomai stebimas. Tai leidžia greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Jūs galite prisidėti pranešdami apie bet kokį šalutinį poveikį, kurį galite patirti. Kaip tai padaryti, skaitykite 4 skyriaus pabaigoje.

Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą pakuotės lapelį, nes jame pateikiama svarbi informacija.

- Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Gali prireikti jį perskaityti dar kartą.
- Turite klausimų? Kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.
- Neduokite šio vaisto kitiems, nes jis skirtas tik jums. Tai gali būti kenksminga kitiems, net jei jų simptomai yra tokie patys kaip jūsų.
- Ar patyrėte vieną iš šalutinių poveikių, nurodytų 4 skyriuje? Arba patyrėte šalutinį poveikį, kuris nėra nurodytas šiame pakuotės lapelyje? Kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Šio pakuotės lapelio turinys

1. Kas yra Wegovy ir kam jis vartojamas?
2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti ypač atsargiems?
3. Kaip vartoti šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti šį vaistą?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Wegovy ir kam šis vaistas vartojamas?

Kas yra Wegovy?

Wegovy yra vaistas svorio mažinimui ir svorio kontrolei, kurio veiklioji medžiaga yra semaglutidas. Jis panašus į natūralų hormoną, vadinamą „gliukagonui panašus peptidas-1“ (GLP-1), kuris išsiskiria iš žarnyno po valgio. Jis veikia prisijungdamas prie vietų (receptorių) smegenyse, kurios reguliuoja jūsų apetitą, todėl jaučiatės sotūs ir mažiau alkani, ir turite mažiau noro valgyti. Tai padės jums mažiau valgyti ir numesti svorio. Wegovy taip pat gali padėti išvengti širdies ligų.

Kam šis vaistas vartojamas?

Wegovy vartojamas kartu su dieta ir fiziniu aktyvumu svoriui mažinti ir išlaikyti. Jis vartojamas suaugusiems, kurių

KMI yra 30 kg/m² ar didesnis (nutukimas) arba

KMI yra bent 27 kg/m², bet mažiau nei 30 kg/m² (antsvoris), kurie turi su svoriu susijusių sveikatos problemų (pvz., diabetas, aukštas kraujospūdis, nenormalūs riebalų kiekiai

kraujyje, kvėpavimo sunkumai miego metu, vadinami „obstrukcine miego apnėja“, arba širdies priepuolio, insulto ar kraujagyslių problemų istorija).

KMI (kūno masės indeksas) yra svorio santykis su kūno ūgiu.

Wegovy vartojamas kartu su dieta ir fiziniu aktyvumu svorio kontrolei paaugliams nuo 12 metų ir vyresniems, kurių

nutukimas ir

kūno svoris > 60 kg.

Jei esate jaunas pacientas nuo 12 iki 18 metų, turėtumėte tęsti Wegovy vartojimą tik tuo atveju, jei po 12 savaičių vartojant 2,4 mg dozę arba maksimalią toleruojamą dozę (žr. 3 skyrių) jūsų KMI sumažėjo bent 5%. Prieš tęsdami, pasitarkite su savo gydytoju.

2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti ypač atsargiems?

Kada negalima vartoti šio vaisto?

Esate alergiškas bet kuriai šio vaisto medžiagai. Šias medžiagas galite rasti 6 skyriuje.

Kada turėtumėte būti ypač atsargūs vartodami šį vaistą?

Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju, vaistininku ar slaugytoju.

Wegovy vartojimas nerekomenduojamas, jei:

vartojate kitus svorio mažinimo produktus;

sergate 1 tipo cukriniu diabetu;

turite stipriai sutrikusią inkstų funkciją;

turite stipriai sutrikusią kepenų funkciją;

sergate sunkiu širdies nepakankamumu;

turite diabetinę akių ligą (retinopatiją).

Yra mažai patirties su Wegovy pacientams:

85 metų ir vyresniems;

turintiems kepenų problemų;

turintiems sunkių skrandžio ar žarnyno problemų, kurios sukelia lėtą skrandžio

ištuštinimą (tai vadinama gastropareze), arba turintiems žarnyno uždegiminę ligą.

Pasitarkite su savo gydytoju, jei kuris nors iš aukščiau paminėtų dalykų jums tinka.

Jei žinote, kad jums reikės atlikti operaciją, kurios metu būsite laikomi narkozėje (miegosite), pasakykite savo gydytojui, kad vartojate Wegovy.

Dehidratacija

Gydantis Wegovy galite jausti pykinimą, vėmimą ar viduriavimą. Šalutinis poveikis gali sukelti dehidrataciją (skysčių netekimą). Svarbu gerti daug skysčių, kad išvengtumėte dehidratacijos. Tai ypač svarbu, jei turite inkstų problemų. Jei turite klausimų ar nerimaujate, kreipkitės į savo gydytoją.

Kasos uždegimas

Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei jaučiate stiprų ir nuolatinį skausmą pilvo srityje (žr. 4 skyrių). Tai gali rodyti uždegusią kasą (ūminį pankreatitą).

Žmonės, sergantys 2 tipo cukriniu diabetu

Wegovy negali būti naudojamas kaip insulino pakaitalas. Nenaudokite Wegovy kartu su kitais vaistais, kuriuose yra GLP-1 receptorių agonistų (pvz., liraglutidas, dulaglutidas, eksenatidas ar liksisenatidas).

Mažas cukraus kiekis kraujyje (hipoglikemija)

Jei vartojate Wegovy kartu su sulfonilkarbamido dariniu ar insulinu, tai gali padidinti mažo cukraus kiekio kraujyje (hipoglikemijos) riziką. Žr. 4 skyrių dėl mažo cukraus kiekio kraujyje įspėjamųjų požymių. Jūsų gydytojas gali paprašyti stebėti cukraus kiekį kraujyje. Tai padės gydytojui nuspręsti, ar reikia koreguoti sulfonilkarbamido darinio ar insulino dozę, siekiant sumažinti mažo cukraus kiekio kraujyje riziką.

Diabetinė akių liga (retinopatija)

Jei sergate diabetine akių liga ir vartojate insuliną, šis vaistas gali pabloginti jūsų regėjimą ir gali prireikti gydymo. Greiti cukraus kiekio kraujyje reguliavimo pagerėjimai gali laikinai pabloginti diabetinę akių ligą. Kreipkitės į gydytoją, jei sergate diabetine akių liga ir vartojant šį vaistą patiriate akių problemų.

Staigūs regėjimo pokyčiai

Jei staiga nieko nematote arba greitai prastėja regėjimas gydymo šiuo vaistu metu, nedelsdami kreipkitės į gydytoją patarimo. Tai gali būti labai reta šalutinė reakcija, vadinama neareritine priekinės išeminės optinės neuropatijos (NAION) (žr. 4 skyrių: Sunkios šalutinės reakcijos). Jūsų gydytojas gali nukreipti jus akių tyrimui ir gali tekti nutraukti gydymą šiuo vaistu.

Vaikai ir paaugliai iki 18 metų

Wegovy saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 12 metų nėra ištirtas, todėl nerekomenduojama šio vaisto vartoti šioje amžiaus grupėje.

Ar vartojate kitus vaistus?

Ar vartojate kitus vaistus be Wegovy, ar neseniai vartojote, ar yra galimybė, kad netrukus vartosite kitus vaistus? Praneškite apie tai savo gydytojui, vaistininkui ar slaugytojui.

Ypač susisiekite su savo gydytoju, vaistininku ar slaugytoju, jei vartojate vaistus, kuriuose yra:

varfarinas ar kiti per burną vartojami vaistai, mažinantys kraujo krešėjimą (geriamieji antikoagulantai). Pradėjus gydymą, pavyzdžiui, varfarinu ar panašiais vaistais, gali prireikti dažniau atlikti kraujo tyrimus, kad būtų patikrintas kraujo krešėjimo gebėjimas.

Nėštumas ir žindymas

Šio vaisto negalima vartoti nėštumo metu, nes nežinoma, ar jis kenkia jūsų negimusiam vaikui.

Todėl rekomenduojama naudoti kontracepciją

(kontraceptines priemones) vartojant šį vaistą. Jei norite pastoti, turite nutraukti šio vaisto vartojimą bent du mėnesius iš anksto. Ar esate nėščia, manote, kad galite būti nėščia ar norite pastoti vartodama šį vaistą? Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, nes gydymą reikia nutraukti.

Nevartokite šio vaisto, jei maitinate krūtimi, nes nežinoma, ar jis patenka į motinos pieną.

Vairavimas ir mechanizmų naudojimas

Wegovy greičiausiai neturi įtakos jūsų gebėjimui vairuoti ir naudoti mechanizmus. Kai kurie pacientai gali jaustis apsvaigę vartodami Wegovy, ypač per pirmuosius 4 gydymo mėnesius (žr. 4 skyrių). Jei jaučiatės apsvaigę, būkite ypač atsargūs vairuodami ir naudodami mechanizmus. Dėl daugiau informacijos kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką ar slaugytoją.

Žmonės, sergantys 2 tipo cukriniu diabetu

Jei vartojate šį vaistą kartu su sulfonilkarbamido dariniu arba insulinu, galite patirti mažą cukraus kiekį kraujyje (hipoglikemiją), dėl kurios gali sumažėti jūsų koncentracija. Venkite vairuoti ar naudoti mechanizmus, kai jaučiate mažo cukraus kiekio kraujyje simptomus. Žr. 2 skyrių „Kada reikia būti ypač atsargiems vartojant šį vaistą?“ dėl padidėjusios mažo cukraus kiekio kraujyje rizikos ir 4 skyrių dėl mažo cukraus kiekio kraujyje įspėjamųjų požymių. Dėl daugiau informacijos kreipkitės į savo gydytoją.

Wegovy sudėtyje yra natrio

Šis vaistas turi mažiau nei 1 mmol natrio (23 mg) per dozę, tai reiškia, kad jis iš esmės yra „be natrio“.

3. Kaip vartoti šį vaistą?

Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė jūsų gydytojas. Jei abejojate dėl tinkamo vartojimo, kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką ar slaugytoją.

Kiek šio vaisto turėtumėte vartoti?

Suaugusieji

Rekomenduojama dozė yra 2,4 mg kartą per savaitę.

Jūsų gydymas pradamas nuo mažos dozės, kuri per 16 savaičių gydymo laikotarpį palaipsniui didinama.

Kai pradėsite vartoti Wegovy, pradinė dozė yra 0,25 mg kartą per savaitę.

Jūsų gydytojas duos jums nurodymus, kaip kas 4 savaites palaipsniui didinti dozę, kol pasieksite rekomenduojamą 2,4 mg dozę kartą per savaitę.

Kai pasieksite rekomenduojamą 2,4 mg dozę, šios dozės nebegalima didinti.

Jei jaučiate stiprų pykinimą ar vėmimą, pasitarkite su savo gydytoju dėl dozės didinimo atidėjimo arba sumažinimo iki ankstesnės dozės, kol simptomai sumažės.

Paprastai turėsite laikytis šios lentelės.

Dozės didinimas	Savaitinė dozė
1–4 savaitė	0,25 mg
5–8 savaitės	0,5 mg
9–12 savaitės	1 mg
13–16 savaitės	1,7 mg
Nuo 17 savaitės	2,4 mg

Jūsų gydytojas reguliariai stebės jūsų gydymą.

Paaugliai (vyresni nei 12 metų)

Paaugliams turi būti taikoma ta pati dozės didinimo schema kaip ir suaugusiesiems (žr. aukščiau). Dozė turi būti padidinta iki 2,4 mg (palaikomoji dozė) arba iki maksimalios toleruojamos dozės. Didesnės nei 2,4 mg per savaitę dozės nerekomenduojamos.

Kaip šis vaistas vartojamas?

Wegovy vartojamas kaip poodinė injekcija (subkutaniška injekcija). Nešvirškite į veną ar raumenį.

Geriausios vietos injekcijai yra jūsų viršutinės rankos, šlaunų ar pilvo priekinė dalis. Prieš naudodami švirškintklį pirmą kartą, leiskite gydytojui, vaistininkui ar slaugytojui parodyti, kaip jį naudoti.

Išsamias instrukcijas, kaip naudoti švirškintklį, rasite kitoje šio pakuotės lapelio pusėje.

Žmonės, sergantys 2 tipo diabetu

Pasakykite savo gydytojui, jei sergate 2 tipo diabetu. Jūsų gydytojas gali koreguoti jūsų vaistų nuo diabeto dozę, kad išvengtumėte mažo cukraus kiekio kraujyje.

Kada vartoti šį vaistą?

Vartokite šį vaistą kartą per savaitę, jei įmanoma, kiekvieną savaitę tą pačią dieną. Galite susišvirškinti bet kuriuo paros metu - nepriklausomai nuo valgymo.

Jei reikia, galite pakeisti savaitinės šio vaisto injekcijos dieną, jei praėjo bent 3 dienos nuo paskutinės injekcijos. Pasirinkus naują vartojimo dieną, vartojimą reikia tęsti kartą per savaitę.

Ar pavartojote per daug šio vaisto?

Nedelsdami susisiekite su savo gydytoju. Gali pasireikšti šalutinis poveikis, pvz., pykinimas, vėmimas ar viduriavimas, kuris gali sukelti dehidrataciją (skysčių netekimą).

Ar pamiršote pavartoti šį vaistą?

Jei pamiršote susišvirškinti dozę ir:

praėjo 5 dienos ar mažiau nuo tada, kai turėjote vartoti Wegovy, pavartokite jį, kai tik prisiminsite. Tada susišvirškite kitą dozę kaip įprasta numatytą dieną.

praėjo daugiau nei 5 dienos nuo tada, kai turėjote vartoti Wegovy, praleiskite praleistą dozę. Tada susišvirškite kitą dozę kaip įprasta numatytą dieną.

Nenaudokite dvigubos dozės, kad kompensuotumėte praleistą dozę.

Jei nustojate vartoti šį vaistą

Nenustokite vartoti šio vaisto nepasitarę su savo gydytoju.

Ar turite kitų klausimų apie šio vaisto vartojimą? Susisiekite su savo gydytoju, vaistininku ar slaugytoju.

4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir bet kuris vaistas, šis vaistas gali turėti šalutinį poveikį, nors ne kiekvienas jį patiria.

Sunkus šalutinis poveikis

Dažnai (pasireiškia mažiau nei 1 iš 10 vartotojų)

Diabetinės akių ligos komplikacijos (diabetinė retinopatija). Jei sergate diabetu, informuokite savo gydytoją, jei gydymo šiuo vaistu metu atsiranda akių problemų, pvz., regėjimo pokyčių.

Kartais (pasireiškia mažiau nei 1 iš 100 vartotojų)

Kasos uždegimas (ūminis pankreatitas). Uždegusios kasos simptomai yra stiprus ir ilgalaikis skausmas pilve, kuris gali plisti į nugarą. Jei patiriate šiuos simptomus, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Retai (pasireiškia mažiau nei 1 iš 1 000 vartotojų)

Sunkios alerginės reakcijos (anafilaksinės reakcijos, angioedema). Nedelsdami kreipkitės į medicinos pagalbą ir kuo greičiau informuokite savo gydytoją, jei pasireiškia tokie simptomai kaip kvėpavimo sunkumai, patinimas, lengvumo jausmas galvoje, greitas širdies plakimas, prakaitavimas ir sąmonės netekimas arba greitas patinimas po oda tokiose vietose kaip veidas, gerklė, rankos ir kojos, kas gali būti pavojinga gyvybei, jei dėl gerklės patinimo užsikemša kvėpavimo takai.

Labai retai (pasireiškia mažiau nei 1 iš 10 000 vartotojų)

medicininė akių būklė, vadinama neareritinė priekinė išeminė optinė neuropatija (NAION), kuri gali sukelti, kad be jokio skausmo, matote mažiau arba visai nematote viena akimi. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei pastebite, kad staiga nieko nematote arba lėtai matote blogiau (žr. skyrių 2: 'Staigūs regėjimo pokyčiai').

Nežinoma (negali būti nustatyta pagal turimus duomenis)

Žarnyno užsikimšimas. Sunki užkietėjimo forma su tokiais simptomais kaip pilvo skausmas, pilvo pūtimas, vėmimas ir kt.

Kiti šalutiniai poveikiai

Labai dažnai (pasireiškia daugiau nei 1 iš 10 vartotojų)

galvos skausmas
pykinimas
vėmimas
viduriavimas
užkietėjimas (obstipacija)
pilvo skausmas
silpnumo ar nuovargio jausmas

- šie dažniausiai pasireiškia didinant dozę ir paprastai išnyksta po kurio laiko.

Dažnai (pasireiškia mažiau nei 1 iš 10 vartotojų)

galvos svaigimas
skrandžio skausmai ar virškinimo sunkumai
raugėjimas
dujų kaupimasis (flatulencija ar pilvo pūtimas)
skrandžio pūtimas
uždegiminis skrandis (gastritas) - simptomai yra, pvz., skrandžio skausmas, pykinimas ar vėmimas
refliuksas ar rėmuo - taip pat vadinama gastroezofaginio refliukso liga
tulžies akmenys
plaukų slinkimas
reakcijos injekcijos vietoje
maistas ir gėrimai skonis kitoks nei įprastai
didesnis ar mažesnis odos jautrumas

mažas cukraus kiekis kraujyje (hipoglikemija) pacientams, sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu.

Mažo cukraus kiekio kraujyje įspėjamieji požymiai gali atsirasti staiga. Tai gali būti: šaltas prakaitas, šalta blyški oda, galvos skausmas, greitas širdies plakimas, pykinimas ar stiprus alkis, regėjimo pokyčiai, mieguistumas ar silpnumas, nervingumas, nerimas ar sumišimas, sunkumai susikaupti ar drebulys.

Jūsų gydytojas pasakys, kaip gydyti mažą cukraus kiekį kraujyje ir ką daryti, jei atsiranda šie įspėjamieji požymiai.

Mažas cukraus kiekis kraujyje gali atsirasti dažniau, jei taip pat vartojate sulfonilkarbamido darinius ar insuliną. Jūsų gydytojas gali sumažinti šių vaistų dozę prieš pradėdant vartoti šį vaistą.

Kartais (pasireiškia mažiau nei 1 iš 100 vartotojų)

žemas kraujospūdis

galvos svaigimas ar lengvumo jausmas galvoje atsistojus ar atsisėdus dėl kraujospūdžio sumažėjimo

greitas širdies plakimas

padidėję kasos fermentai (pvz., lipazė ir amilazė), nustatyti kraujo tyrimuose
maistas ilgiau nei įprastai lieka skrandyje (uždelstas skrandžio ištuštinimas).

Šalutinių poveikių pranešimas

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Tai taip pat taikoma galimiems šalutiniams poveikiams, kurie nėra paminėti šiame pakuotės lapelyje.

Taip pat galite pranešti apie šalutinį poveikį per nacionalinę pranešimų sistemą, nurodytą priede V. Pranešdami apie šalutinį poveikį, galite padėti mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti šį vaistą?

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Nenaudokite šio vaisto pasibaigus tinkamumo laikui. Jį rasite ant švirkštiklio etiketės ir ant kartoninės dėžutės po EXP. Nurodytas mėnuo ir metai. Paskutinė to mėnesio diena yra galiojimo pabaigos data.

Laikyti šaldytuve (2°C – 8°C). Nelaikyti šaldiklyje. Laikyti atokiau nuo šaldymo elemento.

Visada laikykite švirkštiklį originalioje pakuotėje, kad apsaugotumėte nuo šviesos. Wegovy gali būti laikomas nešaldytas iki 28 dienų, esant žemesnei nei 30°C temperatūrai.

Išmeskite švirkštiklį, jei jis buvo veikiamas šviesos ar temperatūros virš 30°C, buvo laikomas ne šaldytuve ilgiau nei 28 dienas arba buvo užšaldytas.

Nenaudokite šio vaisto, jei pastebite, kad tirpalas nėra skaidrus ir bespalvis.

Po naudojimo: švirkštiklis yra vienkartinis ir jame yra tik viena dozė. Išmeskite švirkštiklį po naudojimo.

Neleiskite vaistų į kanalizaciją ar tualetą ir nemeskite jų į šiukšliadėžę. Paklauskite savo vaistininko, ką daryti su vaistais, kurių nebevartojate. Tinkamai pašalinus vaistus, jie sunaikinami atsakingai ir nepatenka į aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?

- Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra semaglutidas.

Wegovy 0,25 mg injekcinis tirpalas

Kiekviename iš anksto užpildytame švirkštiklyje yra 0,25 mg semaglutido 0,5 ml (0,5 mg/ml).

Wegovy 0,5 mg tirpalas injekcijoms

Kiekviename iš anksto užpildytame švirkštiklyje yra 0,5 mg semaglutido 0,5 ml (1 mg/ml).

Wegovy 1 mg tirpalas injekcijoms

Kiekviename iš anksto užpildytame švirkštiklyje yra 1,0 mg semaglutido 0,5 ml (2 mg/ml).

Wegovy 1,7 mg tirpalas injekcijoms

Kiekviename iš anksto užpildytame švirkštiklyje yra 1,7 mg semaglutido 0,75 ml (2,27 mg/ml).

Wegovy 2,4 mg tirpalas injekcijoms

Kiekviename iš anksto užpildytame švirkštiklyje yra 2,4 mg semaglutido 0,75 ml (3,2 mg/ml).

- Kitos šio vaisto medžiagos yra dinatrio fosfato dihidratas, natrio chloridas, druskos rūgštis/natrio hidroksidas (pH reguliavimui), injekcinis vanduo. Taip pat žiūrėkite 2 skyrių „Wegovy sudėtyje yra natrio“ dėl informacijos apie natrij.

Kaip atrodo Wegovy ir kiek jo yra pakuotėje?

Wegovy yra skaidrus ir bespalvis tirpalas injekcijoms vienkartiname iš anksto užpildytame švirkštiklyje.

Kiekviename švirkštiklyje yra tik viena dozė.

Pakuotės dydis: 4 iš anksto užpildyti švirkštikliai.

Leidimo turėtojas prekiauti ir gamintojas

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danija

Ši pakuotės lapelė paskutinį kartą patvirtinta

Kiti informacijos šaltiniai

Daugiau informacijos apie šį vaistą galima rasti Europos Vaistų agentūros svetainėje: <http://www.ema.europa.eu>

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Wegovy

0.25 mg 0.5 mg 1 mg 1.7 mg 2.4 mg

Wegovy 0,25 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte
Wegovy 0,5 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte
Wegovy 1 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte
Wegovy 1,7 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte
Wegovy 2,4 mg tirpalas injekcijai iš anksto užpildytame švirkšte
Semaglutidas

Naudokite Wegovy kartą per savaitę

Wegovy naudojimo instrukcijos

Svarbi informacija prieš pradėdant

Pakuotėje yra vienas pakuotės lapelis ir keturi iš anksto užpildyti Wegovy švirkštai.

Ši pakuotės lapelio dalis skirta švirkšto naudojimui. Daugiau informacijos apie jūsų vaistą rasite kitoje šio pakuotės lapelio pusėje.

Kiekvienas švirkštas skirtas tik vienkartiniam naudojimui.

Jis tiekiamas su:

- viena iš anksto nustatyta doze;
- adata apsaugančiu dangteliu, kuris slepia įmontuotą adatą prieš, per ir po naudojimo;
- automatinio dozavimo mechanizmu, kuris pradeda veikti, kai adatos apsauga prispaudžiama prie jūsų odos, kaip paaiškino jūsų gydytojas ar slaugytoja.

Injekcijos metu švirkšto lange bus matoma geltona juosta. Neatitraukite švirkšto nuo odos, kol geltona juosta nesustos. Jei tai padarysite, automatinis dozavimas tęsis, bet galbūt negausite visos dozės.

Adatos apsauga užsifiksuoja, kai švirkštas pašalinamas iš jūsų odos. Negalite sustabdyti injekcijos ir vėliau tęsti.

Aklieji ar silpnaregiai žmonės neturėtų naudoti Wegovy švirkšto be pagalbos iš asmens, kuris yra apmokytas naudoti Wegovy.

Visada laikykitės šių naudojimo instrukcijų ir bet kokių gydytojo ar slaugytojos nurodymų.

Kaip naudoti savo Wegovy

1. Paruoškite savo injekciją.

Patikrinkite savo Wegovy švirkštą ir įsitikinkite, kad jūsų švirkštas nnaudojamas kaip:

1. galiojįmodata yra pasibaigusi
2. atrodo, kad švirkštiklis buvo naudotas arba pažeistas, pavyzdžiui, jei jis nukrito arba nebuvo tinkamai laikomas
3. vaistas atrodo drumstas. Pasirinkite injekcijos

vietą Pasirinkite injekcijos vietą vienoje iš kūno dalių, kaip nurodyta žemiau. Galite pasirinkti viršutines rankas, šlaunis arba pilvą (laikykitės 5 cm atstumo nuo bambos).

Galite kiekvieną savaitę injekuoti į tą pačią kūno dalį, bet įsitikinkite, kad nenaudojate tos pačios vietos kaip praėjusį kartą². Nuimkite švirkštiklio dangtelį. Traukite švirkštiklio dangtelį tiesiai nuo švirkštiklio.

3. Sušvirkškite Wegovy.

Prispauskite švirkštiklį tvirtai prie odos, kol geltona juosta sustos.

Jei geltona juosta nepradeda judėti, prispauskite švirkštiklį šiek tiek tvirčiau prie odos.

Kaip saugiai elgtis su savo švirkštikliu?

Informaciją apie savo vaistą galite rasti kitoje šio lapelio pusėje.

Švirkštiklis skirtas vienai poodinei Wegovy injekcijai kartą per savaitę ir yra skirtas naudoti tik vienam asmeniui.

Visada pasitarkite su instrukcijomis kitoje šio lapelio pusėje ir įsitikinkite, kad jūsų gydytojas ar slaugytoja parodė, kaip naudoti šiuos švirkštiklius.

Švirkštas skirtas vienai poodinei Wegovy injekcijai kartą per savaitę ir yra skirtas naudoti tik vienam asmeniui.

Visada pasitarkite su šio lapelio kitoje pusėje pateiktomis instrukcijomis ir įsitikinkite, kad jūsų gydytojas ar slaugytoja parodė, kaip naudoti šiuos švirkštiklius.

Wegovy visada laikykite vaikams nepasiekiamoje ir nematomoje vietoje. Be to, laikykite rašiklio dangtelį atokiau nuo vaikų, kad jie jo neprarytų.

Rūpinkitės savo rašikliu ir neeksponuokite jo drėgmei. Netinkamas naudojimas ar grubus elgesys gali lemti, kad rašiklis pateiks mažesnę nei visą dozę arba visai nepateiks dozės.

Laikykite dangtelį ant rašiklio, kol būsite pasiruošę injekcijai. Jūsų rašiklis nebėra sterilus, jei laikote nenaudotą rašiklį be dangtelio, jei nuimate dangtelį ir vėl jį uždedate arba jei dangtelio nėra. Tai gali sukelti infekciją.

Prieš naudojimą atsargiai elkitės su rašikliu ir nelieskite adatos ar adatos apsaugos. Paslėpta adata gali sukelti atsitiktinį įdūrimą.

Kiekvienas rašiklis turi vieną savaitinę dozę ir negali būti naudojamas pakartotinai. Išmeskite jį po naudojimo.

Kaip laikyti nenaudotus rašiklius?

Informaciją apie rašiklių laikymą žiūrėkite 5 skyriuje kitoje šio lapelio pusėje.

Kaip išmesti rašiklius?

Neleiskite vaistų į kriauklę ar tualetą ir nemeskite jų į šiukšliadėžę. Paklauskite savo vaistininko, ką daryti su vaistais, kurių nebevartojate. Jie bus sunaikinti atsakingai ir nepateks į aplinką.