

Pakningsvedlegg: informasjon til pasienten

Wegovy 0,25 mg injeksjonsvæske i ferdigfylt penn
Wegovy 0,5 mg injeksjonsvæske i ferdigfylt penn
Wegovy 1 mg injeksjonsvæske i ferdigfylt penn
Wegovy 1,7 mg injeksjonsvæske i ferdigfylt penn
Wegovy 2,4 mg injeksjonsvæske in ferdigfylt penn
semaglutid

Dette legemidlet er underlagt ekstra overvåking. Dette gjør det mulig å raskt identifisere ny sikkerhetsinformasjon. Du kan bidra ved å rapportere eventuelle bivirkninger du opplever. På slutten av avsnitt 4 kan du lese hvordan du gjør dette.

Les hele pakningsvedlegget nøye før du begynner å bruke dette legemidlet, for det inneholder viktig informasjon for deg.

- Oppbevar dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Har du flere spørsmål? Ta kontakt med legen, apoteket eller sykepleieren din.
- Ikke gi dette legemidlet til andre, da det kun er foreskrevet til deg. Det kan være skadelig for andre, selv om de har samme symptomer som deg.
- Får du bivirkninger som er nevnt i avsnitt 4? Eller får du bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget? Ta kontakt med legen, apoteket eller sykepleieren din.

Innholdet i dette pakningsvedlegget

1. Hva er Wegovy og hva brukes det til?
2. Når skal du ikke bruke dette legemidlet eller må du være ekstra forsiktig?
3. Hvordan bruker du dette legemidlet?
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan oppbevarer du dette legemidlet?
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva er Wegovy og hva brukes det til?

Hva er Wegovy?

Wegovy er et legemiddel for vekttap og vektkontroll som inneholder den aktive substansen semaglutid. Det ligner et naturlig hormon kalt 'glukagonlignende peptid-1' (GLP-1) som frigjøres fra tarmen etter et måltid. Det virker ved å påvirke steder (reseptorer) i hjernen som regulerer appetitten din, slik at du føler deg mett og mindre sulten, og du får mindre lyst på mat. Dette vil hjelpe deg å spise mindre og gå ned i vekt. Wegovy kan også bidra til å forebygge hjertesykdom.

Hva brukes dette legemidlet til?

Wegovy brukes i kombinasjon med diett og fysisk aktivitet for å gå ned i vekt og holde vekten.

Det brukes hos voksne med

- en BMI på 30 kg/m² eller høyere (fedme) eller
- en BMI på minst 27 kg/m², men mindre enn 30 kg/m² (overvekt) som har vektrelaterte helseproblemer (som diabetes, høyt blodtrykk, unormale fettverdier i blodet, pusteproblemer under søvn kalt 'obstruktiv søvnapné', eller en historie med hjerteinfarkt, slag eller blodkarproblemer).

BMI (Body Mass Index) er et mål på vekt i forhold til kroppshøyde.

Wegovy brukes i kombinasjon med diett og fysisk aktivitet for vektkontroll hos ungdom fra 12 år og eldre med

fedme og
kroppsvekt > 60 kg.

Som ung pasient mellom 12 og 18 år bør du bare fortsette å bruke Wegovy hvis din BMI har blitt redusert med minst 5 % etter 12 uker med dosen på 2,4 mg eller maksimal tolererbar dose (se avsnitt 3). Kontakt legen din før du fortsetter.

2. Når skal du ikke bruke dette legemidlet eller må du være ekstra forsiktig?

Når skal du ikke bruke dette legemidlet?

Du er allergisk overfor noen av innholdstoffene i dette legemidlet. Disse stoffene finner du i avsnitt 6.

Når bør du være ekstra forsiktig med dette legemidlet?

Kontakt legen din, apoteket eller sykepleieren før du bruker dette legemidlet.

Bruken av Wegovy anbefales ikke hvis du:

braker andre produkter for vekttap;
har diabetes type 1;
har alvorlig nedsatt nyrefunksjon;
har alvorlig nedsatt leverfunksjon;
har alvorlig hjertesvikt;
har en diabetisk øyesykdom (retinopati).

Det er lite erfaring med Wegovy hos pasienter:

på 85 år og eldre;
med leverproblemer;
med alvorlige mage- eller tarmproblemer som fører til forsinket tømming av magen (dette kalles gastroparese), eller med en inflammatorisk tarmsykdom.

Rådfør deg med legen din hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg.

Hvis du vet at du skal gjennomgå en operasjon der du vil bli holdt under narkose (sove), fortell legen din at du bruker Wegovy.

Uttørking

Under behandlingen med Wegovy kan du oppleve kvalme, oppkast eller diaré. Disse bivirkningene kan forårsake uttørking (væsketap). Det er viktig at du drikker mye for å unngå uttørking. Dette er spesielt viktig hvis du har nyreproblemer. Kontakt legen din hvis du har spørsmål eller bekymringer.

Betennelse i bukspyttkjertelen

Kontakt lege umiddelbart hvis du har alvorlige og vedvarende smerter i mageregionen (se avsnitt 4). Dette kan tyde på en betent bukspyttkjertel (akutt pankreatitt).

Personer med type 2 diabetes

Wegovy kan ikke brukes som erstatning for insulin. Ikke bruk Wegovy i kombinasjon med andre legemidler som inneholder GLP-1-reseptoragonister (som liraglutid, dulaglutid, exenatid eller lixisenatid).

Lavt blodsukker (hypoglykemi)

Hvis du bruker Wegovy sammen med et sulfonylureaderivat eller insulin, kan dette øke risikoen for lavt blodsukker (hypoglykemi). Se avsnitt 4 for advarselstegn på lavt blodsukker. Legen din kan be deg om å kontrollere blodsukkernivåene dine. Dette vil hjelpe legen din med å avgjøre om dosen av sulfonylureaderivatet eller insulinet må justeres for å redusere risikoen for lavt blodsukker.

Diabetisk øyesykdom (retinopati)

Hvis du har en øyesykdom på grunn av diabetes og bruker insulin, kan dette legemidlet føre til en forverring av synet ditt og behandling kan være nødvendig. Rask forbedring i blodsukkerreguleringen kan føre til en midlertidig forverring av en øyesykdom på grunn av diabetes. Kontakt legen din hvis du har en diabetisk øyesykdom og opplever øyeproblemer ved bruk av dette legemidlet.

Plutselige endringer i synet ditt

Hvis du plutselig ikke ser noe eller ser dårligere under behandlingen med dette middelet, kontakt legen din umiddelbart for råd. Dette kan være forårsaket av en svært sjelden bivirkning kalt ikke-arteriell fremre iskemisk optikusnevropati (NAION) (se avsnitt 4: Alvorlige bivirkninger). Legen din kan henvise deg til en øyeundersøkelse, og du må kanskje slutte med behandlingen med dette middelet.

Barn og ungdom under 18 år

Sikkerheten og effekten av Wegovy hos barn under 12 år er ikke undersøkt, det anbefales ikke å bruke dette legemidlet i denne aldersgruppen.

Bruker du andre legemidler?

Bruker du andre legemidler i tillegg til Wegovy, har du nylig gjort det eller er det en mulighet for at du snart vil bruke andre legemidler? Fortell det til legen din, apoteket eller sykepleieren.

Ta spesielt kontakt med legen din, apoteket eller sykepleieren hvis du bruker medisiner som inneholder følgende:

warfarin eller andre via munnen inntatte (orale) legemidler som reduserer blodets koagulering (orale antikoagulantia). Når du begynner med behandlingen med for eksempel warfarin eller lignende midler, kan blodprøver for å teste blodets koaguleringssevne være nødvendig oftere.

Graviditet og amming

Dette legemidlet skal ikke brukes under graviditet da det ikke er kjent om det er skadelig for ditt ufødte barn. Derfor anbefales det å bruke prevensjon (prevensjonsmidler) under bruk av dette legemidlet. Hvis du ønsker å bli gravid, må du slutte å bruke dette legemidlet minst to måneder i forveien. Er du gravid, tror du at du er gravid eller ønsker å bli gravid mens du bruker dette legemidlet? Kontakt legen din umiddelbart, da behandlingen må stoppes.

Ikke bruk dette legemidlet hvis du ammer, da det ikke er kjent om det går over i morsmelken.

Kjøring og bruk av maskiner

Wegovy har sannsynligvis ingen innvirkning på din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner. Noen pasienter kan føle seg svimmel ved bruk av Wegovy, spesielt i løpet av de første 4 månedene av behandlingen (se avsnitt 4). Hvis du føler deg svimmel, vær ekstra forsiktig når du kjører bil eller bruker maskiner. Kontakt legen din, apoteket eller sykepleieren for mer informasjon.

Personer med type 2 diabetes

Hvis du bruker dette legemidlet i kombinasjon med et sulfonylureaderivat eller insulin, kan du få lavt blodsukker (hypoglykemi) som kan redusere konsentrasjonsevnen din. Unngå å kjøre bil eller bruke maskiner når du opplever symptomer på lavt blodsukker. Se avsnitt 2 'Når bør du være ekstra forsiktig med dette legemidlet?' for informasjon om økt risiko for lavt blodsukker og avsnitt 4 for advarselstegn på lavt blodsukker. Kontakt legen din for mer informasjon.

Wegovy inneholder natrium

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, det vil si at det i hovedsak er 'natriumfritt'.

3. Hvordan bruker du dette legemidlet?

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Er du i tvil om riktig bruk? Kontakt legen din, apoteket eller sykepleieren.

Hvor mye av dette legemidlet skal du bruke?

Voksne

Den anbefalte dosen er 2,4 mg én gang i uken.

Behandlingen din starter med en lav dose som gradvis økes over 16 ukers behandling.

Når du begynner å bruke Wegovy, er startdosen 0,25 mg én gang i uken.

Legen din vil gi deg instruksjoner om å gradvis øke dosen hver 4. uke til du har nådd den anbefalte dosen på 2,4 mg én gang i uken.

Når du har nådd den anbefalte dosen på 2,4 mg, skal du ikke øke denne dosen ytterligere.

Hvis du opplever mye kvalme eller oppkast, diskuter med legen din om å utsette doseøkningen eller redusere til forrige dose, inntil symptomene avtar.

Vanligvis må du følge tabellen nedenfor.

Doseøkning	Ukentlig dose
Uke 1–4	0,25 mg
Uke 5–8	0,5 mg
Uke 9–12	1 mg
Uke 13–16	1,7 mg
Fra uke 17	2,4 mg

Legen din vil regelmessig kontrollere behandlingen din.

Ungdom (eldre enn 12 år)

For ungdom skal samme skjema for doseøkning brukes som for voksne (se ovenfor). Dosen skal økes til 2,4 mg (vedlikeholdsdose) eller til den maksimalt tolererte dosen er nådd. Doser høyere enn 2,4 mg per uke anbefales ikke.

Hvordan administreres dette legemidlet?

Wegovy administreres som en subkutan injeksjon. Ikke injiser det i en vene eller muskel.

De beste stedene å gi injeksjonen er forsiden av overarmen, lårene eller magen.

Før du bruker pennen for første gang, la legen din, apotekeren eller sykepleieren vise deg hvordan du bruker pennen.

Detaljerte instruksjoner om bruk av pennen finner du på den andre siden av dette pakningsvedlegget.

Personer med type 2 diabetes

Fortell legen din hvis du har type 2 diabetes. Legen din kan justere dosen av diabetesmedisinene dine for å forhindre lavt blodsukker.

Når bruker du dette legemidlet?

Bruk dette legemidlet én gang i uken, om mulig, hver uke på samme dag.

Du kan injisere deg selv når som helst på dagen - uavhengig av måltider.

Om nødvendig kan du endre dagen for din ukentlige injeksjon av dette legemidlet, så lenge det har gått minst 3 dager siden din siste injeksjon av dette legemidlet. Etter å ha valgt en ny administrasjonsdag, må administrasjonen fortsette én gang i uken.

Har du brukt for mye av dette legemidlet?

Kontakt legen din umiddelbart. Du kan få bivirkninger som kvalme, oppkast eller diaré, noe som kan føre til dehydrering (væsketap).

Har du glemt å bruke dette legemidlet?

Hvis du glemmer å injisere en dose og:

det er 5 dager eller mindre siden du skulle ha brukt Wegovy, bruk det så snart du husker det. Deretter injiserer du din neste dose som vanlig på din planlagte dag.

det er mer enn 5 dager siden du skulle ha brukt Wegovy, hopper du over den glemte dosen. Deretter injiserer du din neste dose som vanlig på din planlagte dag.

Bruk ikke dobbel dose for å ta igjen en glemt dose.

Hvis du slutter å bruke dette legemidlet

Stopp ikke bruken av dette legemidlet uten å diskutere det med legen din.

Har du flere spørsmål om bruken av dette legemidlet? Ta kontakt med legen din, apoteket eller sykepleieren.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan også dette legemidlet ha bivirkninger, selv om ikke alle får dem.

Alvorlige bivirkninger

Vanlig (forekommer hos færre enn 1 av 10 brukere)

Komplikasjoner av øyesykdom på grunn av diabetes (diabetisk retinopati). Hvis du har diabetes, informer legen din hvis du får øyeproblemer under behandlingen med dette legemidlet, som forandringer i synet.

Noen ganger (forekommer hos færre enn 1 av 100 brukere)

Betennelse i bukspyttkjertelen (akutt pankreatitt). Symptomer på en betent bukspyttkjertel inkluderer alvorlig og langvarig smerte i magen, som kan stråle ut til ryggen. Du må umiddelbart kontakte legen din hvis du opplever disse symptomene.

Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1.000 brukere)

Alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner, angioødem). Søk øyeblikkelig medisinsk hjelp og informer legen din så snart som mulig hvis du opplever symptomer som pustevansker, hevelse, svimmelhet, rask hjerterytme, svette og bevissthetstap eller rask hevelse under huden på steder som ansiktet, halsen, armene og bena, noe som kan være livstruende hvis hevelse i halsen blokkerer luftveiene.

Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10.000 brukere)

en medisinsk tilstand i øyet kalt ikke-arteriell fremre iskemisk optikusnevropati (NAION) som kan føre til at du, uten smerte, ser mindre eller ingenting med ett av øynene dine. Kontakt legen din umiddelbart hvis du merker at du plutselig ikke ser noe eller gradvis ser dårligere (se avsnitt 2: 'Plutselige endringer i synet ditt').

Ukjent (kan ikke bestemmes ut fra tilgjengelige data)

Tarmobstruksjon. En alvorlig form for forstoppelse med symptomer som magesmerter, oppblåsthet, oppkast, osv.

Andre bivirkninger

Svært vanlige (forekommer hos mer enn 1 av 10 brukere)

hodepine
kvalme
oppkast
diaré
forstoppelse (obstipasjon)
magesmerter
føler seg svak eller trøtt

- disse forekommer spesielt under doseøkning og forsvinner vanligvis etter en tid.

Vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 10 brukere)

svimmelhet
mageproblemer eller fordøyelsesvansker
røping
gassdannelse (flatulens eller luft i magen)
oppblåsthet i magen
betent mage (gastritt) - symptomene inkluderer blant annet magesmerter, kvalme eller oppkast
refluks eller halsbrann - også kalt gastroøsofageal reflukssykdom
gallesteiner
hårtap

reaksjoner på injeksjonsstedet
mat og drikke smaker annerledes enn normalt
mer eller mindre følelse i huden
lavt blodsukker (hypoglykemi) hos pasienter med type 2 diabetes.

Advarselstegnene på lavt blodsukker kan komme plutselig. Disse kan være: kaldsvette, kjølig blek hud, hodepine, rask hjerterytme, kvalme eller sterk sultfølelse, endringer i synet, føle seg søvning eller svak, føle seg nervøs, engstelig eller forvirret, ha problemer med å konsentrere seg eller skjelving.

Legen din vil fortelle deg hvordan du skal behandle lavt blodsukker og hva du skal gjøre hvis du får disse advarselstegnene.

Lavt blodsukker skjer sannsynligvis oftere hvis du også bruker et sulfonylureaderivat eller insulin. Legen din vil muligens redusere dosen av disse legemidlene før du begynner å bruke dette middelet.

Noen ganger (forekommer hos færre enn 1 av 100 brukere)

lavt blodtrykk
svimmelhet eller letthet i hodet når du reiser deg opp eller setter deg oppreist på grunn av en blodtrykksfall
rask hjerterytme
økning av bukspyttkjertelenzymer (som lipase og amylase) påvist i blodprøver
mat forblir lenger enn normalt i magen (forsinket magesekktømming).

Rapportering av bivirkninger

Får du bivirkninger, kontakt lege, apotek eller sykepleier. Dette gjelder også mulige bivirkninger som ikke er nevnt i denne pakningsvedlegget. Du kan også rapportere bivirkninger direkte via det nasjonale rapporteringssystemet som angitt i vedlegg V. Ved å rapportere bivirkninger kan du hjelpe oss med å få mer informasjon om sikkerheten til dette legemidlet.

5. Hvordan oppbevarer du dette legemidlet?

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen. Den finner du på etiketten på pennen og på pappesken etter EXP. Det står en måned og et år. Den siste dagen i den måneden er utløpsdatoen.

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C). Skal ikke fryses. Holdes unna fryseelementet. Oppbevar alltid pennen i originalemballasjen for å beskytte mot lys. Wegovy kan oppbevares uten kjøling i maksimalt 28 dager ved temperaturer under 30°C.

Kast pennen hvis den har vært utsatt for lys eller temperaturer over 30°C, har vært utenfor kjøleskapet i mer enn 28 dager eller har vært frosset.

Bruk ikke dette legemidlet hvis du merker at løsningen ikke er klar og fargeløs.

Etter bruk: pennen er til engangsbruk og inneholder kun én dose. Kast pennen etter bruk.

Skyll ikke legemidler i vasken eller toalettet og kast dem ikke i søppelbøtta. Spør apoteket hva du skal gjøre med legemidler du ikke lenger bruker. Hvis du kaster legemidler på riktig måte, blir de destruert på en ansvarlig måte og havner ikke i miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hvilke stoffer inneholder dette legemidlet?

- Det aktive stoffet i dette legemidlet er semaglutid.
Wegovy 0,25 mg injeksjonsvæske
Hver ferdigfylte penn inneholder 0,25 mg semaglutid i 0,5 ml (0,5 mg/ml).

Wegovy 0,5 mg oppløsning til injeksjon
Hver ferdigfylte penn inneholder 0,5 mg semaglutid i 0,5 ml (1 mg/ml).

Wegovy 1 mg oppløsning til injeksjon
Hver ferdigfylte penn inneholder 1,0 mg semaglutid i 0,5 ml (2 mg/ml).

Wegovy 1,7 mg oppløsning til injeksjon
Hver ferdigfylte penn inneholder 1,7 mg semaglutid i 0,75 ml (2,27 mg/ml).

Wegovy 2,4 mg oppløsning til injeksjon
Hver ferdigfylte penn inneholder 2,4 mg semaglutid i 0,75 ml (3,2 mg/ml).
- De andre stoffene i dette legemidlet er dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjoner. Se også avsnitt 2 'Wegovy inneholder natrium' for informasjon om natrium.

Hvordan ser Wegovy ut og hvor mye er det i en pakke?

Wegovy er en klar og fargeløs oppløsning til injeksjon i en ferdigfylt penn for engangsbruk.

Hver penn inneholder kun én dose.

Pakningsstørrelse med 4 ferdigfylte penner.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og produsent Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent i

Denne pakningsvedlegget ble sist godkjent i

Andre informasjonskilder

Mer informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til det europeiske legemiddelkontoret: <http://www.ema.europa.eu>

Pakningsvedlegg: informasjon for pasienten

Wegovy

0.25 mg 0.5 mg 1 mg 1.7 mg 2.4 mg

Wegovy 0,25 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Wegovy 0,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Wegovy 1 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Wegovy 1,7 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Wegovy 1 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt p

enn Wegovy 1,7 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Wegovy 2,4 mg løsning for injeksjon i en ferdigfylt penn

Semaglutid

Bruk Wegovy én gang i uken

Instruksjoner for bruk av Wegovy

Viktig informasjon før du begynner

Pakningen inneholder én pakningsvedlegg og fire Wegovy ferdigfylte pennen.

Denne delen av pakningsvedlegget handler om bruk av pennen. For mer informasjon om medisinen din, se den andre siden av dette pakningsvedlegget.

Hver penn er kun for engangsbruk.

Den leveres med:

- én forhåndsinnstilt dose;
- en nålebeskytter som skjuler den innebygde nålen før, under og etter bruk;
- en automatisk doseringsmekanisme som starter når nålebeskytteren presses mot huden din, som forklart av legen din eller sykepleieren.

Under injeksjonen av dosen vil en gul strek bli synlig i pennevinduet. Fjern ikke pennen fra huden din før den gule streken har stoppet. Hvis du gjør det, vil den automatiske administrasjonen fortsette, men du får kanskje ikke hele dosen.

Nålebeskytteren låses når pennen fjernes fra huden din. Du kan ikke stoppe injeksjonen midlertidig og fortsette senere.

Personer som er blinde eller svaksynte, skal ikke bruke Wegovy-pennen uten hjelp fra en person som er trent i bruk av Wegovy.

Følg alltid disse bruksanvisningene og eventuelle instruksjoner fra legen din eller sykepleieren.

Hvordan bruke Wegovy

1. Forbered injeksjonen din.

Kontroller Wegovy-pennen din og sørg for at du har pennen din nbrukt som:

1. utløpsdatoen har passert
2. det ser ut som pennen er brukt eller skadet, for eksempel hvis den har falt eller ikke er oppbevart på riktig måte
3. legemidlet ser uklart ut. Velg injeksjonssted

Velg din injeksjonsplDu kan injisere i samme kroppsdel hver uke, men sørg for at du ikke bruker samme sted som forrige gang

2. Fjern pennehetten. Trekk pennehetten rett av pennen. 3. Injiser Wegovy.

Trykk pennen fast mot huden til den gule stangen har stoppet.

Hvis den gule stangen ikke begynner å bevege seg, trykk pennen litt hardere mot huden.

Hvordan håndterer jeg pennen min trygt?

For informasjon om legemidlet ditt kan du se den andre siden av dette pakningsvedlegget.

Pennen er for én subkutan injeksjon av Wegovy én gang i uken og er kun for bruk av én person.

Se alltid instruksjonene på den andre siden av dette pakningsvedlegget og sørg for at legen eller sykepleieren din har vist deg hvordan du bruker disse pennene.

For informasjon om legemidlet ditt kan du se den andre siden av dette pakningsvedlegget.

Pennen er for én subkutan injeksjon av Wegovy én gang per uke og er kun for bruk av én person.

Rådfør deg alltid med instruksjonene på den andre siden av dette pakningsvedlegget og sørg for at legen din eller sykepleieren har vist deg hvordan du skal bruke disse pennene.

Hold alltid Wegovy utilgjengelig for barn. Hold også pennehetten borte fra barn for å forhindre at de svelger den.

Behandle pennen din med forsiktighet og unngå å utsette den for fuktighet. Røff håndtering eller feil bruk kan føre til at pennen din gir mindre enn full dose eller ingen dose i det hele tatt.

Hold hetten på pennen til du er klar til å injisere. Pennen din er ikke lenger steril hvis du oppbevarer en ubrukt penn uten pennehette, hvis du tar av pennehetten og setter den på igjen, eller hvis pennehetten mangler. Dette kan føre til infeksjon.

Vær forsiktig når du håndterer pennen din før bruk, og unngå å berøre nålen eller nålebeskytteren. Den skjulte nålen kan føre til utilsiktet nålestikk.

Hver penn inneholder én ukentlig dose og kan ikke brukes på nytt. Kast den etter bruk.

Hvordan oppbevarer jeg mine ubrukte penner?

For informasjon om oppbevaring av pennene, se avsnitt 5 på den andre siden av dette pakningsvedlegget.

Hvordan kan jeg kaste pennene mine?

Skyll ikke legemidler ned i vasken eller toalettet, og kast dem ikke i søppelbøtta. Spør apoteket ditt hva du skal gjøre med legemidler du ikke lenger bruker. De vil da bli destruert på en ansvarlig måte og ikke havne i miljøet.