

Ulotka: informacje dla pacjenta

Wegovy 0,25 mg roztwór do wstrzykiwań w napenionej strzykawce
Wegovy 0,5 mg roztwór do wstrzykiwań w napenionej strzykawce
Wegovy 1 mg roztwór do wstrzykiwań w napenionej strzykawce
Wegovy 1,7 mg roztwór do wstrzykiwań w napenionej strzykawce
Wegovy 2,4 mg roztwór do wstrzykiwań w napenionej strzykawce
semaglutyd

Ten lek podlega dodatkowej kontroli. Dzięki temu można szybko ustalić nowe informacje dotyczące bezpieczeństwa. Możesz przyczynić się do tego, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które mogą wystąpić. Na końcu punktu 4 dowiesz się, jak to zrobić.

Przeczytaj uważnie całą ulotkę przed zastosowaniem tego leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla Ciebie.

- Zachowaj tę ulotkę. Może być potrzebna ponownie.
- Masz jeszcze pytania? Skontaktuj się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
- Nie przekazuj tego leku innym osobom, ponieważ jest on przepisany wyłącznie Tobie. Może być szkodliwy dla innych, nawet jeśli mają takie same objawy jak Ty.
- Czy wystąpiły u Ciebie działania niepożądane wymienione w punkcie 4? A może wystąpiło działanie niepożądane, które nie jest wymienione w tej ulotce? Skontaktuj się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Spis treści tej ulotki

1. Co to jest Wegovy i w jakim celu się go stosuje?
2. Kiedy nie należy stosować tego leku lub należy zachować szczególną ostrożność?
3. Jak stosować ten lek?
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać ten lek?
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Wegovy i w jakim celu się go stosuje?

Co to jest Wegovy?

Wegovy to lek na utratę wagi i kontrolę masy ciała, który zawiera substancję czynną semaglutyd. Jest podobny do naturalnego hormonu zwanego „glukagonopodobny peptyd-1” (GLP-1), który uwalnia się z jelit po posiłku. Działa poprzez oddziaływanie na miejsca (receptory) w mózgu, które regulują apetyt, dzięki czemu czujesz się syty i mniej głodny oraz masz mniejszą ochotę na jedzenie. To pomoże ci jeść mniej i schudnąć. Wegovy może również pomóc w zapobieganiu chorobom serca.

W jakim celu stosuje się ten lek?

Wegovy stosuje się w połączeniu z dietą i ćwiczeniami fizycznymi w celu utraty wagi i utrzymania masy ciała. Jest stosowany u dorosłych z

BMI wynoszącym 30 kg/m² lub wyższym (otyłość) lub

BMI wynoszącym co najmniej 27 kg/m², ale mniej niż 30 kg/m² (nadwaga) z

problemami zdrowotnymi związanymi z wagą (takimi jak cukrzyca, wysokie ciśnienie

krwi, nieprawidłowe poziomy tłuszczyków we krwi, trudności w oddychaniu podczas snu

zwane „obturacyjnym bezdechem sennym” lub historia zawału serca, udaru mózgu lub problemów z naczyniami krwionośnymi).

BMI (Body Mass Index) to miara wagi w stosunku do wzrostu.

Wegovy stosuje się w połączeniu z dietą i ćwiczeniami fizycznymi do kontroli masy ciała u młodzieży w wieku 12 lat i starszej z

otyłością i

masą ciała > 60 kg.

Jako młodszy pacjent w wieku od 12 do 18 lat powinieneś kontynuować stosowanie Wegovy tylko wtedy, gdy po 12 tygodniach stosowania dawki 2,4 mg lub maksymalnej tolerowanej dawki (patrz punkt 3) twój BMI zmniejszy się o co najmniej 5%. Skontaktuj się z lekarzem przed kontynuacją.

2. Kiedy nie należy stosować tego leku lub należy zachować szczególną ostrożność?

Kiedy nie należy stosować tego leku?

Jesteś uczulony na którykolwiek ze składników tego leku. Składniki te można znaleźć w punkcie 6.

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu tego leku?

Skontaktuj się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką przed użyciem tego leku.

Stosowanie Wegovy nie jest zalecane, jeśli:

używasz innych produktów do utraty wagi;

masz cukrzycę typu 1;

masz poważnie upośledzoną funkcję nerek;

masz poważnie upośledzoną funkcję wątroby;

masz ciężką niewydolność serca;

masz cukrzycową chorobę oczu (retinopatię).

Jest niewiele doświadczeń z Wegovy u pacjentów:

w wieku 85 lat i starszych;

z problemami z wątrobą;

z poważnymi problemami żołądkowo-jelitowymi prowadzącymi do opóźnionego opróżniania żołądka (nazywa się to gastroparezą) lub z chorobą zapalną jelit.

Skonsultuj się z lekarzem, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy Ciebie.

Jeśli wiesz, że musisz przejść operację, podczas której będziesz pod narkozą (uśpienie), powiedz lekarzowi, że używasz Wegovy.

Odwodnienie

Podczas leczenia Wegovy możesz odczuwać nudności, wymioty lub biegunkę. Te działania niepożądane mogą powodować odwodnienie (utrata płynów). Ważne jest, aby dużo pić, aby zapobiec odwodnieniu. Jest to szczególnie ważne, jeśli masz problemy z nerkami. Skontaktuj się z lekarzem, jeśli masz pytania lub obawy.

Zapalenie trzustki

Natychmiast skontaktuj się z lekarzem, jeśli masz silny i uporczywy ból w okolicy żołądka (patrz punkt 4). Może to wskazywać na zapalenie trzustki (ostre zapalenie trzustki).

Osoby z cukrzycą typu 2

Wegovy nie może być stosowany jako zamiennik insuliny. Nie stosuj Wegovy w połączeniu z innymi lekami zawierającymi agonistów receptora GLP-1 (takimi jak liraglutyd, dulaglutyd, eksenatyd lub liksysenatyd).

Niski poziom cukru we krwi (hipoglikemia)

Jeśli stosujesz Wegovy razem z pochodną sulfonilomocznika lub insuliną, może to zwiększyć ryzyko niskiego poziomu cukru we krwi (hipoglikemii). Zobacz punkt 4, aby poznać objawy ostrzegawcze niskiego poziomu cukru we krwi. Twój lekarz może poprosić Cię o monitorowanie poziomu cukru we krwi. Pomoże to lekarzowi zdecydować, czy dawka pochodnej sulfonilomocznika lub insuliny powinna zostać dostosowana, aby zmniejszyć ryzyko niskiego poziomu cukru we krwi.

Cukrzycowa choroba oczu (retinopatia)

Jeśli masz chorobę oczu spowodowaną cukrzycą i stosujesz insulinę, ten lek może prowadzić do pogorszenia wzroku i może być konieczne leczenie. Szybkie poprawy w regulacji poziomu cukru we krwi mogą prowadzić do tymczasowego pogorszenia choroby oczu spowodowanej cukrzycą. Skontaktuj się z lekarzem, jeśli masz cukrzycową chorobę oczu i doświadczasz problemów ze wzrokiem podczas stosowania tego leku.

Nagłe zmiany w widzeniu

Jeśli nagle przestaniesz widzieć lub szybko pogorszy się Twój wzrok podczas leczenia tym lekiem, natychmiast skontaktuj się z lekarzem po poradę. Może to być spowodowane bardzo rzadkim działaniem niepożądanym zwanym niearterytną przednią niedokrwienną neuropatią nerwu wzrokowego (NAION) (zobacz punkt 4: Poważne działania niepożądane). Twój lekarz może skierować Cię na badanie wzroku i może być konieczne przerwanie leczenia tym lekiem.

Dzieci i młodzież do 18 lat

Bezpieczeństwo i skuteczność Wegovy u dzieci poniżej 12 roku życia nie zostały zbadane, nie zaleca się stosowania tego leku w tej grupie wiekowej.

Czy stosujesz inne leki?

Czy stosujesz inne leki oprócz Wegovy, czy robiłeś to niedawno lub istnieje możliwość, że wkrótce zaczniesz stosować inne leki? Powiedz o tym swojemu lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Skontaktuj się szczególnie z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli stosujesz leki zawierające:

warfarynę lub inne doustne leki obniżające krzepliwość krwi (doustne antykoagulanty). Kiedy zaczynasz leczenie, na przykład warfaryną lub podobnymi środkami, badania krwi w celu sprawdzenia krzepliwości krwi mogą być częściej konieczne.

Ciąża i karmienie piersią

Tego leku nie należy stosować w czasie ciąży, ponieważ nie wiadomo, czy jest szkodliwy dla nienarodzonego dziecka. Dlatego zaleca się stosowanie antykoncepcji (środków antykoncepcyjnych) podczas stosowania tego leku. Jeśli planujesz zajść w ciążę, musisz przerwać stosowanie tego leku co najmniej dwa miesiące wcześniej. Czy jesteś w ciąży, podejrzewasz, że jesteś w ciąży lub planujesz zajść w ciążę podczas stosowania tego leku? Natychmiast skontaktuj się z lekarzem, ponieważ leczenie musi zostać przerwane.

Nie stosuj tego leku, jeśli karmisz piersią, ponieważ nie wiadomo, czy przenika do mleka matki.

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

Wegovy prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać zawroty głowy podczas stosowania Wegovy, zwłaszcza w ciągu pierwszych 4 miesięcy leczenia (zobacz punkt 4). Jeśli odczuwasz zawroty głowy, bądź szczególnie ostrożny podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Skontaktuj się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, aby uzyskać więcej informacji.

Osoby z cukrzycą typu 2

Jeśli stosujesz ten lek w połączeniu z pochodną sulfonilomocznika lub insuliną, możesz doświadczyć niskiego poziomu cukru we krwi (hipoglikemii), co może obniżyć twoją zdolność koncentracji. Unikaj prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn, gdy masz objawy niskiego poziomu cukru we krwi. Zobacz punkt 2 'Kiedy należy zachować szczególną ostrożność stosując ten lek?' dla informacji o zwiększonym ryzyku niskiego poziomu cukru we krwi oraz punkt 4 dla objawów ostrzegawczych niskiego poziomu cukru we krwi. Skontaktuj się z lekarzem, aby uzyskać więcej informacji.

Wegovy zawiera sód

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, co oznacza, że jest zasadniczo 'bezsodowy'.

3. Jak stosować ten lek?

Stosuj ten lek zawsze dokładnie tak, jak zalecił ci lekarz. Masz wątpliwości co do prawidłowego stosowania? Skontaktuj się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Ile tego leku należy stosować?

Dorośli

Zalecana dawka to 2,4 mg raz w tygodniu.

Leczenie rozpoczyna się od niskiej dawki, która jest stopniowo zwiększana przez 16 tygodni leczenia.

Kiedy zaczynasz stosować Wegovy, dawka początkowa wynosi 0,25 mg raz w tygodniu.

Twój lekarz poda ci instrukcje, aby stopniowo zwiększać dawkę co 4 tygodnie, aż osiągniesz zalecaną dawkę 2,4 mg raz w tygodniu.

Kiedy osiągniesz zalecaną dawkę 2,4 mg, nie powinieneś jej dalej zwiększać.

Jeśli doświadczasz silnych nudności lub wymiotów, skonsultuj się z lekarzem w sprawie opóźnienia zwiększenia dawki lub zmniejszenia do poprzedniej dawki, aż objawy się zmniejszą.

Zazwyczaj będziesz musiał przestrzegać poniższej tabeli.

Zwiększenie dawki	Tygodniowa dawka
Tydzień 1–4	0,25 mg
Tydzień 5–8	0,5 mg
Tydzień 9–12	1 mg
Tydzień 13–16	1,7 mg
Od tygodnia 17	2,4 mg

Twój lekarz będzie regularnie kontrolować Twoje leczenie.

Młodzież (powyżej 12 lat)

Dla młodzieży należy stosować ten sam schemat zwiększania dawki jak dla dorosłych (patrz wyżej). Dawkę należy zwiększać do 2,4 mg (dawka podtrzymująca) lub do osiągnięcia maksymalnej tolerowanej dawki. Dawkowanie powyżej 2,4 mg na tydzień nie jest zalecane.

Jak podaje się ten lek?

Wegovy podaje się jako zastrzyk podskórny (iniekcja podskórna). Nie wstrzykiwać do żyły ani mięśnia.

Najlepsze miejsca do wykonania zastrzyku to przednia część ramienia, uda lub brzuch. Zanim użyjesz pióra po raz pierwszy, niech lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka pokaże Ci, jak używać pióra.

Szczegółowe instrukcje dotyczące użycia pióra znajdziesz na odwrocie tej ulotki.

Osoby z cukrzycą typu 2

Poinformuj swojego lekarza, jeśli masz cukrzycę typu 2. Twój lekarz może dostosować dawkę leków na cukrzycę, aby zapobiec niskim poziomom cukru we krwi.

Kiedy stosować ten lek?

Stosuj ten lek raz w tygodniu, jeśli to możliwe, każdego tygodnia tego samego dnia. Możesz wstrzykiwać sobie lek o dowolnej porze dnia - niezależnie od posiłków.

W razie potrzeby możesz zmienić dzień cotygodniowego wstrzyknięcia tego leku, pod warunkiem, że minęły co najmniej 3 dni od ostatniego wstrzyknięcia tego leku. Po wybraniu nowego dnia podania, należy kontynuować podawanie raz w tygodniu.

Czy użyłeś zbyt dużo tego leku?

Natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Możesz doświadczyć działań niepożądanych, takich jak nudności, wymioty lub biegunka, co może prowadzić do odwodnienia (utrata płynów).

Czy zapomniałeś użyć tego leku?

Jeśli zapomnisz wstrzyknąć dawkę i:

minęło 5 dni lub mniej od momentu, gdy powinieneś użyć Wegovy, użyj go, gdy tylko sobie przypomnisz. Następnie wstrzyknij następną dawkę jak zwykle w zaplanowanym dniu.

minęło więcej niż 5 dni od momentu, gdy powinieneś użyć Wegovy, pomiń pominiętą dawkę. Następnie wstrzyknij następną dawkę jak zwykle w zaplanowanym dniu.

Nie stosuj podwójnej dawki, aby nadrobić pominiętą dawkę.

Jeśli przestaniesz używać tego leku

Nie przerywaj stosowania tego leku bez konsultacji z lekarzem.

Masz inne pytania dotyczące stosowania tego leku? Skontaktuj się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poważne działania niepożądane

Często (występują u mniej niż 1 na 10 użytkowników)

Powikłania chorób oczu spowodowane cukrzycą (retinopatia cukrzycowa). Jeśli masz cukrzycę, poinformuj lekarza, jeśli podczas leczenia tym lekiem wystąpią u Ciebie problemy z oczami, takie jak zmiany w widzeniu.

Czasami (występują u mniej niż 1 na 100 użytkowników)

Zapalenie trzustki (ostre zapalenie trzustki). Objawy zapalenia trzustki obejmują silny i długotrwały ból w żołądku, który może promieniować do pleców. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli doświadczasz tych objawów.

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1.000 użytkowników)

Poważne reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy).

Natychmiast zasięgnij pomocy medycznej i jak najszybciej poinformuj lekarza, jeśli wystąpią objawy takie jak trudności w oddychaniu, obrzęk, uczucie lekkiego zawrotu głowy, szybkie bicie serca, pocenie się i utrata przytomności lub szybki obrzęk pod skórą w miejscach takich jak twarz, gardło, ramiona i nogi, co może być zagrażające życiu, jeśli obrzęk gardła zablokuje drogi oddechowe.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10.000 użytkowników)

stan medyczny oka zwany niearterytną przednią niedokrwienną neuropatią nerwu wzrokowego (NAION), który może spowodować, że bez bólu widzisz mniej lub nic jednym z oczu. Skontaktuj się natychmiast z lekarzem, jeśli zauważysz, że nagle nic nie widzisz lub stopniowo widzisz gorzej (patrz punkt 2: 'Nagłe zmiany w widzeniu').

Nieznane (nie można określić na podstawie dostępnych danych)

Niedrożność jelit. Poważna forma niedrożności z objawami takimi jak ból brzucha, wzdęcia, wymioty, itp.

Inne działania niepożądane

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 użytkowników)

ból głowy
nudności
wymioty
biegunka
zaparcia (obstipacja)
ból brzucha

- uczucie osłabienia lub zmęczenia
- te występują głównie podczas zwiększania dawki i zazwyczaj znikają po pewnym czasie.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 użytkowników)

- zawroty głowy
- dolegliwości żołądkowe lub trudności trawienne
- odbijanie
- wzdęcia (flatulencja lub gazy)
- uczucie wzdęcia w żołądku
- zapalenie żołądka (gastritis) - objawy to m.in. ból żołądka, nudności lub wymioty
- refluks lub zgaga - zwana również chorobą refluksową przełyku
- kamienie żółciowe
- wypadanie włosów
- reakcje w miejscu wstrzyknięcia
- jedzenie i picie smakuje inaczej niż zwykle
- więcej lub mniej czucia w skórze
- niski poziom cukru we krwi (hipoglikemia) u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Objawy ostrzegawcze niskiego poziomu cukru we krwi mogą pojawić się nagle. Mogą to być: zimne poty, chłodna blada skóra, ból głowy, szybkie bicie serca, nudności lub silny głód, zmiany w widzeniu, uczucie senności lub osłabienia, uczucie nerwowości, lęku lub dezorientacji, trudności z koncentracją lub drżenie.

Twój lekarz powie Ci, jak leczyć niski poziom cukru we krwi i co robić, gdy pojawią się te objawy ostrzegawcze.

Niski poziom cukru we krwi występuje prawdopodobnie częściej, jeśli stosujesz również pochodną sulfonilomocznika lub insulinę. Twój lekarz może zmniejszyć dawkę tych leków przed rozpoczęciem stosowania tego środka.

Czasami (występują u mniej niż 1 na 100 użytkowników)

- niskie ciśnienie krwi
- zawroty głowy lub uczucie lekkości w głowie przy wstawaniu lub siadaniu z powodu spadku ciśnienia krwi
- szybkie bicie serca
- zwiększenie poziomu enzymów trzustkowych (takich jak lipaza i amylaza) wykazane w badaniach krwi
- pokarm pozostaje w żołądku dłużej niż normalnie (opóźnione opróżnianie żołądka).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią działania niepożądane, skontaktuj się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Dotyczy to również możliwych działań niepożądanych, które nie są wymienione w tej ulotce. Możesz również zgłaszać działania niepożądane bezpośrednio poprzez krajowy system zgłaszania wymieniony w załączniku V. Zgłaszając działania niepożądane, możesz pomóc nam uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa tego leku. zgłaszając działania niepożądane, możesz pomóc nam uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa tego leku.

5. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności. Termin ważności znajduje się na etykiecie pióra i na kartonowym pudełku po EXP. Podana jest tam data miesiąca i roku. Ostatni dzień tego miesiąca jest terminem ważności.

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). Nie zamrażać. Trzymać z dala od elementu chłodzącego. Przechowywać pióro zawsze w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Wegovy można przechowywać poza lodówką przez maksymalnie 28 dni w temperaturze poniżej 30°C.

Wyrzucić pióro, jeśli było narażone na światło lub temperatury powyżej 30°C, było poza lodówką dłużej niż 28 dni lub było zamrożone.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważysz, że roztwór nie jest przejrzysty i bezbarwny.

Po użyciu: pióro jest jednorazowego użytku i zawiera tylko jedną dawkę. Wyrzucić pióro po użyciu.

Nie wylewaj leków do zlewu ani toalety i nie wyrzucaj ich do kosza na śmieci. Zapytaj farmaceutę, co zrobić z lekami, których już nie używasz. Prawidłowe usuwanie leków zapewnia ich odpowiedzialne zniszczenie i zapobiega przedostawaniu się do środowiska.

Nie spłukuj leków w zlewie ani w toalecie i nie wyrzucaj ich do kosza na śmieci. Zapytaj farmaceutę, co zrobić z lekami, których już nie używasz. Prawidłowe usuwanie leków zapewnia ich odpowiedzialne zniszczenie i zapobiega przedostawaniu się do środowiska.

6. Jakie substancje zawiera ten lek?

Substancją czynną w tym leku jest semaglutyd.

- Wegovy 0,25 mg roztwór do wstrzykiwań
Każde wstępnie napełnione pióro zawiera 0,25 mg semaglutydu w 0,5 ml (0,5 mg/ml).
Każda wstępnie napełniona strzykawka zawiera 0,25 mg semaglutydu w 0,5 ml (0,5 mg/ml).

Wegovy 0,5 mg roztwór do wstrzykiwań
Każda napreparowana strzykawka zawiera 0,5 mg semaglutydu w 0,5 ml (1 mg/ml).

Wegovy 1 mg roztwór do wstrzykiwań
Każda napreparowana strzykawka zawiera 1,0 mg semaglutydu w 0,5 ml (2 mg/ml).

Wegovy 1,7 mg roztwór do wstrzykiwań
Każda napreparowana strzykawka zawiera 1,7 mg semaglutydu w 0,75 ml (2,27 mg/ml).

Wegovy 2,4 mg roztwór do wstrzykiwań
Każda napreparowana strzykawka zawiera 2,4 mg semaglutydu w 0,75 ml (3,2 mg/ml).

- Inne substancje w tym leku to dwuwodny fosforan disodowy, chlorek sodu, kwas solny/wodorotlenek sodu (do regulacji pH), woda do wstrzykiwań. Zobacz także punkt 2 'Wegovy zawiera sól' dla informacji o sodzie.

Jak wygląda Wegovy i ile znajduje się w opakowaniu?

Wegovy to przezroczysty i bezbarwny roztwór do wstrzykiwań w napreparowanej strzykawce do jednorazowego użytku.

Każda strzykawka zawiera tylko jedną dawkę.

Wielkość opakowania: 4 napreparowane strzykawki.

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i producent wprowadzenie do obrotu i producent

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dania

Ta ulotka została ostatnio zatwierdzona w

Inne źródła informacji

Więcej informacji o tym leku jest dostępnych na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków: <http://www.ema.europa.eu>

Ulotka: informacja dla pacjenta

Wegovy

0,25 mg 0,5 mg 1 mg 1,7 mg 2,4 mg

Wegovy 0,25 mg roztwór do wstrzykiwań w napełnionej strzykawce

Wegovy 0,5 mg roztwór do wstrzykiwań w napełnionej strzykawce

Wegovy 1 mg roztwór do wstrzykiwań w napełnionej strzykawce

Wegovy 1,7 mg roztwór do wstrzykiwań w napełnionej strzykawce

Wegovy 2,4 mg roztwór do wstrzykiwań w gotowym do użycia penie

Semaglutyd

Stosuj Wegovy raz w tygodniu

Instrukcje dotyczące stosowania Wegovy

Ważne informacje przed rozpoczęciem

Opakowanie zawiera jedną ulotkę i cztery gotowe do użycia peny Wegovy.

Ta część ulotki dotyczy użycia peny. Więcej informacji o leku znajdziesz na drugiej stronie tej ulotki.

Każdy pen jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

Jest dostarczany z:

- jedną wcześniej ustawioną dawką;
- osłoną igły, która ukrywa wbudowaną igłę przed, w trakcie i po użyciu;
- automatycznym mechanizmem dawkowania, który uruchamia się, gdy osłona igły zostanie przyciśnięta do skóry, zgodnie z instrukcją lekarza lub pielęgniarki.

Podczas wstrzykiwania dawki w okienku pena pojawi się żółty pasek. Nie zdejmuj pena ze skóry, dopóki żółty pasek się nie zatrzyma. Jeśli to zrobisz, automatyczne podawanie będzie kontynuowane, ale możesz nie otrzymać pełnej dawki.

Osłona igły zostaje zablokowana, gdy pena zostanie usunięty ze skóry. Nie można przerwać wstrzykiwania i kontynuować później.

Osoby niewidome lub niedowidzące nie powinny używać pena Wegovy bez pomocy osoby przeszkolonej w jego używaniu.

Zawsze przestrzegaj tych instrukcji użytkowania oraz wszelkich wskazówek lekarza lub pielęgniarki.

Jak używać Wegovy

1. Przygotowanie wstrzyknięcia.

Sprawdź swój pen Wegovy i upewnij się, że masz swój pen nnie używać, jeśli:

1. data ważnościupłynęła data ważności
2. wydaje się, że długopis był używany lub jest uszkodzony, na przykład jeśli upadł lub nie był przechowywany w odpowiedni sposób
3. lekwygląda mętnie.

Wybierz miejsce do wstrzyknięciamiejsce

Wybierz miejsce do wstrzyknięcia na jednej z części ciała, jak wskazano poniżej. Możesz wybrać ramiona, uda lub brzuch (zachowaj 5 cm odległości od pępka).Możesz wstrzykiwać co tydzień w tę samą część ciała, ale upewnij się, że nie używasz tego samego miejsca co poprzednio

2. Usuń nasadkę długopisu. Pociągnij nasadkę prosto z długopisu.

3. Wstrzyknij Wegovy.

Dociśnij długopis mocno do skóry, aż żółty pasek się zatrzyma.

Jeśli żółty pasek nie zaczyna się poruszać, dociśnij długopis mocniej do skóry.

Jak bezpiecznie obchodzić się z moim długopisem?

Aby uzyskać informacje o leku, można zapoznać się z drugą stroną tej ulotki.

Długopis jest przeznaczony do jednego podskórnego wstrzyknięcia Wegovy raz w tygodniu i jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez jedną osobę.

Zawsze zapoznaj się z instrukcjami na drugiej stronie tej ulotki i upewnij się, że lekarz lub pielęgniarka pokazali Ci, jak używać tych długopisów.

Zawsze zapoznaj się z instrukcjami na odwrocie tej ulotki i upewnij się, że twój lekarz lub pielęgniarka pokazał(a) ci, jak używać tych piór.

Zawsze przechowuj Wegovy poza zasięgiem dzieci. Ponadto trzymaj nasadkę pióra z dala od dzieci, aby zapobiec jej połknięciu.

Traktuj swoje pióro z należytą ostrożnością i nie narażaj go na wilgoć. Niewłaściwe obchodzenie się lub nieprawidłowe użycie może spowodować, że pióro dostarczy mniej niż pełną dawkę lub w ogóle jej nie dostarczy.

Trzymaj nasadkę na piórze, dopóki nie będziesz gotowy do wstrzyknięcia. Twoje pióro nie jest już sterylne, jeśli przechowujesz nieużywane pióro bez nasadki, jeśli zdejmiesz nasadkę i ponownie ją założysz lub jeśli nasadka jest nieobecna. Może to prowadzić do infekcji.

Przed użyciem ostrożnie obchodź się z piórem i nie dotykaj igły ani osłony igły. Ukryta igła może prowadzić do przypadkowego ukłucia.

Każde pióro zawiera jedną tygodniową dawkę i nie może być ponownie użyte. Wyrzuć je po użyciu.

Jak przechowywać moje nieużywane pióra?

Informacje na temat przechowywania piór znajdują się w sekcji 5 po drugiej stronie tej ulotki.

Jak mogę wyrzucić moje pióra?

Nie wylewaj leków do zlewu ani toalety i nie wyrzucaj ich do kosza. Zapytaj farmaceutę, co zrobić z lekami, których już nie używasz. Zostaną one zniszczone w odpowiedzialny sposób i nie trafią do środowiska.