

## Prospect: informații pentru pacient

Wegovy 0,25 mg soluție injectabilă în stilou preumplut  
Wegovy 0,5 mg soluție injectabilă în stilou preumplut  
Wegovy 1 mg soluție injectabilă în stilou preumplut  
Wegovy 1,7 mg soluție injectabilă în stilou preumplut  
Wegovy 2,4 mg soluție injectabilă în stilou preumplut  
semaglutid

Acest medicament este supus unei monitorizări suplimentare. Astfel, se poate stabili rapid informații noi de siguranță. Puteți contribui la aceasta raportând orice reacții adverse pe care le-ați putea experimenta. La sfârșitul secțiunii 4 citiți cum puteți face acest lucru.

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a utiliza acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să aveți nevoie de el mai târziu.
- Aveți întrebări? Contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală.
- Nu dați acest medicament altor persoane, deoarece este prescris doar pentru dumneavoastră. Poate fi dăunător pentru alții, chiar dacă au aceleași simptome ca dumneavoastră.
- Aveți o reacție adversă dintre cele menționate în secțiunea 4? Sau aveți o reacție adversă care nu este menționată în acest prospect? Contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală.

### Conținutul acestui prospect

1. Ce este Wegovy și pentru ce se utilizează acest medicament?
2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de atent?
3. Cum se utilizează acest medicament?
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează acest medicament?
6. Conținutul ambalajului și alte informații

### 1. Ce este Wegovy și pentru ce se utilizează acest medicament?

#### Ce este Wegovy?

Wegovy este un medicament pentru pierderea și controlul greutatei care conține substanța activă semaglutidă. Este similar cu un hormon natural numit „peptid-1 asemănător glucagonului” (GLP-1) care este eliberat din intestine după o masă. Acționează prin interacțiunea cu locuri (receptori) din creier care reglează apetitul, făcându-vă să vă simțiți sătul și mai puțin înfometat și reducând pofta de mâncare. Acest lucru vă va ajuta să mâncați mai puțin și să pierdeți în greutate. Wegovy poate ajuta, de asemenea, la prevenirea unei afecțiuni cardiace.

#### Pentru ce se utilizează acest medicament?

Wegovy este utilizat în combinație cu dietă și exerciții fizice pentru a pierde în greutate și a menține greutatea. Este utilizat la adulți cu un IMC de 30 kg/m<sup>2</sup> sau mai mare (obezitate) sau

un IMC de cel puțin 27 kg/m<sup>2</sup>, dar mai mic de 30 kg/m<sup>2</sup> (supraponderalitate) care au probleme de sănătate legate de greutate (cum ar fi diabet, hipertensiune arterială, niveluri anormale de grăsimi în sânge, dificultăți de respirație în timpul somnului numite „apnee obstructivă în somn” sau un istoric de atac de cord, accident vascular cerebral sau probleme vasculare).

IMC (Indicele de Masă Corporală) este o măsură a greutății în raport cu înălțimea corpului.

Wegovy este utilizat în combinație cu dietă și exerciții fizice pentru controlul greutății la tinerii de 12 ani și mai mari cu obezitate și greutate corporală > 60 kg.

Ca pacient tânăr cu vârsta între 12 și 18 ani, trebuie să continuați să utilizați Wegovy doar dacă după 12 săptămâni cu doza de 2,4 mg sau doza maxim tolerată (vezi secțiunea 3) IMC-ul dumneavoastră a scăzut cu cel puțin 5%. Contactați medicul înainte de a continua.

2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de precaut?

Când nu trebuie să utilizați acest medicament?

Sunteți alergic la oricare dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe le puteți găsi în secțiunea 6.

Când trebuie să fiți deosebit de atent cu acest medicament?

Contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală înainte de a utiliza acest medicament.

Utilizarea Wegovy nu este recomandată dacă:

- utilizați alte produse pentru pierderea în greutate;
- aveți diabet de tip 1;
- aveți o funcție renală sever redusă;
- aveți o funcție hepatică sever redusă;
- aveți insuficiență cardiacă severă;
- aveți o afecțiune oculară diabetică (retinopatie).

Există puțină experiență cu Wegovy la pacienții:

- de 85 de ani și mai în vârstă;
- cu probleme hepatice;
- cu probleme severe de stomac sau intestin care duc la o golire întârziată a stomacului (aceasta se numește gastropareză) sau cu o boală inflamatorie a intestinelor.

Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă una dintre situațiile menționate mai sus vi se aplică.

Dacă știți că trebuie să suferiți o operație în care veți fi ținut sub anestezie (adormit), spuneți medicului dumneavoastră că utilizați Wegovy.

Deshidratare

În timpul tratamentului cu Wegovy, puteți avea greață, vărsături sau diaree. Aceste efecte secundare pot provoca deshidratare (pierderea de lichide). Este important să beți mult pentru a preveni deshidratarea. Acest lucru este deosebit de important dacă

aveți probleme renale. Contactați medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări sau vă faceți griji.

#### Inflamația pancreasului

Contactați imediat un medic dacă aveți dureri severe și persistente în zona stomacului (vezi secțiunea 4). Aceasta poate indica un pancreas inflammat (pancreatită acută).

#### Persoane cu diabet de tip 2

Wegovy nu poate fi utilizat ca înlocuitor al insulinei. Nu utilizați Wegovy în combinație cu alte medicamente care conțin agoniști ai receptorilor GLP-1 (cum ar fi liraglutid, dulaglutid, exenatid sau lixisenatid).

#### Glicemie scăzută (hipoglicemie)

Dacă utilizați Wegovy împreună cu un derivat de sulfoniluree sau insulină, acest lucru poate crește riscul de glicemie scăzută (hipoglicemie). Consultați secțiunea 4 pentru semnele de avertizare ale glicemiei scăzute. Medicul dumneavoastră vă poate cere să vă monitorizați nivelurile de glicemie. Acest lucru va ajuta medicul să decidă dacă doza de derivat de sulfoniluree sau insulină trebuie ajustată pentru a reduce riscul de glicemie scăzută.

#### Afecțiune oculară diabetică (retinopatie)

Dacă aveți o afecțiune oculară cauzată de diabet și utilizați insulină, acest medicament poate duce la o deteriorare a vederii și poate necesita tratament. Îmbunătățirile rapide ale reglării glicemiei pot duce la o agravare temporară a unei afecțiuni oculare cauzate de diabet. Contactați medicul dumneavoastră dacă aveți o afecțiune oculară diabetică și experimentați probleme oculare în timp ce utilizați acest medicament.

#### Schimbări bruște ale vederii dumneavoastră

Dacă nu mai vedeți brusc sau vedeți mai puțin rapid în timpul tratamentului cu acest medicament, contactați imediat medicul pentru sfaturi. Acest lucru poate fi cauzat de un efect secundar foarte rar numit neuropatie optică ischemică anterioară non-arteritică (NAION) (vezi secțiunea 4: Reacții adverse grave). Medicul dumneavoastră vă poate trimite la un examen ocular și poate fi necesar să întrerupeți tratamentul cu acest medicament.

#### Copii și adolescenți până la 18 ani

Siguranța și eficacitatea Wegovy la copiii sub 12 ani nu au fost studiate, nu se recomandă utilizarea acestui medicament la acest grup de vârstă.

#### Utilizați și alte medicamente?

Utilizați, pe lângă Wegovy, și alte medicamente, ați făcut acest lucru recent sau există posibilitatea să utilizați alte medicamente în curând? Informați medicul, farmacistul sau asistenta medicală.

Contactați în special medicul, farmacistul sau asistenta medicală dacă utilizați medicamente care conțin următoarele:

warfarină sau alte medicamente administrate pe cale orală care reduc coagularea sângelui (anticoagulate orale). Când începeți tratamentul cu, de exemplu, warfarină sau medicamente similare, pot fi necesare teste de sânge mai frecvente pentru a testa capacitatea de coagulare a sângelui dumneavoastră.

### Sarcina și alăptarea

Acest medicament nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, deoarece nu se știe dacă este dăunător pentru copilul dumneavoastră nenăscut. Prin urmare, se recomandă utilizarea contracepției (metode contraceptive) în timpul utilizării acestui medicament. Dacă doriți să rămâneți însărcinată, trebuie să întrerupeți utilizarea acestui medicament cu cel puțin două luni înainte. Sunteți însărcinată, credeți că sunteți însărcinată sau doriți să rămâneți însărcinată în timp ce utilizați acest medicament? Contactați imediat medicul dumneavoastră, deoarece tratamentul dumneavoastră trebuie întrerupt.

Nu utilizați acest medicament dacă alăptați, deoarece nu se știe dacă ajunge în laptele matern.

### Aptitudinea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Wegovy probabil nu afectează capacitatea dumneavoastră de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Unii pacienți pot simți amețeli la utilizarea Wegovy, în special în primele 4 luni de tratament (vezi secțiunea 4). Dacă vă simțiți amețit, fiți deosebit de atent la conducerea vehiculelor și la utilizarea utilajelor. Pentru mai multe informații, contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală.

### Persoane cu diabet de tip 2

Dacă utilizați acest medicament în combinație cu un derivat de sulfoniluree sau insulină, puteți avea glicemie scăzută (hipoglicemie), ceea ce poate reduce capacitatea de concentrare. Evitați conducerea vehiculelor sau utilizarea mașinilor atunci când aveți simptome de glicemie scăzută. Consultați secțiunea 2 'Când trebuie să fiți deosebit de atent cu acest medicament?' pentru informații despre riscul crescut de glicemie scăzută și secțiunea 4 pentru simptomele de avertizare ale glicemiei scăzute. Contactați medicul dumneavoastră pentru mai multe informații.

### Wegovy conține sodiu

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol sodiu (23 mg) per doză, ceea ce înseamnă că este în esență 'fără sodiu'.

## 3. Cum utilizați acest medicament?

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Aveți îndoieli cu privire la utilizarea corectă? Atunci contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală.

### Cât de mult din acest medicament trebuie să utilizați?

#### Adulți

Doza recomandată este de 2,4 mg o dată pe săptămână.

Tratamentul dumneavoastră va începe cu o doză mică care va fi crescută treptat pe parcursul a 16 săptămâni de tratament.

Când începeți să utilizați Wegovy, doza inițială este de 0,25 mg o dată pe săptămână. Medicul dumneavoastră vă va oferi instrucțiuni pentru a vă crește doza treptat la fiecare 4 săptămâni până când ajungeți la doza recomandată de 2,4 mg o dată pe săptămână.

Când ați atins doza recomandată de 2,4 mg, nu trebuie să o creșteți mai departe.

Dacă aveți greață sau vărsături severe, discutați cu medicul dumneavoastră despre amânarea creșterii dozei sau despre reducerea la doza anterioară, până când simptomele se ameliorează.

De obicei, va trebui să respectați următorul tabel.

Creșterea dozei	Doza săptămânală
Săptămâna 1–4	0,25 mg
Săptămâna 5–8	0,5 mg
Săptămâna 9–12	1 mg
Săptămâna 13–16	1,7 mg
Începând cu săptămâna 17	2,4 mg

Medicul dumneavoastră va monitoriza regulat tratamentul dumneavoastră.

Adolescenți (peste 12 ani)

Pentru adolescenți se aplică același regim de creștere a dozei ca și pentru adulți (vezi mai sus). Doza trebuie crescută până la 2,4 mg (doza de întreținere) sau până la atingerea dozei maxime tolerate. Dozele mai mari de 2,4 mg pe săptămână nu sunt recomandate.

Cum se administrează acest medicament?

Wegovy se administrează ca o injecție subcutanată. Nu injectați în venă sau mușchi.

Cele mai bune locuri pentru a face injecția sunt partea din față a brațului superior, coapsele sau abdomenul.

Înainte de a folosi stiloul pentru prima dată, lăsați medicul, farmacistul sau asistenta să vă arate cum să folosiți stiloul.

Instrucțiuni detaliate despre utilizarea stiloului le găsiți pe cealaltă parte a acestui prospect.

Persoane cu diabet de tip 2

Informați medicul dacă aveți diabet de tip 2. Medicul dumneavoastră poate ajusta doza medicamentelor pentru diabet pentru a preveni hipoglicemia.

Când utilizați acest medicament?

Utilizați acest medicament o dată pe săptămână, dacă este posibil, în fiecare săptămână în aceeași zi.

Vă puteți injecta în orice moment al zilei - independent de mese.

Dacă este necesar, puteți schimba ziua injecției săptămânale a acestui medicament, atâta timp cât au trecut cel puțin 3 zile de la ultima injecție a acestui medicament. După selectarea unei noi zile de administrare, administrarea trebuie continuată o dată pe săptămână.

Ați utilizat prea mult din acest medicament?

Contactați imediat medicul dumneavoastră. Puteți avea reacții adverse, cum ar fi greață, vărsături sau diaree, ceea ce poate duce la deshidratare (pierderea de lichide).

Ați uitat să utilizați acest medicament?

Dacă uitați să injectați o doză și:

au trecut 5 zile sau mai puțin de când ar fi trebuit să utilizați Wegovy, utilizați-l imediat ce vă amintiți. Apoi injectați următoarea doză ca de obicei în ziua planificată.

au trecut mai mult de 5 zile de când ar fi trebuit să utilizați Wegovy, săriți doza uitată.

Apoi injectați următoarea doză ca de obicei în ziua planificată.

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa o doză uitată.

Dacă încetați să utilizați acest medicament

Nu întrerupeți utilizarea acestui medicament fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

Aveți alte întrebări despre utilizarea acestui medicament? Contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală.

#### 4. Reacții adverse posibile

Ca orice medicament, și acest medicament poate avea reacții adverse, deși nu toată lumea le experimentează.

##### Reacții adverse grave

Frecvent (apar la mai puțin de 1 din 10 utilizatori)

Complicații ale afecțiunilor oculare cauzate de diabet (retinopatie diabetică). Dacă aveți diabet, informați medicul dacă aveți probleme oculare în timpul tratamentului cu acest medicament, cum ar fi modificări ale vederii.

Uneori (apar la mai puțin de 1 din 100 de utilizatori)

Inflamația pancreasului (pancreatită acută). Simptomele unei inflamații a pancreasului includ dureri severe și de lungă durată în stomac, care pot iradia către spate. Trebuie să contactați imediat medicul dumneavoastră dacă experimentați aceste simptome.

Rareori (apar la mai puțin de 1 din 1.000 de utilizatori)

Reacții alergice severe (reacții anafilactice, angioedem). Solicitați imediat ajutor medical și informați medicul dumneavoastră cât mai curând posibil dacă aveți simptome precum dificultăți de respirație, umflături, senzație de amețeală, ritm cardiac rapid, transpirație și pierderea cunoștinței sau umflături rapide sub piele în locuri precum fața, gâtul, brațele și picioarele, care pot fi amenințătoare pentru viață dacă umflarea gâtului blochează căile respiratorii.

Foarte rar (apar la mai puțin de 1 din 10.000 de utilizatori)

o afecțiune medicală a ochiului numită neuropatie optică ischemică anterioară non-arteritică (NAION) care poate face ca, fără nicio durere, să vedeți mai puțin sau deloc cu unul dintre ochi. Contactați imediat medicul dumneavoastră dacă observați că nu mai vedeți brusc sau vedeți mai puțin treptat (vezi secțiunea 2: 'Schimbări bruște în vederea dumneavoastră').

Necunoscut (nu poate fi determinat cu datele disponibile)

Obstrucția intestinelor. O formă severă de obstrucție cu simptome precum dureri abdominale, balonare, vărsături, etc.

##### Alte reacții adverse

Foarte frecvent (apar la mai mult de 1 din 10 utilizatori)

dureri de cap  
greață  
vărsături  
diaree  
constipație (obstipație)  
dureri abdominale  
senzație de slăbiciune sau oboseală

- acestea apar în special în timpul creșterii dozei și de obicei dispar după un timp.

Frecvent (apar la mai puțin de 1 din 10 utilizatori)

amețeală  
probleme gastrice sau dificultăți de digestie  
eructații  
formare de gaze (flatulență sau meteorism)  
senzație de balonare în stomac  
stomac inflammat (gastrită) - simptomele includ dureri de stomac, greață sau vărsături  
reflux sau arsuri la stomac - cunoscut și sub numele de boala de reflux gastroesofagian  
calculi biliari  
căderea părului  
reații la locul injectării  
mâncarea și băuturile au un gust diferit față de normal  
senzație de mai mult sau mai puțin în piele  
nivel scăzut de zahăr în sânge (hipoglicemie) la pacienții cu diabet de tip 2.

Semnele de avertizare ale unui nivel scăzut de zahăr în sânge pot apărea brusc. Acestea pot include: transpirație rece, piele rece și palidă, dureri de cap, ritm cardiac rapid, greață sau senzație de foame intensă, modificări ale vederii, senzație de somnolență sau slăbiciune, senzație de nervozitate, anxietate sau confuzie, dificultăți de concentrare sau tremurături. Medicul dumneavoastră vă va spune cum să tratați nivelul scăzut de zahăr în sânge și ce să faceți dacă aveți aceste semne de avertizare.

Nivelul scăzut de zahăr în sânge este mai probabil să apară dacă utilizați și un derivat de sulfoniluree sau insulină. Medicul dumneavoastră poate reduce doza acestor medicamente înainte de a începe să utilizați acest medicament.

Uneori (apare la mai puțin de 1 din 100 de utilizatori)

tensiune arterială scăzută  
amețeli sau senzație de ușoară amețeală la ridicarea în picioare sau la așezarea în poziție verticală din cauza scăderii tensiunii arteriale  
ritm cardiac rapid  
creșterea enzimelor pancreatice (cum ar fi lipaza și amilaza) evidențiată în analizele de sânge  
alimentele rămân mai mult timp decât normal în stomac (întârzierea golirii stomacului).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă aveți reacții adverse, contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală. Acest lucru este valabil și pentru posibilele reacții adverse care nu sunt menționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin sistemul național de raportare menționat în anexa V. Prin raportarea reacțiilor adverse, ne puteți ajuta să obținem mai multe informații despre siguranța acestui medicament.

## 5. Cum se păstrează acest medicament?

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe eticheta stiloului și pe cutia de carton după EXP. Aceasta include o lună și un an. Ultima zi a acelei luni este data de expirare.

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). A nu se păstra la congelator. A se ține departe de elementul de răcire. Păstrați întotdeauna stiloul în ambalajul original pentru a-l proteja de lumină.

Wegovy poate fi păstrat nefrigiderat timp de maximum 28 de zile la o temperatură sub 30°C.

Aruncați stiloul dacă a fost expus la lumină sau la temperaturi peste 30°C, a fost mai mult de 28 de zile în afara frigiderului sau a fost congelat.

Nu utilizați acest medicament dacă observați că soluția nu este limpede și incoloră.

După utilizare: stiloul este pentru o singură utilizare și conține doar o doză. Aruncați stiloul după utilizare.

Nu aruncați medicamentele pe chiuvetă sau în toaletă și nu le aruncați la gunoi. Întrebați farmacistul ce să faceți cu medicamentele pe care nu le mai folosiți. Dacă eliminați medicamentele în mod corespunzător, acestea vor fi distruse în mod responsabil și nu vor ajunge în mediu.

## 6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce substanțe conține acest medicament?

- Substanța activă din acest medicament este semaglutida.

Wegovy 0,25 mg soluție injectabilă

Fiecare stilou preumplut conține 0,25 mg semaglutidă în 0,5 ml (0,5 mg/ml).

Wegovy 0,5 mg soluție injectabilă

Fiecare stilou preumplut conține 0,5 mg semaglutid în 0,5 ml (1 mg/ml).

Wegovy 1 mg soluție injectabilă

Fiecare stilou preumplut conține 1,0 mg semaglutid în 0,5 ml (2 mg/ml).

Wegovy 1,7 mg soluție injectabilă

Fiecare stilou preumplut conține 1,7 mg semaglutid în 0,75 ml (2,27 mg/ml).

Wegovy 2,4 mg soluție injectabilă

Fiecare stilou preumplut conține 2,4 mg semaglutid în 0,75 ml (3,2 mg/ml).

- Celelalte substanțe din acest medicament sunt dinatriumfosfat dihidrat, clorură de sodiu, acid clorhidric/hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru injecții. Vezi și secțiunea 2 'Wegovy conține sodiu' pentru informații despre sodiu.

Cum arată Wegovy și ce conține un ambalaj?

Wegovy este o soluție injectabilă clară și incoloră într-un stilou preumplut pentru o singură utilizare.

Fiecare stilou conține doar o doză.

Mărimea ambalajului de 4 stilouri preumplute.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricant Novo Nordisk A/S  
Novo Allé  
DK-2880 Bagsværd  
Danemarca

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în

Alte surse de informații

Mai multe informații despre acest medicament sunt disponibile pe site-ul web al Agenției Europene pentru Medicamente: <http://www.ema.europa.eu>

Prospect: informații pentru pacient

Wegovy

0.25 mg      0.5 mg                      1 mg              1.7 mg              2.4 mg

Wegovy 0,25 mg soluție pentru injecție într-un stilou preumplut

Wegovy 0,5 mg soluție pentru injecție într-un stilou preumplut

Wegovy 1 mg soluție pentru injecție într-un stilou preumplut

Wegovy 1,7 mg soluție pentru injecție într-un stilou preumplut

Wegovy 2,4 mg soluție pentru injecție într-un stilou preumplut

Semaglutid

Utilizați Wegovy o dată pe săptămână

Instrucțiuni pentru utilizarea Wegovy

Informații importante înainte de a începe

Ambalajul conține un prospect și patru stilouri preumplute Wegovy.

Această parte a prospectului se referă la utilizarea stiloului. Consultați cealaltă parte a acestui prospect pentru mai multe informații despre medicamentul dumneavoastră.

Fiecare stilou este destinat exclusiv pentru o singură utilizare.

Este livrat cu:

- o doză prestabilită;
- un protector de ac care ascunde acul încorporat înainte, în timpul și după utilizare;
- un mecanism automat de dozare care pornește atunci când protectorul de ac este apăsat pe pielea dumneavoastră, așa cum v-a explicat medicul sau asistenta.

În timpul injectării dozei, o bară galbenă va fi vizibilă în fereastra stiloului. Nu îndepărtați stiloul de pe piele până când bara galbenă nu se oprește. Dacă faceți acest lucru, administrarea automată va continua, dar este posibil să nu primiți întreaga doză.

Protectorul de ac se blochează când stiloul este îndepărtat de pe pielea dumneavoastră. Nu puteți opri injecția și relua mai târziu.

Persoanele care sunt nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere nu trebuie să utilizeze stiloul Wegovy fără ajutorul unei persoane instruite în utilizarea Wegovy.

Respectați întotdeauna aceste instrucțiuni de utilizare și orice indicații ale medicului sau asistentei dumneavoastră.

Cum să utilizați Wegovy

#### 1. Pregătirea injecției.

Verificați stiloul dumneavoastră Wegovy și asigurați-vă că aveți stiloul dumneavoastră nutilizat ca:

1. data de expirarea expirat
2. pare că stiloul a fost utilizat sau este deteriorat, de exemplu, dacă a căzut sau nu a fost păstrat corect
3. medicamentul arată turbure. Alegeți locul de injectare

loc Alegeți un loc de injectare pe una dintre părțile corpului, așa cum este indicat mai jos. Puteți alege brațele superioare, coapsele sau abdomenul (păstrați o distanță de 5 cm de buric).

Puteți injecta în fiecare săptămână în aceeași parte a corpului, dar asigurați-vă că nu folosiți același loc ca data trecută<sup>2</sup>. Scoateți capacul stiloului. Trageți capacul stiloului drept de pe stilou.

#### 3. Injectați Wegovy.

Apăsați stiloul ferm pe piele până când bara galbenă se oprește.

Dacă bara galbenă nu începe să se miște, apăsați stiloul mai ferm pe piele.

Cum să manipulez în siguranță stiloul meu?

Pentru informații despre medicamentul dumneavoastră, consultați cealaltă parte a acestui prospect.

Stiloul este pentru o singură injecție subcutanată de Wegovy o dată pe săptămână și este destinat utilizării de către o singură persoană.

Consultați întotdeauna instrucțiunile de pe cealaltă parte a acestui prospect și asigurați-vă că medicul sau asistenta v-a arătat cum să utilizați aceste stilouri.

Stiloul este pentru o singură injecție subcutanată de Wegovy o dată pe săptămână și este destinat exclusiv utilizării de către o singură persoană.

Consultați întotdeauna instrucțiunile de pe cealaltă parte a acestui prospect și asigurați-vă că medicul dumneavoastră sau asistenta v-a arătat cum să utilizați aceste stilouri.

Păstrați întotdeauna Wegovy departe de vederea și accesul copiilor. În plus, țineți capacul stiloului departe de copii pentru a preveni înghițirea acestuia.

Manipulați stiloul cu grijă și nu îl expuneți la umiditate. Manipularea necorespunzătoare sau utilizarea incorectă poate duce la administrarea unei doze incomplete sau la lipsa totală a dozei.

Păstrați capacul pe stilou până când sunteți gata să injectați. Stiloul dumneavoastră nu mai este steril dacă păstrați un stilou neutilizat fără capac, dacă scoateți capacul și îl puneți la loc sau dacă lipsește capacul. Acest lucru poate duce la o infecție.

Fiți atent la manipularea stiloului înainte de utilizare și nu atingeți acul sau protecția acului. Acul ascuns poate duce la înțepături accidentale.

Fiecare stilou conține o doză săptămânală și nu poate fi reutilizat. Aruncați-l după utilizare.

Cum îmi păstrez stilourile neutilizate?

Pentru informații despre păstrarea stilourilor, consultați secțiunea 5 de pe cealaltă parte a acestui prospect.

Cum pot arunca stilourile mele?

Nu aruncați medicamentele în chiuvetă sau toaletă și nu le aruncați la gunoi. Întrebați farmacistul ce să faceți cu medicamentele pe care nu le mai folosiți. Acestea vor fi distruse într-un mod responsabil și nu vor ajunge în mediu.