

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Xylocaine 100 mg/ml, Spray
Lidokaiin

Lugege hoolikalt kogu infoleht enne selle ravimi kasutamist, sest see sisaldab teile olulist teavet.

- Hoidke see infoleht alles. Teil võib seda hiljem vaja minna.
- Kas teil on veel küsimusi? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.
- Ärge andke seda ravimit teistele, sest see on määratud ainult teile. See võib olla teistele kahjulik, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.
- Kas teil tekib mõni kõrvaltoime, mis on loetletud jaotises 4? Või tekib teil kõrvaltoime, mida selles infolehes ei ole mainitud? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

Selle infolehe sisu

1. Mis on Xylocaine 100 mg/ml Spray ja milleks seda ravimit kasutatakse?
2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?
3. Kuidas seda ravimit kasutada?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas seda ravimit säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on Xylocaine 100 mg/ml Spray ja milleks seda ravimit kasutatakse?

See ravim kuulub kohalike tuimastite (lokaalanesteetikumide) rühma. See sisaldab lidokaiini, lühitoimelist amiiditüüpi lokaalanesteetikumi, millel on kiire toime algus.

Seda ravimit kasutatakse täiskasvanutel ja lastel alates 2. eluaastast:

- kõikidel juhtudel, kui on vaja kiiret limaskestast tuimastust, eriti kurgu-, nina- ja kõrvaoperatsioonidel, sünnitusabis, suukirurgias ja traumameditsiinis (traumatoloogias).
- valu, põletustunne, sügelus ja muud ebameeldivad aistingud (tunded) kaasnevad naha ja limaskestade haigustega.

2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?

Millal ei tohi te seda ravimit kasutada?

- Te olete allergiline selle ravimi mõne koostisosa suhtes. Neid aineid leiate selle pakendi infolehe jaotisest 6.
- Te olete allergiline teiste amiiditüüpi lokaalanesteetikumide suhtes.

Millal peate olema selle ravimiga eriti ettevaatlik?

- kui te kasutate ravimeid südame rütmihäirete vastu (vt ka jaotist 'Kas te kasutate veel teisi ravimeid?') ja kui teil on ainevahetushaigus porfüüria
- kui limaskestad piirkonnas, kus pihustit kasutatakse, on kahjustatud või kui selles piirkonnas on põletik
- kui teie kurk on selle ravimiga tuimestatud. Parem on mitte süüa ega juua enne, kui tuimestus on möödunud. Vastasel juhul võite lämbuda või hammustada oma keelt või põske, kuni suuõõs on veel tuimestatud.
- kui olete eakas patsient
- kui teie üldine seisund on halb
- kui olete tõsisel šokiseisundis
- kui teil on epilepsia
- kui teil on südame rütmihäired

- kui teil on südamepuudulikkus või muud probleemid südame ja veresoontega
- kui teil on maksa- või neerutalitluse häired
- kui on oht, et see ravim satub teie silma. Kui vedelik satub kogemata silma, tuleb silma kohe loputada veega või 0,9% naatriumkloriidi lahusega.

Võtke ühendust oma arsti või apteekriga enne selle ravimi kasutamist.

Kas te kasutate veel teisi ravimeid?

Kas te kasutate lisaks Xylocaine 100 mg/ml pihustile ka teisi ravimeid, olete seda hiljuti teinud või kavatsete seda peagi teha? Rääkige sellest oma arstile või apteekrile. See kehtib ka ravimite kohta, mille jaoks te ei vaja retsepti.

Seda ravimit tuleb ettevaatlikult kasutada, kui teid ravitakse ka teiste kohalike tuimastite või sarnase struktuuriga ravimitega (nagu mõned südame rütmihäirete ravimid). Teie arst võib vajada nende ravimite annuse kohandamist.

Millele peate tähelepanu pöörama söömisel ja joomisel?

Kui teie kurk on selle ravimiga tuimestatud, on parem mitte süüa ega juua enne, kui tuimestus on möödunud. Vastasel juhul võite lämbuda või hammustada oma keelt või põske, kuni suuõõs on veel tuimestatud.

Rasedus ja imetamine

Kas olete rase, arvate, et võite olla rase, soovite rasestuda või toidate last rinnaga? Võtke enne ravimite kasutamist ühendust oma arsti või apteekriga.

Teid võib selle ravimiga ravida raseduse ajal ja imetamise perioodil. Tavapärastes annustes ei ole tavaliselt lapsele ohtu.

Autojuhtimine ja masinate kasutamine

Selle ravimi kasutamine võib mõnel juhul ajutiselt mõjutada reaktsioonivõimet. Arvestage sellega, kui osalete liikluses.

Xylocaine 100 mg/ml pihusti sisaldab etanooli

See ravim sisaldab 24,1 mg alkoholi (etanooli) annuse kohta, mis vastab 241 mg/ml. See ravim võib kahjustatud nahal põhjustada põletustunnet.

3. Kuidas seda ravimit kasutada?

Arst manustab teile seda ravimit. Ta kohandab annust vastavalt protseduuri iseloomule, kestusele, teie vanusele ja füüsilisele seisundile.

Kas kahtlete õiges kasutamises? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Kasutamine täiskasvanutel

Soovitav annus on 1-20 pihustust. Maksimaalne annus sõltub protseduuri kestusest.

Kasutamine eakatel

Annused nõrgestatud või eakatel patsientidel peavad vastama nende füüsilisele seisundile.

Kasutamine lastel alates 12. eluaastast

Alla 25 kg kaaluvate laste puhul on maksimaalne annus väiksem ja see tuleb kohandada lapse kaalu ja füüsilise seisundi järgi.

Kasutamine lastel vanuses 2 kuni 12 aastat

Maksimaalne annus lastele tuleb arvutada mg/kg kehakaalu alusel. Xylocaine 100 mg/ml Spray kasutamisel söögitorus ja hingetorus on maksimaalne annus 3 mg/kg ning kasutamisel ninas, suus või kurgus ei tohi annus ületada 4-5 mg/kg.

Kasutamine alla 2-aastastel lastel

Alla 2-aastastele imikutele ja väikelastele ei sobi Xylocaine 100 mg/ml Spray ning soovitatakse vähem kontsentreeritud lidokaiinilahuseid.

Kas olete seda ravimit liiga palju kasutanud?

Sümptomid

Seda ravimit manustatakse tavaliselt operatsioonitoas või polikliiniku ravitoas. Teid jälgitakse hoolikalt. Üleannustamist ei ole oodata.

Kui siiski tekib üleannustamine, võite seda märgata järgmiste sümptomite järgi:

- haigutamine
- rahutus
- pearinglus
- iiveldus
- oksendamine
- raskused rääkimisel
- raskused kuulmisel
- raskused nägemisel
- tasakaalu või liigutuste koordineerimise häired.

Neid sümptomeid võivad järgneda teadvuse langus, jõu, hingamise sügavuse ja sageduse vähenemine ning kooma.

Kui olete saanud väga palju seda ravimit, võivad vähenenud südame kokkutõmbevõime ja aeglustunud juhtivus, (äkiline) madal vererõhk ja teadvusekaotus (kardiovaskulaarne kollaps), millele järgneb südameseiskus.

Mida peaksite siis tegema?

Teavitage kohe arsti.

Kas unustasite seda ravimit kasutada?

See ravim manustatakse tavaliselt operatsioonitoas või polikliiniku ravitoas. Ei ole oodata, et unustatakse teile seda ravimit manustada.

Kas kahtlete õiges kasutamises? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui lõpetate selle ravimi kasutamise

Pärast selle ravimi manustamist algab toime kiiresti ja tuimestav efekt kestab umbes 10-15 minutit (sõltuvalt manustatud kogusest). Kui tuimestus kaob, võite tunda valu seoses protseduuriga. Teie arst teavitab teid, kuidas sellisel juhul valu kõige paremini leevendada.

Kas teil on veel küsimusi selle ravimi kasutamise kohta? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu iga ravim, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid. Mitte kõigil ei esine neid. Kõrvaltoimed võivad esineda sagedamini või harvemini, kusjuures kehtivad järgmised määratlused:

Väga sageli esinev: Esineb rohkem kui 1-l kasutajal 10-st

Sageli esinev Esineb 1-l kuni 10-l kasutajal 100-st

Mõnikord esinev: Esineb 1-l kuni 10-l kasutajal 1 000-st
Harva esinev: Esineb 1 kuni 10-l 10 000-st kasutajast
Väga harva esinev: Esineb vähem kui 1-l 10 000-st kasutajast
Pole teada: Esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal määrata

Järgmised kõrvaltoimed on teatatud:

Mõnikord esinevad kõrvaltoimed

- ülitundlikkusreaktsioon

Pole teada

- raske allergiline reaktsioon teatud ainete suhtes, mille puhul esineb vererõhu järsk langus, kahvatus, rahutus, nõrk kiire pulss, niiske nahk ja teadvuse vähenemine äkilise tugeva veresoonte laienemise tagajärjel (anafülaktiline šokk)
- häälekaotus
- kähedus
- kurguvalu
- ärritus teie kehal kohas, kus seda ravimit kasutatakse.

Üleannustamise sümptomid, kui kehasse imendub tavapärasest rohkem toimeainet.

Kõrvaltoimete teatamine

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti või apteekriga. See kehtib ka kõrvaltoimete kohta, mida selles infolehes ei ole loetletud. Kõrvaltoimetest saate teatada ka Hollandi kõrvaltoimete keskuse Lareb kaudu, veebisait www.lareb.nl. Kõrvaltoimetest teatades aitate meil saada rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

5. Kuidas seda ravimit säilitada?

Säilitada alla 25°C. Temperatuuril alla 8 °C võib tekkida hägusus, mis toatemperatuuril kaob. Hoida püsti.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu. See on märgitud etiketil ja karbil pärast "EXP:". Seal on kuu ja aasta. Selle kuu viimane päev on kõlblikkusaja lõpp.

Ärge kasutage seda ravimit, kui märkate, et vedeliku värvus muutub või see muutub häguseks.

Ärge visake ravimeid kraanikaussi või tualetti ega prügikasti. Küsige oma apteekrilt, mida teha ravimitega, mida te enam ei kasuta. Kui te hävitate ravimeid õigesti, hävitatakse need õigesti ja need ei satu keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Millised ained on selles ravimis?

Selle ravimi toimeaine on: lidokaiinialus (100 mg/ml).

- Üks pihustus sisaldab 10 mg lidokaiinialust. Selle ravimi muud ained on: etanool (96%), makrogool 400, banaanimaitseaine (85509/H, Givaudan), levomentool, sahhariin, puhastatud vesi.
- Kuidas Xylocaine 100 mg/ml Spray välja näeb ja kui palju on pakendis?

Pihusti koosneb klaaspudelist doseerimispumbaga. Pakend sisaldab ka ühekordseks kasutamiseks mõeldud plastist doseerimisventiili.

Xylocaine pumbapihusti on saadaval 50 ml lahuse pakendites.

Iga pakend sisaldab umbes 500 pihustust.

Müügiloo hoidja

ja turule toomise eest vastutav isikturuleviimise ja
tehasant Registreerija/pakkija
Eureco-Pharma B.V.
Boelewerf 2,
2987 VD Ridderkerk

Tootja
Aspen Bad Oldesloe GmbH
Industriestraße 32-36
23843 Bad Oldesloe
Saksamaa

Registrisse kantud all
Xylocaine 100 mg/ml, Spray
RVG 127178//07831 L.V.H: Saksamaa

See toode on Saksamaal registreeritud nime all:
Xylocain Pumpspray, 10 mg/Sprühstoß

See pakendi infoleht on viimati heaks kiidetud aprillis 2024.

Järgmine teave on mõeldud ainult tervishoiutöötajatele:

ÜLDINE

Täieliku teabe saamiseks raseduse ja rinnaga toitmise, sõiduvõime ja masinate kasutamise võime mõjutamise, kõrvaltoimete, üleannustamise, farmakoloogiliste omaduste, säilivusaja, kasutusjuhendi ja töötlemisjuhiste kohta: vaadake SKP-teksti.

Seda teksti saab küsida Aspen Pharma Trading Limitedilt, tel. +31 207 095 007.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Xylocaine, pihusti sisaldab 100 mg lidokaiini milliliitri kohta.

Üks pihustus sisaldab 10 mg lidokaiinibaasi.

Täieliku abianete loetelu leiate SKP jaotisest 6.1.

KLIINILISED ANDMED Terapeutilised näidustused

Kõik juhud, kus on vaja kiiret ja usaldusväärset limaskesta tuimastust, eriti kõri-, nina- ja kõrvaoperatsioonide, sünnitusabi, suukirurgia ja traumatoloogia puhul.

Xylocaine 100 mg/ml Spray võib samuti profülaktiliselt ja terapeutiliselt kasutada valu, põletustunde, sügeluse ja muude ebameeldivate aistingutega kaasnevate naha ja limaskestade haiguste korral.

- Kõri-, nina- ja kõrvaoperatsioonides: Nina limaskesta anesteesia (nt. ülalõuaurkevalu punktsioon) ja neelu anesteesia (refleksi mahasurumiseks instrumentide sisestamisel).
- Sünnitusabis: Narkoosi asendamiseks sünnituse viimases faasis ja rebendite ning episiotomia haavade õmblemisel.

- Hambaarstiteaduses: Suu limaskestast anesteesia enne süstimist, hambakivi eemaldamist ja väikeste abstsesside sisselõikamist; kõri limaskestast anesteesia refleksi mahasurumiseks suuõõne jäljendite või röntgenpiltide tegemisel.
- Narkoosi ajal: Köha vältimiseks pärast intubatsiooni pindmise narkoosi all, larüngoskoopia, bronhoskoopia ja söögitoru skoopiat.

Xylocaine 100 mg/ml Spray on näidustatud kasutamiseks täiskasvanutel ja lastel alates 2. eluaastast.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Xylocaine spray on ette nähtud limaskestadele kandmiseks. Limaskestast pindmine anesteesia tekib 1-3 minuti jooksul, sõltuvalt manustamispiirkonnast, ja kestab eeldatavasti umbes 10-15 minutit. Nagu kõigi kohalike anesteetikumide puhul, tuleks kasutada minimaalset efektiivset annust, et vähendada võimalike kõrvaltoimete riski. Rakendatavate pihustuste arv sõltub tuimastatavast piirkonnast.

Järgnevad annustamissoovitused on juhiseks. Arsti kogemus ja patsiendi füüsilise seisundi tundmine on olulised vajaliku annuse arvutamisel. Iga pihusti pumpamine annab 10 mg Xylocaine baasi.

Enne manustamist ei ole vaja tuimastatavat piirkonda kuivatada.

Xylocaine 100 mg/ml Spray ei tohi kanda plastist valmistatud endotrahheaalsete torude (ETT) mansettidele (vt ka SKP jaotis 4.4).

Manustamispiirkond annus	Soovitav		Maksimaalne annus	Maksimaalne
	annus (mg)	lühiajaliseks ¹		
		protseduurideks		protseduurideks
		(mg)		
Nina limaskestast anesteesia	20 - 60	500		600
Suuõõne ja hambaravi	20 - 200	500	600	
Orofaarüms (nt. Gastrointestinaalne endoskoopia)	20 - 200	500		600
Intubatsioon hingamisteedesse (nt. larüngo-, trahheo- ja bronhoskoopia)	50 - 400	400		600
Protseduurid kõri, hingetoru ja bronhid	50 - 200	200 ³		400
Sünnitusabi ja günekoloogia	50 - 200	400		600

1. Lühikeste protseduuride korral manustatakse ravimit vähem kui minutiks
2. Pikemate protseduuride korral manustatakse rohkem kui 5 minutit
3. Ventilatsiooni korral tuleb annust vähendada

Maksimaalne annus varieerub ka manustamiskoha järgi, kuna lidokaiini imendumine sõltub manustamispiirkonnast ja on eriti suurem trahheas ja bronhides (vt SKP jaotis 5.2).

Eakad

Nõrgestatud või eakate patsientide annused peavad vastama nende füüsilisele seisundile.

Pediaatrilised patsiendid

Üle 12-aastased lapsed

Alla 25 kg kaaluvad alates 12-aastased lapsed tuleb doseerida vastavalt nende kaalule ja füüsilisele seisundile.

2 kuni 12-aastased lapsed

Laste maksimaalne annus tuleb arvutada mg/kg kehakaalu alusel. Xylocaine Spray kasutamisel kõri ja trahhea piirkonnas on maksimaalne annus 3 mg/kg ning nina, suu, orofarünksi piirkonnas ei tohi annus ületada 4–5 mg/kg.

Alla 2-aastased lapsed

Vastsündinutele ja alla 2-aastastele imikutele soovitatakse vähem kontsentreeritud lidokaiinilahuseid.

Manustamisviis

Kasutusjuhendi ja doseerimisventiili juhiste saamiseks vt SKP jaotis 6.6.

Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud abiainete suhtes.
- Tuntud ülitundlikkus amiiditüüpi lokaalanesteetikumide, nagu bupivakaiin, mepivakaiin ja prilokaiin, suhtes.

Erilised hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Patsiente, keda ravitakse III klassi antiarütmikumidega (nt amiodaroon), tuleb hoolikalt jälgida ja kaaluda EKG jälgimist, kuna võivad tekkida südamele lisanduvad toimed.

Kõrged annused või lühikesed intervallid annuste vahel võivad viia kõrgete plasmakontsentratsioonideni ja võimalike tõsiste kõrvaltoimeteni. Imendumine haavapindadelt ja limaskestadelt on suhteliselt kõrge, eriti bronhiaalpuus. Manustamine nendes piirkondades võib seetõttu viia kiiresti tõusvate või liiga kõrgete plasmakontsentratsioonideni, suurendades toksiliste mõjude, nagu krampid, riski. Lidokaiini spreid tuleb seetõttu ettevaatlikult kasutada patsientidel, kellel on kahjustatud limaskestad ja/või põletikud piirkonnas, kus spreid rakendatakse. Rakendamine kahjustatud limaskestadele viib suurenenud süsteemse imendumiseni. Tõsiste kõrvaltoimete ravis võivad olla vajalikud elustamisvahendid, hapnik ja muud elupäästvad ravimid (vt SKP lõik 4.9). Tuleb arvestada larüngoödeemi tekkimise võimalusega.

Üldanesteesias olevatel patsientidel võivad tekkida kõrgemad plasmakontsentratsioonid kui spontaanselt hingavatel patsientidel. Teadvusel olevad patsiendid neelavad suurema osa annusest, mis seejärel allub märkimisväärsele esmasele maksametabolismile pärast imendumist soolestikust.

Lokaalanesteetikumide kasutamine suu-neelu piirkonnas võib mõjutada neelamisprotsessi ja seega suurendada aspiratsiooni riski.

Keele või suu limaskesta tuimestus võib suurendada hammustuste riski. Selle riski vähendamiseks ei tohiks süüa enne, kui anesteetiline toime hakkab vähenema.

Kui kasutatud annus või manustamiskoht võib tõenäoliselt viia kõrgete lidokaiini vere tasemeteni, tuleb, nagu teiste lokaalanesteetikumide puhul, olla ettevaatlik:

- eakatel patsientidel ja patsientidel, kelle üldine seisund on halb,
- patsientidel, kes on tõsises šokiseisundis,
- epilepsia,

- patsientidel, kellel on kardiovaskulaarsed probleemid ja südamepuudulikkus,
- patsientidel, kellel on südame juhtivushäired (eriti osaline või täielik AV-blokk), bradükardia,
- patsientidel, kellel on tõsiselt kahjustatud maksafunktsioon,
- patsientidel, kellel on tõsiselt kahjustatud neerufunktsioon.
- Xylocaine 100 mg/ml Spray ei tohi kanda plastist valmistatud endotrahheaalsete torude (ETT) mansettidele. Kui lidokaiinibaas puutub kokku PVC või mitte-PVC materjaliga endotrahheaalsete torude mansettidel, võib see mansetti kahjustada. Need kahjustused kirjeldatakse kui väikseid auke, mis võivad põhjustada lekkeid, mille tõttu manseti rõhk võib langeda.

Xylocaine 100 mg/ml pihustit ei tohi kanda plastist valmistatud endotrahheaalsete torude (ETT) mansettidele. Kui lidokaiinibaas puutub kokku PVC või mitte-PVC materjaliga endotrahheaalsete torude mansettidel, võib see mansetti kahjustada. Neid kahjustusi kirjeldatakse kui väikeseid auke, mis võivad põhjustada lekkeid, mille tagajärjel võib manseti rõhk langeda.

Xylocaine 100 mg/ml Spray ei tohi silma pihustada. Kui vedelik satub kogemata silma, tuleb silma kohe loputada vee või 0,9% naatriumkloriidi lahusega.

Xylocaine 100 mg/ml Spray võib olla porfüriinogeenne, seetõttu tuleb enne porfüüriaga patsientide ravi pihustiga hoolikalt kaaluda, kas kasu kaalub üles riskid. Kõigi porfüüriaga patsientide puhul tuleb rakendada vajalikke ettevaatusabinõusid.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimete vormid
Lidokaiini tuleb ettevaatlikult kasutada patsientidel, kes kasutavad ka teisi lokaalanesteetikume või teisi aineid, mis on struktuurilt seotud amiiditüüpi lokaalanesteetikumidega. Näiteks antiarütmikumid nagu meksitiliin või tokainiid. Kuna süsteemsed toksilised toimed on aditiivsed, on üleannustamise oht.

Lidokaiini ja III klassi antiarütmikumide (nagu amiodaroon) spetsiifilisi koostoimeuuringuid ei ole läbi viidud, kuid patsientide ravimisel tuleb olla ettevaatlik (vt ka SPC rubriik 4.4).

Kui lidokaiini kasutatakse korduvalt suurtes annustes pikema aja jooksul, võivad ravimid, mis vähendavad lidokaiini kliirensit, nagu tsimetidiin või beetablokaatorid, põhimõtteliselt viia kliiniliselt olulise plasmakontsentratsiooni tõusuni. Seda ei ole oodata Xylocaine 100 mg/ml Spray lühiajalisel kasutamisel soovitatud annustes.

Sellised tegurid nagu atsidoos ja KNS stimulantide ning KNS-i pärssivate ainete kasutamine mõjutavad lidokaiini KNS-i taset, mis on vajalik avaliku süsteemse toime esilekutsumiseks.

FARMAKSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Etanool (96%)

Makrogool 400

Banaaniaroom (85509/H, Givaudan),

Levomentool

Sahhariin

Puhastatud vesi.

Sobimatusjuhtumid

Ei kohaldata.

Säilivusaeg

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu. See on märgitud etiketile ja karbile pärast "EXP:". Seal on kuu ja aasta. Selle kuu viimane päev on kõlblikkusaja lõpp. Erihoiatused säilitamisel

Hoida alla 25 °C. Alla 8°C säilitamisel võib tekkida hägusus, mis lahustub toatemperatuuril. Hoida püstises asendis.

Pakendi iseloomustus ja sisu ning muud juhised

Xylocaine 100 mg/ml Spray: karp klaaspudeliga, mis sisaldab 50 ml pihustamiseks mõeldud vedelikku (piisav umbes 500 pihustamiseks), sisaldab umbes 12 cm pikkust polüpropüleenist doseerimisventiili (otsik) ühekordseks kasutamiseks. Lühikesi otsikuid saab tellida eraldi. Vajadusel saab eraldi tellida karbi pikkade, steriilsete, ühekordsete otsikutega (50 tükki).

Erijuhised kõrvaldamiseks ja muud juhised

Doseerimisventiil (otsik) on juba kasutusvalmis ja otsiku kasutamiseks pole vaja täiendavaid toiminguid. Ärge kunagi lõigake doseerimisventiili ära, vastasel juhul kaob pihustamismehhanism.

Eemaldage pudelilt plastikkork ja libistage doseerimisventiil (otsik) pudelile. Nupu vajutamisel otsikul pihustatakse täpselt mõõdetud kogus vedelikku, mis sisaldab 10 mg lidokaiinibaasi.

Otsikuid ei tohi uuesti kasutada ja need tuleb kohe pärast kasutamist ära visata.

MÜÜGILOA HOIDJA

Registreerija/pakendaja:

Eureco-Pharma B.V.

Boelewerf 2

2987 VD Ridderkerk

MÜÜGILOA NUMBER(ID)

Xylocaine 100 mg/ml Spray on registreeritud numbriga RVG 127178/07831.

TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

See pakendi infoleht kiideti viimati heaks aprillis 2024.