

Packungsbeilage: Informationen für den Anwender

Xyloproct® 5%/0,275% Salbe
Lidocain, Hydrocortisonacetat

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, da sie wichtige Informationen enthält.

Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie sie später nochmals lesen.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an andere weiter. Es könnte ihnen schaden, auch wenn deren Krankheitszeichen dieselben sind wie Ihre.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was Xyloproct Salbe ist und wofür sie angewendet wird
2. Was Sie vor der Anwendung von Xyloproct Salbe wissen müssen
3. Wie ist Xyloproct Salbe anzuwenden
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Wie ist Xyloproct Salbe aufzubewahren
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was Xyloproct Salbe ist und wofür sie angewendet wird

Was Xyloproct Salbe ist

Der Name Ihres Arzneimittels ist ‚Xyloproct 5%/0,275% Salbe‘. Im Rest dieser Packungsbeilage wird es als ‚Xyloproct Salbe‘ bezeichnet.

Xyloproct Salbe enthält zwei Arzneimittel: Lidocain und Hydrocortison.

Lidocain (manchmal auch als Lignocain bekannt) gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die als Lokalanästhetika bezeichnet werden.

Hydrocortison gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die als Kortikosteroide bezeichnet werden.

Wofür Xyloproct Salbe verwendet wird

Xyloproct Salbe kann bei Erwachsenen und Kindern jeden Alters aus folgenden Gründen angewendet werden:

zur Linderung von Juckreiz um den After (Anus) oder die weiblichen Geschlechtsteile (Genitalien).

zur Linderung der Symptome von Hämorrhoiden und anderen Problemen, die den After betreffen. Diese Symptome umfassen Schmerzen und Entzündungen.

2. Was Sie vor der Anwendung von Xyloproct Salbe wissen müssen

Verwenden Sie Xyloproct Salbe nicht:

wenn Sie allergisch gegen Lidocain oder Hydrocortison oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind (siehe Abschnitt 6).

wenn Sie jemals eine allergische Reaktion auf andere Lokalanästhetika oder auf andere Kortikosteroid-Arzneimittel hatten.

wenn Sie eine Infektion an der Stelle haben, an der die Salbe aufgetragen werden soll, und die Infektion nicht behandelt wird.

wenn Sie nicht im Krankenhaus sind und Arzneimittel gegen einen unregelmäßigen Herzschlag (wie Amiodaron oder Sotalol) einnehmen.

Verwenden Sie Xyloproct Salbe nicht, wenn einer der oben genannten Punkte auf Sie zutrifft. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sprechen Sie vor der Anwendung von Xyloproct Salbe mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Xyloproct Salbe anwenden, wenn: Ihre Haut ist sehr dünn oder empfindlich an der Stelle, an der die Salbe aufgetragen werden soll.

Sie haben eine Infektion an der Stelle, an der die Salbe aufgetragen werden soll. Wenn dies auf Sie zutrifft, kann Ihr Arzt Sie bitten, ein anderes Medikament zusätzlich zur Xyloproct-Salbe zu verwenden.

Ihnen wurde jemals gesagt, dass Sie eine seltene Krankheit des Blutfarbstoffs namens 'Porphyrie' haben oder jemand in Ihrer Familie hat sie.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob einer der oben genannten Punkte auf Sie zutrifft, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Xyloproct-Salbe verwenden.

Andere Arzneimittel und Xyloproct-Salbe

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich eingenommen haben oder einnehmen könnten. Dies schließt Arzneimittel ein, die Sie ohne Rezept kaufen, sowie pflanzliche Arzneimittel. Dies liegt daran, dass Xyloproct-Salbe die Wirkung einiger Arzneimittel beeinflussen kann und einige Arzneimittel eine Wirkung auf Xyloproct-Salbe haben können.

Informieren Sie insbesondere Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eines der folgenden Arzneimittel einnehmen oder verwenden:

Arzneimittel gegen unregelmäßigen Herzschlag (wie Amiodaron oder Sotalol).

Andere Lokalanästhetika.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fruchtbarkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, glauben, schwanger zu sein oder planen, ein Baby zu bekommen, fragen Sie Ihren Arzt um Rat, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen. Ihr Arzt wird entscheiden, ob Sie Xyloproct-Salbe während dieser Zeit verwenden können.

Fahren und Bedienen von Maschinen

Es ist unwahrscheinlich, dass die Verwendung von Xyloproct-Salbe Ihre Fähigkeit zum Fahren oder Bedienen von Maschinen beeinträchtigt. Abhängig von der aufgetragenen Menge kann Xyloproct-Salbe jedoch vorübergehend Ihre Wachsamkeit und Koordination leicht beeinträchtigen. Wenn Sie betroffen sind, sollten Sie nicht fahren, Werkzeuge verwenden oder Maschinen bedienen.

Xyloproct-Salbe enthält Cetylalkohol und Stearylalkohol. Kann lokale Hautreaktionen verursachen (z.B. Kontaktdermatitis).

3. Wie man Xyloproct-Salbe verwendet

Verwenden Sie Xyloproct-Salbe immer genau so, wie Ihr Arzt es Ihnen gesagt hat. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht sicher sind. Waschen Sie immer Ihre Hände gut vor und nach der Anwendung dieses Arzneimittels.

Wie viel Xyloproct-Salbe zu verwenden ist

Ihr Arzt wird Ihnen sagen, wie viel Salbe Sie verwenden sollen und wie oft Sie sie verwenden sollen.

Normalerweise sollte die Salbe mehrmals täglich auf die betroffene Stelle aufgetragen werden.

Bis zu 6 g (Gramm) Salbe können täglich verwendet werden. Dies entspricht etwa einem Drittel einer Tube.

Wie lange Xyloproct Salbe angewendet werden soll

Xyloproct Salbe sollte nur für begrenzte Zeiträume angewendet werden.

Bei längeren Behandlungszeiträumen (bis zu 3 Wochen) kann Ihr Arzt vorschlagen, eine Behandlungspause einzulegen, insbesondere wenn Sie Reizungen um oder in dem Bereich bekommen, in dem die Salbe aufgetragen wird.

Wenn Sie Reizungen bekommen, kann Ihr Arzt einen Pflastertest durchführen, um festzustellen, ob diese durch Xyloproct Salbe verursacht werden.

Verwendung des Applikators

Die Salbe wird mit einem Applikator geliefert. Ihr Arzt wird Ihnen sagen, ob Sie diesen verwenden müssen.

Wenn Ihr Arzt Ihnen sagt, den Applikator zu verwenden, achten Sie darauf, nicht zu viel Salbe in den Enddarm einzuführen, insbesondere wenn sie einem Kind verabreicht wird. Reinigen Sie den Applikator nach jedem Gebrauch sehr gründlich.

Wenn Sie mehr Xyloproct Salbe verwenden, als Sie sollten

Wenn Sie zu viel Salbe verwenden, sprechen Sie so schnell wie möglich mit Ihrem Arzt. Es ist besonders wichtig, so schnell wie möglich mit Ihrem Arzt zu sprechen, wenn einem Kind zu viel Salbe gegeben wurde. Dies liegt daran, dass bei Kindern, die zu viel erhalten haben, manchmal Krampfanfälle aufgetreten sind.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Mögliche Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann dieses Arzneimittel Nebenwirkungen verursachen, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Beenden Sie die Anwendung von Xyloproct Salbe und sprechen Sie sofort mit Ihrem Arzt, wenn Sie eines der folgenden Symptome bemerken – Sie benötigen möglicherweise dringende medizinische Behandlung:

Plötzliches Auftreten von Hautausschlag, Juckreiz oder Nesselsucht auf der Haut.

Schwellung des Gesichts, der Lippen, der Zunge oder anderer Körperteile.

Atemnot, Keuchen oder Atembeschwerden.

Dies kann bedeuten, dass Sie eine allergische Reaktion haben.

Hören Sie auf, Xyloproct Salbe zu verwenden, und sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie eines der folgenden Symptome bemerken:

Schmerzen in Ihrem Enddarm.
Blutungen aus Ihrem Enddarm.

Andere mögliche Nebenwirkungen:

Rötung, Schwellung und Juckreiz an der Stelle, an der Xyloproct Salbe aufgetragen wurde.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker. Dies schließt alle möglichen Nebenwirkungen ein, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Yellow Card Scheme unter folgender Adresse melden: www.mhra.gov.uk/yellowcard. Durch das Melden von Nebenwirkungen können Sie dazu beitragen, mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels bereitzustellen.

5. Wie ist Xyloproct Salbe aufzubewahren

Bewahren Sie dieses Arzneimittel außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht nach dem Verfallsdatum, das auf der Tube nach EXP angegeben ist. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag dieses Monats.

Xyloproct Salbe kann zwischen 2°C und 8°C (im Kühlschrank) aufbewahrt werden. Wenn Sie die Salbe verwenden, kann die Tube bei Raumtemperatur (unter 25°C) bis zu 2 Monate aufbewahrt werden. Danach sollte die verbleibende Salbe entsorgt werden. Arzneimittel sollten nicht über Abwasser oder den Hausmüll entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie Sie Arzneimittel entsorgen können, die nicht mehr benötigt werden. Dies wird helfen, die Umwelt zu schützen.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Xyloproct Salbe enthält

Die Wirkstoffe sind Lidocain und Hydrocortisonacetat. Ein Gramm Xyloproct Salbe enthält 50 mg (Milligramm) Lidocain und 2,75 mg Hydrocortisonacetat.

Die sonstigen Bestandteile sind Zinkoxid, Aluminiumacetat, Stearylalkohol, Cetylalkohol, gereinigtes Wasser und Macrogol (3350 und 400).

Wie Xyloproct Salbe aussieht und Inhalt der Packung

Xyloproct Salbe ist weiß bis leicht gelblich. Sie kommt in einer Aluminiumtube, die 20 g (Gramm) der Salbe enthält. Jede Packung enthält ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt (Applikator).

Zulassungsinhaber

Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland
Tel: +44 (0)1 748 828 391

Hersteller

AstraZeneca AB, S-151 85, Södertälje, Schweden.

Oder

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Deutschland

Oder

Meribel Pharma Karlskoga AB Bjorkbornsvagen 5, Karlskoga, Örebro Län, 691 33, Schweden

Oder

AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2 NA, UK

Um dieses Merkblatt in Braille, Großdruck oder Audio anzuhören oder anzufordern, rufen Sie bitte kostenlos an:

0800 198 5000 (nur UK)

Bitte halten Sie folgende Informationen bereit:

Product name Xyloproct Salbe
Referenznummer 39699/0087

Dies ist ein Dienst des Royal National Institute of Blind People.

Dieses Merkblatt wurde zuletzt im August 2021 überarbeitet

Marken sind Eigentum der Aspen Group oder werden von dieser lizenziert. © 2021 Aspen Group of companies oder deren Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.