

Prospecto: Información para el usuario

Xyloproct® 5%/0.275% Pomada
lidocaína, acetato de hidrocortisona

Lea todo este prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento porque contiene información importante para usted.

Conserve este prospecto. Puede que necesite leerlo de nuevo.

Si tiene alguna pregunta adicional, consulte a su médico o farmacéutico.

Este medicamento ha sido recetado solo para usted. No lo pase a otras personas.

Puede perjudicarlas, incluso si sus síntomas son los mismos que los suyos.

Si experimenta cualquier efecto secundario, hable con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido de este prospecto:

1. Qué es Xyloproct Pomada y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de usar Xyloproct Pomada
3. Cómo usar Xyloproct Pomada
4. Posibles efectos secundarios
5. Cómo almacenar Xyloproct Pomada
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Xyloproct Pomada y para qué se utiliza

Qué es Xyloproct Pomada

El nombre de su medicamento es 'Xyloproct 5%/0.275% Pomada'. Se refiere como 'Pomada Xyloproct' en el resto de este prospecto.

La Pomada Xyloproct contiene dos medicamentos: lidocaína e hidrocortisona.

La lidocaína (a veces conocida como lignocaína) pertenece a un grupo de medicamentos llamados anestésicos locales.

La hidrocortisona pertenece a un grupo de medicamentos llamados corticosteroides.

Para qué se utiliza la Pomada Xyloproct

La Pomada Xyloproct puede ser utilizada en adultos y niños de todas las edades por las siguientes razones:

para aliviar el picor alrededor del ano o de las partes íntimas femeninas (genitales).

para aliviar los síntomas de las hemorroides y otros problemas que afectan al ano. Estos síntomas incluyen dolor e inflamación.

2. Lo que necesita saber antes de usar la Pomada Xyloproct

No use la Pomada Xyloproct:

si es alérgico a la lidocaína o hidrocortisona o a cualquiera de los otros ingredientes de este medicamento (enumerados en la sección 6).

si alguna vez ha tenido una reacción alérgica a otros anestésicos locales o a otros medicamentos corticosteroides.

si tiene una infección donde se va a aplicar la pomada y la infección no está siendo tratada.

si no está en el hospital y está tomando medicamentos para un latido cardíaco irregular (como amiodarona o sotalol).

No use la Pomada Xyloproct si alguna de las condiciones anteriores se aplica a usted. Si no está seguro, hable con su médico o farmacéutico antes de usar la Pomada Xyloproct.

Advertencias y precauciones

Hable con su médico o farmacéutico antes de usar la Pomada Xyloproct si:

Su piel es muy delgada o frágil donde se va a aplicar la pomada.

Tiene una infección donde se va a aplicar la pomada. Si esto se aplica a usted, su médico puede pedirle que use otro medicamento además de la Pomada Xyloproct.

Alguna vez le han dicho que tiene una enfermedad rara del pigmento sanguíneo llamada 'porfiria' o alguien en su familia la tiene.

Si no está seguro de si alguna de las situaciones anteriores se aplica a usted, hable con su médico o farmacéutico antes de usar la Pomada Xyloproct.

Otros medicamentos y la Pomada Xyloproct

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tomar cualquier otro medicamento. Esto incluye medicamentos que compra sin receta y medicamentos herbales. Esto se debe a que la Pomada Xyloproct puede afectar la forma en que funcionan algunos medicamentos y algunos medicamentos pueden afectar a la Pomada Xyloproct.

En particular, informe a su médico o farmacéutico si está tomando o usando alguno de los siguientes medicamentos:

Medicamentos para un ritmo cardíaco irregular (como amiodarona o sotalol).

Otros anestésicos locales.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o está planeando tener un bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Su médico decidirá si puede usar la Pomada Xyloproct durante este tiempo.

Conducción y uso de máquinas

Es poco probable que el uso de la Pomada Xyloproct afecte su capacidad para conducir o manejar maquinaria. Sin embargo, dependiendo de la cantidad aplicada, la Pomada Xyloproct puede afectar ligeramente su alerta y coordinación temporalmente. Si se ve afectado, no debe conducir, usar herramientas o manejar maquinaria.

La Pomada Xyloproct contiene alcohol cetílico y alcohol estearílico. Puede causar reacciones locales en la piel (por ejemplo, dermatitis de contacto).

3. Cómo usar la Pomada Xyloproct

Use siempre la Pomada Xyloproct exactamente como su médico le ha indicado. Consulte a su médico o farmacéutico si no está seguro. Lávese bien las manos antes y después de usar este medicamento.

Cuánta Pomada Xyloproct usar

Su médico le dirá cuánta pomada usar y con qué frecuencia usarla.

Por lo general, la pomada debe aplicarse en el área afectada varias veces al día.

Se pueden usar hasta 6 g (gramos) de ungüento cada día. Esto es aproximadamente un tercio de un tubo.

Cuánto tiempo usar el Ungüento Xyloproct

El Ungüento Xyloproct solo debe usarse por períodos de tiempo limitados.

Con períodos de tratamiento más largos (hasta 3 semanas), su médico puede sugerirle que haga una pausa en el tratamiento, especialmente si está experimentando irritación alrededor o dentro de donde se aplica el ungüento.

Si experimenta irritación, su médico puede realizar una prueba de parche para ver si está siendo causada por el Ungüento Xyloproct.

Uso del aplicador

El ungüento viene con un aplicador. Su médico le indicará si necesita usarlo.

Si su médico le indica que use el aplicador, tenga cuidado de no poner demasiado ungüento dentro del conducto anal, especialmente si se administra a un niño.

Limpie muy bien el aplicador después de cada uso.

Si usa más Ungüento Xyloproct del que debería

Si usa demasiado ungüento, hable con su médico lo antes posible.

Es particularmente importante hablar con su médico lo antes posible si a un niño se le ha administrado demasiado ungüento. Esto se debe a que a veces han ocurrido convulsiones en niños que han recibido demasiado.

Si tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos secundarios

Como todos los medicamentos, este medicamento puede causar efectos secundarios, aunque no todos los sufren.

Deje de usar el Ungüento Xyloproct y hable con su médico de inmediato si nota alguno de los siguientes: puede necesitar tratamiento médico urgente:

Aparición repentina de erupción, picazón o urticaria en la piel.

Hinchazón de la cara, labios, lengua u otras partes del cuerpo.

Dificultad para respirar, sibilancias o problemas para respirar.

Esto puede significar que está teniendo una reacción alérgica.

Deje de usar la pomada Xyloproct y hable con su médico si nota alguno de los siguientes síntomas:

Dolor en su zona anal.

Sangrado de su zona anal.

Otros posibles efectos secundarios:

Enrojecimiento, hinchazón y picazón donde se ha aplicado la pomada Xyloproct en su cuerpo.

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto secundario, hable con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este prospecto. También puede informar de los efectos secundarios directamente a través del Esquema de Tarjeta Amarilla en: www.mhra.gov.uk/yellowcard. Al informar sobre los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Cómo almacenar la pomada Xyloproct

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No use este medicamento después de la fecha de caducidad que se indica en el tubo después de EXP. La fecha de caducidad se refiere al último día de ese mes.

La pomada Xyloproct se puede almacenar entre 2°C y 8°C (en un refrigerador).

Cuando comience a usar la pomada, el tubo se puede almacenar a temperatura ambiente (por debajo de 25°C) durante un máximo de 2 meses. Cualquier pomada restante debe ser desechada.

Los medicamentos no deben desecharse a través de aguas residuales o residuos domésticos. Pregunte a su farmacéutico cómo desechar los medicamentos que ya no necesita. Esto ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del paquete y otra información

Qué contiene el Ungüento Xyloproct

Las sustancias activas son lidocaína y acetato de hidrocortisona. Cada gramo de Ungüento Xyloproct contiene 50 mg (miligramos) de lidocaína y 2.75 mg de acetato de hidrocortisona.

Los otros ingredientes son óxido de zinc, acetato de aluminio, alcohol estearílico, alcohol cetílico, agua purificada y macrogol (3350 y 400).

Cómo es el Ungüento Xyloproct y contenido del envase

El Ungüento Xyloproct es de color blanco a ligeramente amarillo. Viene en un tubo de aluminio que contiene 20 g (gramos) del ungüento. Cada envase contiene un dispositivo médico certificado CE (aplicador).

Titular de la Autorización de Comercialización

Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublín 24, Irlanda
Tel: +44 (0)1 748 828 391

Fabricante

AstraZeneca AB, S-151 85, Södertälje, Suecia.

○

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Alemania

○

Meribel Pharma Karlskoga AB Bjorkbornsvagen 5, Karlskoga, Orebro Lan, 691 33, Suecia

○

AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2 NA, Reino Unido

Para escuchar o solicitar una copia de este prospecto en Braille, letra grande o audio, por favor llame, sin cargo:

0800 198 5000 (solo Reino Unido)

Por favor, esté preparado para dar la siguiente información:

Product name Xyloproct Ointment
Número de referencia 39699/0087

Este es un servicio proporcionado por el Real Instituto Nacional de Personas Ciegas.

Este prospecto fue revisado por última vez en agosto de 2021

Las marcas registradas son propiedad de o están licenciadas al Grupo Aspen de empresas. © 2021 Grupo Aspen de empresas o su licenciante. Todos los derechos reservados.

Transtoyou