

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Xyloproct® 5%/0,275% salv
lidokaiin, hüdrokortisoonatsetaat

Lugege see infoleht hoolikalt läbi enne, kui hakkate seda ravimit kasutama, sest see sisaldab teile olulist teavet.

Hoidke see infoleht alles. Teil võib olla vaja seda uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

See ravim on määratud ainult teile. Ärge andke seda teistele. See võib neid kahjustada, isegi kui nende haigusnähud on samad kui teil.

Kui teil tekib mingeid kõrvaltoimeid, pidage nõu oma arsti või apteekriga. See hõlmab ka võimalikke kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole loetletud. Vt lõik 4.

Mis on selles infolehes:

1. Mis on Xyloproct salv ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Xyloproct salvi kasutamist
3. Kuidas Xyloproct salvi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Xyloproct salvi säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on Xyloproct salv ja milleks seda kasutatakse

Mis on Xyloproct salv

Teie ravimi nimi on 'Xyloproct 5%/0,275% salv'. Selles infolehes viidatakse sellele kui 'Xyloproct salv'.

Xyloproct salv sisaldab kahte ravimit: lidokaiini ja hüdrokortisooni.

Lidokaiin (mõnikord tuntud kui lignokaiin) kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse lokaalanesteetikumideks.

Hüdrokortisoon kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kortikosteroidideks.

Milleks Xyloproct salvi kasutatakse

Xyloproct salvi võib kasutada täiskasvanutel ja igas vanuses lastel järgmistel põhjustel: sügeluse leevendamiseks päraku või naiste suguelundite piirkonnas. hemorroidide (pärasoole veenilaiendite) ja teiste päraku piirkonda mõjutavate probleemide sümptomite leevendamiseks. Need sümptomid hõlmavad valu ja põletikku.

2. Mida on vaja teada enne Xyloproct salvi kasutamist

Ärge kasutage Xyloproct salvi:

kui olete allergiline lidokaiini, hüdrokortisooni või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes (loetletud lõigus 6).

kui teil on kunagi olnud allergiline reaktsioon teistele lokaalanesteetikumidele või teistele kortikosteroidravimitele.

kui teil on infektsioon kohas, kuhu salvi kavatakse panna, ja infektsiooni ei ravita.

kui te ei ole haiglas ja võtate ravimeid ebaregulaarse südamerütmi (näiteks amiodaroon või sotalool) korral.

Ärge kasutage Xyloproct salvi, kui mõni ülaltoodust kehtib teie kohta. Kui te pole kindel, rääkige enne Xyloproct salvi kasutamist oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige enne Xyloproct salvi kasutamist oma arsti või apteekriga, kui:

Teie nahk on väga õhuke või habras kohas, kuhu salvi kavatsetakse panna.

Teil on infektsioon kohas, kuhu salvi kavatsetakse panna. Kui see kehtib teie kohta, võib arst paluda teil kasutada lisaks Xyloproct salvile ka teist ravimit.

Teile on kunagi öeldud, et teil on haruldane verepigmentide haigus nimega 'porfüüria' või on see kellelgi teie peres.

Kui te pole kindel, kas mõni ülaltoodust kehtib teie kohta, rääkige enne Xyloproct salvi kasutamist oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Xyloproct salv

Öelge oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või võite võtta mingeid muid ravimeid. See hõlmab ravimeid, mida ostate ilma retseptita, ja taimseid ravimeid. Seda seetõttu, et Xyloproct salv võib mõjutada mõnede ravimite toimet ja mõned ravimid võivad mõjutada Xyloproct salvi.

Eelkõige öelge oma arstile või apteekrile, kui te võtate või kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

Ravimid ebaregulaarse südame töö jaoks (näiteks amiodaroon või sotalool).

Teised lokaalanesteetikumid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui olete rase või toidate last rinnaga, arvate, et võite olla rase või plaanite last saada, küsige enne selle ravimi võtmist nõu oma arstilt. Teie arst otsustab, kas saate Xyloproct salvi sellel ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinate kasutamine

On ebatõenäoline, et Xyloproct salvi kasutamine mõjutab teie võimet autot juhtida või masinaid käsitseda. Kuid sõltuvalt sellest, kui palju on peale kantud, võib Xyloproct salv ajutiselt veidi mõjutada teie erksust ja koordinatsiooni. Kui see juhtub, ei tohiks te autot juhtida, tööriistu kasutada ega masinaid käsitseda.

Xyloproct salv sisaldab tsetüülalkoholi ja stearüülalkoholi. Võib põhjustada kohalikke nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit).

3. Kuidas kasutada Xyloproct salvi

Kasutage Xyloproct salvi alati täpselt nii, nagu arst on teile öelnud. Kui te pole kindel, kontrollige oma arsti või apteekriga. Peske alati käed hästi enne ja pärast selle ravimi kasutamist.

Kui palju Xyloproct salvi kasutada

Teie arst ütleb teile, kui palju salvi kasutada ja kui tihti seda kasutada.

Tavaliselt tuleks salvi kanda kahjustatud alale mitu korda päevas.

Kuni 6 g (grammi) salvi võib kasutada iga päev. See on umbes kolmandik tuubist.

Kui kaua kasutada Xyloproct salvi

Xyloproct salvi tuleks kasutada ainult piiratud aja jooksul.

Pikemaajalise ravi korral (kuni 3 nädalat) võib arst soovitada ravi katkestamist, eriti kui tekib ärritus salvi pealekandmise piirkonnas või sees.

Kui tekib ärritus, võib arst teha plaastritesti, et näha, kas selle põhjustab Xyloproct salvi.

Aplikaatori kasutamine

Salviga on kaasas aplikaator. Arst ütleb teile, kas peate seda kasutama.

Kui arst ütleb, et peate aplikaatorit kasutama, olge ettevaatlik, et mitte panna liiga palju salvi pärasoolde, eriti kui seda antakse lapsele.

Puhastage aplikaator pärast iga kasutuskorda väga hoolikalt.

Kui kasutate rohkem Xyloproct salvi kui peaksite

Kui kasutate liiga palju salvi, rääkige oma arstiga nii kiiresti kui võimalik.

Eriti oluline on rääkida arstiga nii kiiresti kui võimalik, kui lapsele on antud liiga palju salvi.

See on oluline, sest lastel on mõnikord tekkinud krambid, kui neile on antud liiga palju.

Kui teil on selle ravimi kasutamise kohta lisaküsimusi, küsige oma arstilt või apteekrilt.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Xyloproct salvi kasutamine ja rääkige kohe oma arstiga, kui märkate mõnda järgmistest – võite vajada kiiret arstiabi:

Äkiline lööbe, sügeluse või nõgestõve teke nahal.

Näo, huulte, keele või teiste kehaosade turse.

Hingamisraskused, vilistav hingamine või hingamisprobleemid.

See võib tähendada, et teil on allergiline reaktsioon.

Lõpetage Xyloproct salvi kasutamine ja rääkige oma arstiga, kui märkate mõnda järgmistest:

Valulikkus päarakus.

Verejooks päarakust.

Muud võimalikud kõrvaltoimed:

Punetus, turse ja sügelus kohas, kuhu Xyloproct salvi on pandud.

Kõrvaltoimete teatamine

Kui teil tekib mingeid kõrvaltoimeid, rääkige oma arsti või apteekriga. See hõlmab kõiki võimalikke kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole loetletud. Kõrvaltoimetest saate teatada ka otse Kollase Kaardi skeemi kaudu aadressil: www.mhra.gov.uk/yellowcard. Kõrvaltoimetest teatamine aitab anda rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

5. Kuidas Xyloproct salvi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud tuubil pärast EXP. Kõlblikusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Xyloproct salvi võib hoida temperatuuril 2°C kuni 8°C (külmkapis).

Kui hakkate salvi kasutama, võib tuubi hoida toatemperatuuril (alla 25°C) kuni 2 kuud.

Seejärel tuleb ülejäänud salv ära visata.

Ravimeid ei tohi hävitada reovee või olmejäätmete kaudu. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei vaja. See aitab kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Xyloproct salv sisaldab

Toimeained on lidokaiin ja hüdrokortisoonatsetaat. Iga gramm Xyloproct salvi sisaldab 50 mg (milligrammi) lidokaiini ja 2,75 mg hüdrokortisoonatsetaati.

Muud koostisosad on tsinkoksiid, alumiiniumatsetaat, stearüülalkohol, tsetüülalkohol, puhastatud vesi ja makrogool (3350 ja 400).

Kuidas Xyloproct salv välja näeb ja pakendi sisu

Xyloproct salv on valge kuni kergelt kollaka värvusega. See on saadaval alumiiniumtuubis, mis sisaldab 20 g (grammi) salvi. Iga pakend sisaldab CE-sertifikaadiga meditsiiniseadet (aplikaatorit).

Müügiloa hoidja

Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Iirimaa
Tel: +44 (0)1 748 828 391

Tootja

AstraZeneca AB, S-151 85, Södertälje, Rootsi.

Või

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Saksamaa

Või

Meribel Pharma Karlskoga AB Björkbornsvägen 5, Karlskoga, Örebro Lan, 691 33, Rootsi

Või

AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2 NA,
Ühendkuningriik

Selle infolehe kuulamiseks või Braille'i kirjas, suures kirjas või helisalvestisena koopia saamiseks helistage tasuta numbril:

0800 198 5000 (ainult Ühendkuningriigis)

Palun olge valmis andma järgmist teavet:

Product name Xyloproct salv

Reference number 39699/0087

See on teenus, mida pakub Kuninglik Pimedate Inimeste Riiklik Instituut.

Seda infolehte uuendati viimati augustis 2021

Kaubamärgid kuuluvad Aspen Groupi ettevõtetele või on neile litsentsitud. © 2021 Aspen Groupi ettevõtteid või nende litsentsiandja. Kõik õigused kaitstud.