

Notice : Information pour l'utilisateur

Xyloproct® 5%/0,275% Pommade
lidocaïne, acétate d'hydrocortisone

Lisez attentivement cette notice avant de commencer à utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Conservez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Cela pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cela inclut tout effet indésirable possible non mentionné dans cette notice. Voir section 4.

Contenu de cette notice :

1. Qu'est-ce que la pommade Xyloproct et dans quel cas est-elle utilisée
2. Ce que vous devez savoir avant d'utiliser la pommade Xyloproct
3. Comment utiliser la pommade Xyloproct
4. Effets indésirables éventuels
5. Comment conserver la pommade Xyloproct
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que la pommade Xyloproct et dans quel cas est-elle utilisée

Qu'est-ce que la pommade Xyloproct

Le nom de votre médicament est « Xyloproct 5%/0,275% Pommade ». Il est désigné comme « Pommade Xyloproct » dans le reste de cette notice.

La Pommade Xyloproct contient deux médicaments : la lidocaïne et l'hydrocortisone.

La lidocaïne (parfois connue sous le nom de lignocaïne) appartient à un groupe de médicaments appelés anesthésiques locaux.

L'hydrocortisone appartient à un groupe de médicaments appelés corticostéroïdes.

À quoi sert la Pommade Xyloproct

La Pommade Xyloproct peut être utilisée chez les adultes et les enfants de tous âges pour les raisons suivantes :

pour soulager les démangeaisons autour du passage arrière (anus) ou des parties intimes féminines (organes génitaux).

pour soulager les symptômes des hémorroïdes et d'autres problèmes qui affectent le passage arrière. Ces symptômes incluent la douleur et l'inflammation.

2. Ce que vous devez savoir avant d'utiliser la Pommade Xyloproct

Ne pas utiliser la Pommade Xyloproct :

si vous êtes allergique à la lidocaïne ou à l'hydrocortisone ou à l'un des autres ingrédients de ce médicament (listés à la section 6).

si vous avez déjà eu une réaction allergique à d'autres anesthésiques locaux ou à d'autres médicaments corticostéroïdes.

si vous avez une infection à l'endroit où la pommade doit être appliquée et que l'infection n'est pas traitée.

si vous n'êtes pas à l'hôpital et que vous prenez des médicaments pour un rythme cardiaque irrégulier (comme l'amiodarone ou le sotalol).

Ne pas utiliser la Pommade Xyloproct si l'une des conditions ci-dessus s'applique à vous. Si vous n'êtes pas sûr, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser la Pommade Xyloproct.

Avertissements et précautions

Parlez à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser la Pommade Xyloproct si :

Votre peau est très fine ou fragile à l'endroit où la pommade va être appliquée.

Vous avez une infection à l'endroit où la pommade va être appliquée. Si cela s'applique à vous, votre médecin peut vous demander d'utiliser un autre médicament en plus de la pommade Xyloproct.

On vous a déjà dit que vous avez une maladie rare du pigment sanguin appelée 'porphyrie' ou quelqu'un dans votre famille en est atteint.

Si vous n'êtes pas sûr que l'une des situations ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser la pommade Xyloproct.

Autres médicaments et pommade Xyloproct

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre d'autres médicaments. Cela inclut les médicaments que vous achetez sans ordonnance et les médicaments à base de plantes. En effet, la pommade Xyloproct peut affecter le fonctionnement de certains médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur la pommade Xyloproct.

En particulier, informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou utilisez l'un des médicaments suivants :

Médicaments pour un rythme cardiaque irrégulier (comme l'amiodarone ou le sotalol).

Autres anesthésiques locaux.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou allaitez, pensez être enceinte ou envisagez d'avoir un bébé, demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament. Votre médecin décidera si vous pouvez utiliser la pommade Xyloproct pendant cette période.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que l'utilisation de la pommade Xyloproct affecte votre capacité à conduire ou à utiliser des machines. Cependant, selon la quantité appliquée, la pommade Xyloproct peut légèrement affecter votre vigilance et votre coordination temporairement. Si vous êtes affecté, vous ne devez pas conduire, utiliser des outils ou faire fonctionner des machines.

La pommade Xyloproct contient de l'alcool cétylique et de l'alcool stéarylique. Peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple, dermatite de contact).

3. Comment utiliser la pommade Xyloproct

Utilisez toujours la pommade Xyloproct exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien si vous n'êtes pas sûr. Lavez-vous toujours bien les mains avant et après l'utilisation de ce médicament.

Quelle quantité de pommade Xyloproct utiliser

Votre médecin vous indiquera la quantité de pommade à utiliser et la fréquence d'utilisation.

En général, la pommade doit être appliquée sur la zone affectée plusieurs fois par jour. Jusqu'à 6 g (grammes) de pommade peuvent être utilisés chaque jour. Cela représente environ un tiers d'un tube.

Combien de temps utiliser la pommade Xyloproct

La pommade Xyloproct ne doit être utilisée que pour des périodes limitées.

Pour des périodes de traitement plus longues (jusqu'à 3 semaines), votre médecin peut vous suggérer de faire une pause dans le traitement, surtout si vous ressentez une irritation autour ou à l'intérieur de la zone où la pommade est appliquée.

Si vous ressentez une irritation, votre médecin peut effectuer un test cutané pour voir si elle est causée par la pommade Xyloproct.

Utilisation de l'applicateur

La pommade est fournie avec un applicateur. Votre médecin vous dira si vous devez l'utiliser.

Si votre médecin vous dit d'utiliser l'applicateur, faites attention à ne pas mettre trop de pommade à l'intérieur du passage arrière, surtout si elle est administrée à un enfant. Nettoyez très bien l'applicateur après chaque utilisation.

Si vous utilisez plus de pommade Xyloproct que vous ne devriez

Si vous utilisez trop de pommade, parlez-en à votre médecin dès que possible.

Il est particulièrement important de parler à votre médecin dès que possible si un enfant a reçu trop de pommade. En effet, des convulsions ont parfois été observées chez des enfants ayant reçu une trop grande quantité.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets secondaires, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Arrêtez d'utiliser la pommade Xyloproct et parlez-en immédiatement à votre médecin si vous remarquez l'un des symptômes suivants – vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical urgent :

Apparition soudaine d'une éruption cutanée, de démangeaisons ou d'urticaire sur la peau.

Gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou d'autres parties du corps.

Essoufflement, sifflement ou difficulté à respirer.

Cela peut signifier que vous avez une réaction allergique.

Arrêtez d'utiliser la pommade Xyloproct et parlez à votre médecin si vous remarquez l'un des symptômes suivants :

Douleur dans votre passage arrière.

Saignement de votre passage arrière.

Autres effets secondaires possibles :

Rougeur, gonflement et démangeaisons à l'endroit où la pommade Xyloproct a été appliquée sur votre corps.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez des effets secondaires, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cela inclut tout effet secondaire possible non mentionné dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets secondaires directement via le système de carte jaune à : www.mhra.gov.uk/yellowcard. En signalant les effets secondaires, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conserver la pommade Xyloproct

Conservez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le tube après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

La pommade Xyloproct peut être conservée entre 2°C et 8°C (au réfrigérateur).

Lorsque vous commencez à utiliser la pommade, le tube peut être conservé à température ambiante (en dessous de 25°C) pendant 2 mois maximum. Toute pommade restante doit ensuite être jetée.

Les médicaments ne doivent pas être éliminés via les eaux usées ou les déchets ménagers. Demandez à votre pharmacien comment éliminer les médicaments qui ne sont plus nécessaires. Cela aidera à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient la pommade Xyloproct

Les substances actives sont la lidocaïne et l'acétate d'hydrocortisone. Chaque gramme de pommade Xyloproct contient 50 mg (milligrammes) de lidocaïne et 2,75 mg d'acétate d'hydrocortisone.

Les autres ingrédients sont l'oxyde de zinc, l'acétate d'aluminium, l'alcool stéarylique, l'alcool cétylique, l'eau purifiée et le macrogol (3350 et 400).

Aspect de la pommade Xyloproct et contenu de l'emballage

La pommade Xyloproct est de couleur blanche à légèrement jaune. Elle est conditionnée dans un tube en aluminium contenant 20 g (grammes) de pommade. Chaque emballage contient un dispositif médical certifié CE (applicateur).

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlande
Tél : +44 (0)1 748 828 391

Fabricant

AstraZeneca AB, S-151 85, Södertälje, Suède.

Ou

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Allemagne

Ou

Meribel Pharma Karlskoga AB Bjorkbornsvagen 5, Karlskoga, Orebro Lan, 691 33, Suède

Ou

AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2 NA,
Royaume-Uni

Pour écouter ou demander une copie de cette notice en braille, en gros caractères ou en audio, veuillez appeler gratuitement :

0800 198 5000 (Royaume-Uni uniquement)

Veuillez être prêt à fournir les informations suivantes :

Product name Xyloproct Ointment
Numéro de référence 39699/0087

Ce service est fourni par l'Institut Royal National des Aveugles.

Cette notice a été révisée pour la dernière fois en août 2021

Les marques sont détenues par ou sous licence du groupe Aspen. © 2021 Groupe Aspen ou son concédant. Tous droits réservés.