

Bipacksedel: Information till användaren

Xyloproct® 5%/0,275% Salva
lidokain, hydrokortisonacetat

Läs hela denna bipacksedel noggrant innan du börjar använda detta läkemedel eftersom den innehåller viktig information för dig.

Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om deras symtom är desamma som dina.

Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Vad denna bipacksedel innehåller:

1. Vad Xyloproct Salva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Xyloproct Salva
3. Hur du använder Xyloproct Salva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xyloproct Salva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Xyloproct Salva är och vad det används för

Vad Xyloproct Salva är

Namnet på din medicin är 'Xyloproct 5%/0,275% Salva'. Den kallas 'Xyloproct Salva' i resten av denna bipacksedel.

Xyloproct Salva innehåller två läkemedel: lidokain och hydrokortison.

Lidokain (ibland känt som lignokain) tillhör en grupp läkemedel som kallas lokalanestetika.

Hydrokortison tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider.

Vad Xyloproct Salva används för

Xyloproct Salva kan användas av vuxna och barn i alla åldrar av följande skäl:

för att lindra klåda runt ändtarmen (anus) eller kvinnliga könsdelar (genitalier).

för att lindra symtomen på hemorrojder och andra problem som påverkar ändtarmen.

Dessa symtom inkluderar smärta och inflammation.

2. Vad du behöver veta innan du använder Xyloproct Salva

Använd inte Xyloproct Salva:

om du är allergisk mot lidokain eller hydrokortison eller något av de andra innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot andra lokalanestetika eller mot andra kortikosteroidläkemedel.

om du har en infektion där salvan ska appliceras och infektionen inte behandlas.

om du inte är på sjukhus och du tar läkemedel för en oregelbunden hjärtrytm (såsom amiodaron eller sotalol).

Använd inte Xyloproct Salva om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Xyloproct Salva.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Xyloproct Salva om:

Din hud är mycket tunn eller skör där salvan ska appliceras.

Du har en infektion där salvan ska appliceras. Om detta gäller dig kan din läkare be dig använda en annan medicin tillsammans med Xyloproct salva.

Du har någonsin fått veta att du har en sällsynt sjukdom i blodpigmentet som kallas 'porfyri' eller någon i din familj har det.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Xyloproct salva.

Andra läkemedel och Xyloproct salva

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan komma att ta andra läkemedel. Detta inkluderar läkemedel som du köper utan recept och växtbaserade läkemedel. Detta beror på att Xyloproct salva kan påverka hur vissa läkemedel fungerar och vissa läkemedel kan påverka Xyloproct salva.

Särskilt, tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller använder något av följande läkemedel:

Läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm (såsom amiodaron eller sotalol).

Andra lokalanestetika.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare innan du tar detta läkemedel. Din läkare kommer att besluta om du kan använda Xyloproct salva under denna tid.

Körning och användning av maskiner

Det är osannolikt att användning av Xyloproct salva påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Beroende på hur mycket som appliceras kan dock Xyloproct salva tillfälligt påverka din vakenhet och koordination något. Om du påverkas bör du inte köra bil, använda verktyg eller hantera maskiner.

Xyloproct salva innehåller cetylalkohol och stearylalkohol. Kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

3. Hur man använder Xyloproct salva

Använd alltid Xyloproct salva exakt som din läkare har sagt till dig. Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Tvätta alltid händerna noggrant före och efter användning av detta läkemedel.

Hur mycket Xyloproct salva som ska användas

Din läkare kommer att tala om för dig hur mycket salva du ska använda och hur ofta du ska använda den.

Vanligtvis ska salvan appliceras på det drabbade området flera gånger om dagen.

Upp till 6 g (gram) salva kan användas varje dag. Detta är ungefär en tredjedel av en tub.

Hur länge man ska använda Xyloproct salva

Xyloproct salva bör endast användas under begränsade tidsperioder.

Vid längre behandlingsperioder (upp till 3 veckor) kan din läkare föreslå att du tar en paus från behandlingen, särskilt om du får irritation runt eller inuti där salvan appliceras. Om du får irritation kan din läkare göra ett lapptest för att se om det orsakas av Xyloproct salva.

Användning av applikatorn

Salvan kommer med en applikator. Din läkare kommer att tala om för dig om du behöver använda denna.

Om din läkare säger att du ska använda applikatorn, var försiktig så att du inte applicerar för mycket salva i ändtarmen, särskilt om det ges till ett barn.

Rengör applikatorn mycket noggrant efter varje användning.

Om du använder mer Xyloproct salva än du borde

Om du använder för mycket salva, kontakta din läkare så snart som möjligt.

Det är särskilt viktigt att kontakta din läkare så snart som möjligt om ett barn har fått för mycket salva. Detta eftersom kramper ibland har inträffat hos barn som fått för mycket.

Om du har ytterligare frågor om användningen av denna medicin, fråga din läkare eller apotekspersonal.

4. Möjliga biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, även om inte alla får dem.

Sluta använda Xyloproct salva och kontakta din läkare omedelbart om du märker något av följande – du kan behöva akut medicinsk behandling:

Plötsligt uppträdande av utslag, klåda eller nässelfeber på huden.

Svullnad i ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen.

Andnöd, väsande andning eller andningssvårigheter.

Detta kan innebära att du har en allergisk reaktion.

Sluta använda Xyloproct salva och kontakta din läkare om du märker något av följande:

Ömhet i ändtarmen.

Blödning från ändtarmen.

Andra möjliga biverkningar:

Rodnad, svullnad och klåda där Xyloproct salva har applicerats på kroppen.

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Yellow Card Scheme på: www.mhra.gov.uk/yellowcard. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra med mer information om säkerheten för detta läkemedel.

5. Hur du förvarar Xyloproct salva

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på tuben efter EXP.

Utgångsdatumet avser sista dagen i den månaden.

Xyloproct salva kan förvaras mellan 2°C och 8°C (i kylskåp).

När du börjar använda salvan kan tuben förvaras i rumstemperatur (under 25°C) i upp till 2 månader. Eventuell kvarvarande salva ska sedan kasseras.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga din apotekare hur du ska kassera läkemedel som inte längre behövs. Detta hjälper till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övrig information

Vad Xyloproct salva innehåller

De aktiva substanserna är lidokain och hydrokortisonacetat. Varje gram Xyloproct salva innehåller 50 mg (milligram) lidokain och 2,75 mg hydrokortisonacetat.

De övriga ingredienserna är zinkoxid, aluminiumacetat, stearylalkohol, cetylalkohol, renat vatten och makrogol (3350 och 400).

Hur Xyloproct salva ser ut och förpackningens innehåll

Xyloproct salva är vit till svagt gul i färgen. Den kommer i en aluminiumtub som innehåller 20 g (gram) av salvan. Varje förpackning innehåller en CE-märkt medicinteknisk produkt (applikator).

Innehavare av marknadsföringstillstånd

Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland

Tel: +44 (0)1 748 828 391

Tillverkare

AstraZeneca AB, S-151 85, Södertälje, Sverige.

Eller

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Tyskland

Eller

Meribel Pharma Karlskoga AB Björkbornsvagen 5, Karlskoga, Örebro Län, 691 33, Sverige

Eller

AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2 NA, Storbritannien

För att lyssna på eller begära en kopia av denna bipacksedel i punktskrift, stor stil eller ljud, ring kostnadsfritt:

0800 198 5000 (endast Storbritannien)

Var redo att ge följande information:

Product name Xyloproct salva

Referensnummer 39699/0087

Detta är en tjänst som tillhandahålls av Royal National Institute of Blind People.

Denna bipacksedel uppdaterades senast i augusti 2021

Varumärken ägs av eller är licensierade till Aspen Group of companies. © 2021 Aspen Group of companies eller dess licensgivare. Alla rättigheter förbehållna.

Transtoyou