

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Zopiclon Aurobindo 3,75 mg, filmdrasjerte tabletter

Zopiclon Aurobindo 7,5 mg, filmdrasjerte tabletter

zopiclon

Les hele pakningsvedlegget nøye før du begynner å bruke dette legemidlet, for det inneholder viktig informasjon for deg.

Oppbevar dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Har du flere spørsmål? Ta kontakt med legen din eller apoteket.

Ikke gi dette legemidlet til andre, da det kun er forskrevet til deg. Det kan være skadelig for andre, selv om de har samme symptomer som deg.

Får du bivirkninger som er nevnt i avsnitt 4? Eller får du bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget? Ta da kontakt med legen din eller apoteket.

Innholdet i dette pakningsvedlegget

1. Hva er Zopiclon Aurobindo og hva brukes det til?
2. Når skal du ikke bruke dette legemidlet eller må du være ekstra forsiktig?
3. Hvordan bruker du dette legemidlet?
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan oppbevarer du dette legemidlet?
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. HVA ER ZOPICLON AUROBINDO OG HVA BRUKES DET TIL?

Navnet på legemidlet ditt er Zopiclon Aurobindo 3,75 mg (eller 7,5 mg) filmdrasjerte tabletter (i dette pakningsvedlegget kalt zopiclon-tabletter eller "dette legemidlet"). Det tilhører en gruppe legemidler som kalles hypnotika. Det virker ved å påvirke hjernen din for å hjelpe deg med å sove.

Hos voksne:

Zopiclon, det aktive stoffet i dette legemidlet, brukes til behandling av søvnproblemer, slik som:

Vanskeligheter med å sovne

Våkne opp midt på natten

Våkne for tidlig

Alvorlige eller forstyrrende søvnproblemer som er forårsaket av ditt humør eller psykiske helseproblemer.

Dette legemidlet kan brukes både for midlertidige og langvarige søvnproblemer, men du bør ikke bruke dette legemidlet hver dag over lengre tid. Dette legemidlet skal heller ikke brukes til å behandle depresjon. Spør legen din om råd hvis du er i tvil.

2. NÅR SKAL DU IKKE BRUKE DETTE LEGEMIDLET ELLER MÅ DU VÆRE EKSTRA FORSIKTIG?

Når skal du ikke bruke dette legemidlet?

Du er allergisk mot zopiclon eller noen av stoffene i dette legemidlet. Disse stoffene finner du i avsnitt 6. Tegn på en allergisk reaksjon er: utslett, svelge- eller pusteproblemer, hevelse i lepper, ansikt, hals eller tunge

Hvis du har en av følgende tilstander:

- Alvorlig muskelsvakhet, dette kalles "myasthenia gravis" (en autoimmun sykdom)
- Alvorlige pusteproblemer (hvis du har pusteproblemer, er bevegelsen av luft inn og/eller ut av lungene hemmet og vanskeliggjort)
- Søvnapné syndrom (en søvnforstyrrelse med lange pauser mellom to åndedrag når du sover)
- Alvorlige leverproblemer
- Du har noen gang merket at du går i søvne eller viser annen merkelig oppførsel (som å kjøre bil, spise, ringe eller ha sex) mens du ikke er helt våken, etter å ha tatt Zopiclon Aurobindo.

Du er et barn eller ungdom under 18 år. Sikkerheten og effekten av zopiclon er ikke fastslått hos barn og ungdom under 18 år.

Ikke bruk dette legemidlet hvis noen av de ovennevnte punktene gjelder for deg. Hvis du er usikker, kontakt legen din eller apoteket før du tar dette legemidlet.

Når må du være ekstra forsiktig med dette legemidlet?

Kontakt legen din eller apoteket før du tar dette legemidlet:

Du har leverproblemer (se også avsnittet "Når skal du ikke bruke dette legemidlet?" ovenfor). Legen din kan måtte gi deg en lavere dose zopiclon.

Du har nyreproblemer. Legen din må kanskje gi deg en lavere dose zopiclon.

Du har milde pusteproblemer, legen din vil avgjøre om du skal få dette legemidlet (se også avsnittet "Når skal du ikke bruke dette legemidlet?" ovenfor).

Du har en historie med alkohol- eller narkotikamisbruk.

Du har fått høre av en lege at du har en personlighetsforstyrrelse.

Du har nylig brukt dette legemidlet eller andre lignende legemidler i mer enn 4 uker.

Du føler at du aldri vil kunne slutte å bruke dette legemidlet eller andre legemidler som brukes til å behandle søvnproblemer.

Før du tar dette legemidlet, er det viktig å sørge for at du kan sove minst 8 timer i strekk (uavbrutt) for å redusere risikoen for noen bivirkninger (se avsnitt 4).

Zopiclon Aurobindo kan forårsake søvngjengeri eller annen uvanlig atferd (som å kjøre bil, spise, ringe, ha sex osv.) mens du ikke er helt våken. Neste morgen kan du kanskje ikke huske at du har gjort noe om natten. Disse aktivitetene kan oppstå uavhengig av om du drikker alkohol eller bruker andre legemidler som gjør deg søvnnig sammen med Zopiclon Aurobindo.

Hvis du ikke er sikker på om noen av de ovennevnte punktene gjelder for deg, kontakt legen din eller apoteket før du tar dette legemidlet.

Dette legemidlet skal ikke brukes til behandling av depresjon. Hvis du også har depresjon, vil legen din fortelle deg om dette og foreskrive riktig behandling. Hvis depresjonen ikke behandles, kan den bli verre og ikke gå over, eller du kan ha større risiko for å begå selvmord.

Andre overveielser

Toleranse

Hvis du etter noen uker merker at tablettene ikke virker like godt som ved starten av behandlingen, bør du oppsøke legen din.

Avhengighet

Bruk av benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende stoffer kan føre til mental og fysisk avhengighet av disse midlene. Jo høyere dose og jo lengre behandlingen varer, desto større blir risikoen for avhengighet. Risikoen øker hos pasienter som tidligere har hatt alkohol- eller narkotikaproblemer og/eller hvis pasienter har en tydelig personlighetsforstyrrelse (mentale problemer).

Selvordstanker (du utvikler tanker om selvskading eller selvmord)

Risikoen for selvmord og selvmordsforsøk kan øke hos pasienter som behandles med benzodiazepiner eller hypnotika (beroligende og sovemidler, inkludert zopiclon). Hvis du merker at du utvikler tanker om selvskading eller selvmord, kontakt legen din umiddelbart eller gå direkte til et sykehus.

Avslutte behandlingen

Behandlingen må avsluttes gradvis (sakte, i trinn). Hvis behandlingen avsluttes, kan symptomene som førte til at du fikk dette legemidlet komme tilbake midlertidig i forsterket form. Det kan være ledsaget av andre reaksjoner, inkludert humørsvingninger, angst og rastløshet.

Korttidsminnetap (anterograd amnesi)

Dette legemidlet kan forårsake korttidsminnetap (du kan ikke huske ting som nylig har skjedd, anterograd amnesi). Dette skjer spesielt noen timer etter at du har tatt legemidlet. For å redusere denne risikoen, må du sørge for at du kan sove uavbrutt i 8 timer.

Tar du andre legemidler?

Tar du andre legemidler i tillegg til Zopiclon Aurobindo, har du nylig gjort det, eller er det en mulighet for at du vil ta andre legemidler i nær fremtid? Fortell det til legen din eller apoteket.

Dette gjelder også legemidler (inkludert urtemedisiner) som du kan få uten resept. Dette er fordi zopiclon kan påvirke virkningen av noen andre legemidler. Også noen legemidler kan påvirke hvordan zopiclon-tabletter virker.

Fortell legen din hvis du bruker noen av følgende legemidler.

Følgende legemidler kan forsterke effekten av zopiclon:

Legemidler mot psykose; psykiske lidelser med blant annet hallusinasjoner, tanker som ikke stemmer med virkeligheten og forvirring (antipsykotika)

Legemidler mot epilepsi (antiepileptika)

Legemidler for å roe ned eller redusere angst eller søvnproblemer (hypnotika)

Legemidler mot depresjon

Noen legemidler mot moderat til alvorlig smerte (narkotiske analgetika), som kodein, metadon, morfin, oksykodon, petidin eller tramadol

Legemidler brukt under operasjoner (anestetika)

Legemidler mot høysnue, utslett eller andre allergier. Disse legemidlene kan gjøre deg søvniq (beroligende antihistaminer), som klorfenamin eller prometazin.

Følgende legemidler kan øke sjansen for at du får bivirkninger når du tar dem med zopiclon-tabletter:

Noen antibiotika, som klaritromycin eller erytromycin

Noen legemidler for behandling av soppinfeksjoner, som ketokonazol og itrakonazol

Ritonavir, en proteasehemmer (brukt til å behandle AIDS).

For å redusere sjansen for dette, kan legen din bestemme seg for å redusere dosen av zopiclon-tabletter.

Følgende legemidler kan redusere effekten av zopiclon-tabletter:

Noen medisiner for epilepsi, som karbamazepin, fenobarbital og fenytoin

Rifampicin (et antibiotikum) – for behandling av infeksjoner

Produkter som inneholder johannesurt (urt som brukes til behandling av depresjon og humørsvingninger).

Samtidig bruk av zopiclon-tabletter og opioider (sterke smertestillende midler, legemidler for substitusjonsbehandling (hvis det er mangel på et bestemt stoff i kroppen, blir dette supplert) og noen legemidler mot hoste) øker risikoen for dødsighet, pusteproblemer (respirasjonsdepresjon), koma og kan være livstruende. Derfor bør samtidig bruk bare vurderes hvis ingen andre behandlinger er mulige.

Hvis legen din likevel foreskriver zopiclon-tabletter sammen med opioider, bør legen din holde dosen av den samtidige behandlingen så lav og varigheten av den samtidige behandlingen så kort som mulig.

Fortell legen din om alle opioide legemidler du bruker og følg doseringen legen din har foreskrevet så godt som mulig. Det kan være nyttig å informere venner eller familiemedlemmer om symptomene som er nevnt ovenfor. Kontakt legen din når du merker disse symptomene.

Hva bør du være oppmerksom på med alkohol?

Ikke drikk alkohol mens du bruker dette legemidlet. Alkohol kan forsterke effekten av dette legemidlet og dermed kan du falle i dyp søvn, slik at du ikke puster godt eller har vanskeligheter med å våkne.

Graviditet og amming

Er du gravid, tror du at du er gravid, ønsker du å bli gravid eller ammer du? Kontakt legen din før du bruker dette legemidlet.

Ikke bruk dette legemidlet i de siste 3 månedene av svangerskapet eller under fødselen, da dette kan være skadelig for barnet ditt.

Noen studier har vist en mulig økt risiko for leppe- og ganespalte (noen ganger kalt «hareskår») hos nyfødte babyer.

Hos det ufødte barnet kan redusert bevegelse og uregelmessig hjerterytme oppstå etter bruk av zopiclon i andre og/eller tredje trimester av svangerskapet.

Når Zopiclon Aurobindo brukes i den siste fasen av svangerskapet eller under fødselen, kan dette føre til muskelsvakhet, senking av kroppstemperaturen, problemer med mating og pusteproblemer (respirasjonsdepresjon) hos babyen din.

Ved regelmessig bruk av dette legemidlet i den siste fasen av svangerskapet kan babyen din utvikle fysisk avhengighet og risikere å få abstinenssymptomer, som uro (agitasjon) eller skjelving. I så fall må den nyfødte babyen overvåkes nøye i perioden etter fødselen.

Du må ikke ta dette legemidlet hvis du ammer. Zopiclon kan komme i små mengder i morsmelken. Hvis du ammer eller planlegger å amme, kontakt legen din eller apoteket før du tar et legemiddel.

Kjøring og bruk av maskiner

Som andre legemidler som brukes for søvnproblemer, kan zopiclon gjøre at du er mindre årvåken enn normalt (undertrykkelse av sentralnervesystemet). Risikoen for psykomotoriske begrensninger (styringen av bevegelser fra hjernen fungerer dårligere enn normalt), inkludert kjøreferdigheter, er større hvis:

- Du tar dette legemidlet innen 12 timer før du utfører aktiviteter som krever mental årvåkenhet

- Du tar mer enn den anbefalte dosen av dette legemidlet

- Du tar dette legemidlet mens du allerede bruker et annet legemiddel som demper sentralnervesystemet eller et annet legemiddel som øker mengden zopiclon i blodet ditt, eller mens du drikker alkohol.

Utfør ikke farlige aktiviteter som krever full mental årvåkenhet, som å kjøre et kjøretøy eller betjene maskiner etter bruk av dette legemidlet, og spesielt innen 12 timer etter inntak av legemidlet ditt.

Se avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget for mer informasjon om mulige bivirkninger som kan påvirke din evne til å kjøre.

Zopiclon Aurobindo inneholder laktose

Hvis legen din har fortalt deg at du ikke tåler visse sukkerarter, kontakt legen din før du tar dette legemidlet.

Zopiclon Aurobindo inneholder natrium

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per 3,75 mg/7,5 mg filmdrasjerte tablett, det vil si at det i hovedsak er "natriumfritt".

3. HVORDAN BRUKER DU DETTE LEGEMIDLET?

Behandlingen din med dette legemidlet bør være så kort som mulig og ikke vare lenger enn fire uker, inkludert perioden med gradvis nedtrapping.

Ta alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Er du i tvil om riktig bruk? Kontakt legen din eller apoteket.

Bruk av dette legemidlet

Ta dette legemidlet gjennom munnen

Svelg tablettene med en slurk vann

Ikke knus og ikke tygg tablettene dine

Ta riktig dose rett før sengetid i én gang og ikke ta det igjen samme natt

Vanligvis er behandlingsvarigheten 2 dager til 3 uker.

Voksne

Den anbefalte startdosen er 7,5 mg zopiclon rett før sengetid (to tabletter på 3,75 mg eller en tablett på 7,5 mg). Du må ikke ta mer enn denne dosen.

Eldre

Den vanlige startdosen er en zopiclon-tablett på 3,75 mg rett før sengetid. Legen din kan bestemme å øke dosen til en zopiclon-tablett på 7,5 mg hvis det er nødvendig.

Pasienter med lever-, puste- eller nyreproblemer

Den vanlige startdosen er en zopiclon-tablett på 3,75 mg rett før sengetid.

Bruk hos barn og ungdom

Dette legemidlet skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år. Sikkerheten og effekten av zopiclon hos barn og ungdom under 18 år er ikke fastslått.

Blodprøver

Dette legemidlet kan endre antall leverenzymmer i blodprøver. Dette kan bety at leveren din ikke fungerer som den skal.

Hvis du må ta en blodprøve, er det viktig å fortelle legen din at du bruker dette legemidlet.

Har du brukt for mye av dette legemidlet?

Hvis du har tatt for mange tabletter, kontakt umiddelbart legen din, apoteket eller legevakten på nærmeste sykehus for råd. Ta med pakningen av legemidlet slik at legen vet hva du har tatt.

Overdosering med dette legemidlet kan være svært farlig. Følgende effekter kan oppstå:

Være søvnig, forvirret, sove dypt og muligens falle i koma

Slappe muskler (hypotoni)

Føle seg svimmel, ør eller svak. Disse effektene er et resultat av lavt blodtrykk

Falle eller miste balansen (ataksi)

Overfladisk pusting eller problemer med å puste (respirasjonsdepresjon).

Har du glemt å bruke dette legemidlet?

Dette legemidlet skal kun tas ved sengetid. Har du glemt å ta tablettene ved sengetid, skal du ikke ta den på noe annet tidspunkt, ellers kan du føle deg søvnig, svimmel og forvirret på dagtid. Ikke ta en dobbel dose for å erstatte en glemt tablett.

Hvis du slutter å bruke dette legemidlet

Fortsett å bruke dette legemidlet til legen din sier at du skal stoppe. Ikke slutt brått med å bruke zopiclon, men fortell legen din hvis du ønsker å slutte. Legen din må redusere dosen din gradvis.

Hvis du plutselig slutter å bruke dette legemidlet, kan søvnproblemene dine komme tilbake, og du kan få et "abstinenssymptom". Hvis dette skjer, kan du oppleve noen av de følgende effektene. Kontakt lege umiddelbart hvis du får noen av de følgende bivirkningene:

- Å være engstelig, skjelvende, irritabel, opphisset (agiteret), forvirret eller få panikkanfall
- Svette
- Hodepine
- Raskere hjerterytme eller uregelmessig hjerterytme (hjerterbank)
- Et lavere bevissthetsnivå (mindre årvåken enn normalt) og problemer med konsentrasjon
- Mareritt, se eller høre ting som ikke er virkelige (hallusinasjoner)
- Være mer følsom for lys, lyd og berøring enn normalt
- Plutselig alvorlig forvirring (delirium)
- Nummenhet og prikking i hender og føtter
- Smertefulle muskler
- Mageproblemer.

I sjeldne tilfeller kan anfall (ukontrollerbare kroppsrykninger, ofte som en del av et epileptisk anfall (krampeanfall)) også forekomme.

Har du flere spørsmål om bruken av dette legemidlet? Ta kontakt med legen din eller apoteket.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan også dette legemidlet ha bivirkninger, selv om ikke alle får dem.

Stopp bruken av dette legemidlet og kontakt legen din umiddelbart hvis:

Du får en allergisk reaksjon. Symptomene kan være: utslett, svelge- eller pusteproblemer, hevelse i lepper, ansikt, hals eller tunge.

Fortell legen din så snart som mulig hvis du har noen av følgende bivirkninger:

Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 brukere)

Fortell legen din så snart som mulig hvis du har noen av følgende bivirkninger:

Dårlig hukommelse siden bruk av zopiclon (amnesi). Ved å sove uavbrutt i 7-8 timer etter å ha tatt zopiclon-tabletter, reduserer du risikoen for å få denne bivirkningen

Å se eller høre ting som ikke er ekte (hallusinasjoner)

Fall, spesielt hos eldre.

Ukjent (frekvens kan ikke bestemmes ut fra de tilgjengelige dataene)nd av de tilgjengelige data)

Å ha tanker som ikke samsvarer med virkeligheten (vrangforestillinger)

Føler seg mindreverdige eller trist (depressiv stemning).

Kontakt legen din eller apoteket hvis noen av følgende bivirkninger blir alvorlige eller varer lenger enn noen få dager:

Vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 10 brukere)

Bitter eller metallisk smak i munnen
Føler seg døsig eller søvnnig
Tørr munn.

Noen ganger (forekommer hos færre enn 1 av 100 brukere)

Kvalme eller oppkast
Føler seg svimmel
Hodepine
Mareritt
Mental eller fysisk tretthet
Opphisselse, uro (agitasjon).

Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 brukere)

Føler seg forvirret
Kløende hudutslett, elveblest (urtikaria)
Føler seg irritert eller aggressiv
Mindre lyst på sex enn normalt (nedsatt libido)
Vanskelig å puste eller kortpustet
Diaré.

Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10.000 brukere)

Alvorlig og livstruende hudutslett (Stevens-Johnson syndrom/toksisk epidermal nekrolyse)
Hudutslett med uregelmessige røde flekker (erythema multiforme).

Ukjent (frekvens kan ikke bestemmes ut fra tilgjengelige data)

Føler seg urolig eller sint
Føler seg svimmel eller har mindre kontroll over bevegelsene
Dobbeltsyn
Urolig eller ustø bevegelse
Muskelsvakhet
Fordøyelsesbesvær
Avhengighet av zopiclon (du blir avhengig)
Langsommere pust enn normalt (respirasjonsdepresjon)
Følelse av prikking, kløe eller kribling uten noen åpenbar grunn (parestesi)
Psykiske problemer, som dårlig hukommelse, vanskeligheter med å konsentrere seg, du kan ikke snakke normalt.

Søvnbilkjøring og annen merkelig oppførsel

Det er noen rapporter om at folk gjør ting i søvne som de ikke husker når de våkner etter å ha tatt et sovemiddel, inkludert søvnbilkjøring og søvngjengeri. Alkohol og noen medisiner mot depresjon eller angst kan øke sjansen for at denne alvorlige effekten oppstår.

Rapportering av bivirkninger

Får du bivirkninger, kontakt legen din eller apoteket. Dette gjelder også mulige bivirkninger som ikke er nevnt i denne pakningsvedlegget. Du kan også rapportere bivirkninger direkte via det

norske bivirkningssenteret Lareb (www.lareb.nl). Ved å rapportere bivirkninger kan du hjelpe oss med å få mer informasjon om sikkerheten til dette legemidlet.

5. HVORDAN OPPBEVARER DU DETTE LEGEMIDLET?

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen. Den står på esken eller blisterpakningen etter "Exp.". Det står en måned og et år. Den siste dagen i den måneden er utløpsdatoen.

For dette legemidlet er det ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Skyll ikke legemidler i vasken eller toalettet og kast dem ikke i søppelbøtten. Spør apoteket hva du skal gjøre med legemidler du ikke lenger bruker. De vil da bli destruert på en ansvarlig måte og ikke komme ut i miljøet.

6. INNHOLD AV PAKNINGEN OG ØVRIG INFORMASJON

Hvilke stoffer inneholder dette legemidlet?

Det virksomme stoffet i dette legemidlet er zopiclon.

[3,5 mg] Hver filmdrasjerte tablett inneholder 3,75 mg zopiclon.

[7,5 mg] Hver filmdrasjerte tablett inneholder 7,5 mg zopiclon.

De andre stoffene i dette legemidlet er:

Tablettkjerne: laktosemonohydrat, kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, pregelatinisert stivelse (maisstivelse), povidon (K-30), natriumstivelsesglykolat (Type A) og magnesiumstearat.

Tablettedrasjering: hypromellose (6cps), makrogol og titandioksid (E171).

Hvordan ser Zopiclon Aurobindo ut og hvor mye er det i en pakning?

Filmdrasjert tablett.

Zopiclon Aurobindo 3,75 mg, filmdrasjerte tabletter

Hvite, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter. Preget med "Z1" på den ene siden og helt flat på den andre siden.

Zopiclon Aurobindo 7,5 mg, filmdrasjerte tabletter

Hvite, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter. Preget med "Z & 2" adskilt av en delestrek på den ene siden. Den andre siden har også en delestrek. Tabletten kan deles i like doser.

Zopiclon Aurobindo 3,75 mg og 7,5 mg, filmdrasjerte tabletter er tilgjengelige i blisterpakninger og Zopiclon Aurobindo 7,5 mg, filmdrasjerte tabletter er også tilgjengelig i HDPE-flaske.

Pakningsstørrelser:

Blisterpakninger: 5, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60 og 90 filmdrasjerte tabletter.

HDPE-pakning:

7,5 mg: 500 filmdrasjerte tabletter (kun for legemiddeldistribusjonssystemer)

Ikke alle nevnte pakningsstørrelser markedsføres

Innehaver av markedsføringstillatelsen og produsent Innehaver av tillatelsen Aurobindo Pharma B.V.

Baarnsche Dijk 1
3741 LN Baarn

Produsent
APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate
BBG 3000, Birzebbugia
Malta

Arrow Generiques
26 avenue Tony Garnier
69007, Lyon Frankrike

Generis-Farmaceutica, S.A.
Rua Joao de Deus, n° 19
2700-487, Venda Nova, Amadora
Portugal

Registrert under:

Zopiclon Aurobindo 3,75 mg, filmdrasjerte tabletter - RVG 121122. Zopiclon Aurobindo 7,5 mg, filmdrasjerte tabletter - RVG 121124.

Dette legemidlet er registrert i EØS-landene under følgende navn:

Belgia: Zopiclone AB 7,5 mg filmdrasjerte tabletter
Tyskland: Zopiclon PUREN 3,75 mg/7,5 mg filmdrasjerte tabletter
Frankrike: Zopiclone Arrow Lab 3,75 mg filmdrasjert tablett Zopiclone Arrow Lab 7,5 mg delbar filmdrasjert tablett
Nederland: Zopiclon Aurobindo 3,75 mg/7,5 mg, filmdrasjerte tabletter
Polen: ApoDream

Denne pakningsvedlegget ble sist godkjent i mars 2023.