

Notice : information pour l'utilisateur

Zyban, comprimés à libération prolongée 150 mg

chlorhydrate de bupropion

Lisez attentivement toute la notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Conservez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Avez-vous des questions ? Contactez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ne donnez pas ce médicament à d'autres personnes, car il vous a été prescrit uniquement. Cela pourrait être dangereux pour d'autres personnes, même si elles présentent les mêmes symptômes que vous.
- Ressentez-vous un des effets indésirables mentionnés à la rubrique 4 ? Ou ressentez-vous un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans cette notice ? Contactez alors votre médecin ou votre pharmacien.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Zyban et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament ou devez-vous faire preuve de prudence ?
3. Comment utiliser ce médicament ?
4. Effets indésirables éventuels
5. Comment conserver ce médicament ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Zyban et dans quel cas est-il utilisé ?

Zyban est un médicament qui vous est prescrit pour vous aider à arrêter de fumer si vous êtes également motivé, par exemple en participant à un programme d'arrêt du tabac.

Zyban sera le plus efficace si vous êtes pleinement motivé pour arrêter de fumer. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien sur les traitements et autres soutiens pour vous aider à arrêter.

2. Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament ou devez-vous être particulièrement prudent ?

Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament ?

vous êtes allergique à l'une des substances contenues dans ce médicament. Vous trouverez ces substances à la rubrique 6 de cette notice
vous prenez d'autres médicaments contenant du bupropion (comme Wellbutrin XR pour traiter la dépression)
vous souffrez d'une affection provoquant des convulsions comme l'épilepsie ou vous avez des antécédents de convulsions

vous souffrez d'un trouble de l'alimentation, ou en avez souffert (par exemple boulimie ou anorexie mentale)

vous avez de graves problèmes hépatiques, comme une cirrhose du foie

vous avez une tumeur cérébrale

vous êtes habituellement un gros buveur qui a récemment arrêté ou envisage d'arrêter de boire pendant l'utilisation de Zyban

vous avez récemment arrêté de prendre des médicaments calmants ou des médicaments prescrits pour traiter l'anxiété (en particulier les benzodiazépines ou des médicaments similaires), ou vous envisagez d'arrêter de les prendre pendant que vous utilisez Zyban

vous avez un trouble bipolaire (variations extrêmes de l'humeur), car Zyban peut déclencher une crise de cette maladie

vous prenez des médicaments pour la dépression ou pour la maladie de Parkinson appelés inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), ou vous en avez pris au cours des 14 derniers jours. Cette période peut être plus courte pour certains types d'IMAO.

Votre médecin vous conseillera à ce sujet

→ Si l'un des facteurs ci-dessus s'applique à vous, informez immédiatement votre médecin et n'utilisez pas Zyban.

Quand devez-vous être particulièrement prudent avec ce médicament ?

Contactez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament. Cela est nécessaire, car certaines conditions de santé peuvent signifier que vous êtes plus susceptible de ressentir des effets secondaires (voir aussi rubrique 4).

Syndrome de Brugada

Si vous avez une maladie appelée syndrome de Brugada (un syndrome héréditaire rare qui affecte le rythme cardiaque) ou si un arrêt cardiaque ou une mort subite est survenu dans votre famille.

Enfants et adolescents jusqu'à 18 ans

Zyban n'est pas recommandé chez les personnes de moins de 18 ans.

Adultes

Convulsions (crises)

Il est connu que Zyban peut provoquer des convulsions (crises) chez environ 1 personne sur 1 000 (voir aussi "Prenez-vous d'autres médicaments ?" plus loin dans cette section et section 4 "Effets indésirables possibles" pour plus d'informations). Les convulsions sont plus susceptibles de se produire :

si vous consommez régulièrement beaucoup d'alcool

si vous avez un diabète nécessitant de l'insuline ou des comprimés

si vous avez eu une blessure grave à la tête ou des antécédents de traumatisme crânien (blessure à la tête)

Si l'un des facteurs ci-dessus s'applique à vous, n'utilisez pas Zyban à moins que vous n'ayez convenu avec votre médecin qu'il y a une raison impérieuse pour vous de l'utiliser.

Si vous avez une convulsion (crise) pendant le traitement :

→ arrêtez d'utiliser Zyban et contactez votre médecin.

Vous avez un risque accru d'effets indésirables :
si vous avez des problèmes de foie ou de reins
si vous avez plus de 65 ans

Vous devrez utiliser une dose plus faible (voir section 3) et vous devrez être bien surveillé pendant l'utilisation de Zyban.

Si vous avez eu des problèmes psychologiques...

Certaines personnes utilisant Zyban ont eu des hallucinations ou des délires (voir, entendre ou croire des choses qui n'existent pas), des pensées perturbées ou des changements d'humeur extrêmes. Ces effets sont plus susceptibles de se produire chez les personnes ayant déjà eu des problèmes psychologiques.

Si vous vous sentez déprimé ou avez des pensées suicidaires...

Certaines personnes deviennent dépressives lorsqu'elles essaient d'arrêter de fumer ; très rarement, elles peuvent penser à se suicider ou essayer de le faire. Ces symptômes affectent dans la plupart des cas les personnes qui utilisent Zyban au cours des premières semaines de traitement. Si vous vous sentez déprimé ou pensez au suicide :

→ Contactez immédiatement votre médecin ou rendez-vous directement à l'hôpital.

Si vous utilisez des médicaments contre la dépression ...

L'utilisation de ces médicaments avec Zyban peut entraîner le syndrome sérotoninergique, une affection potentiellement mortelle (voir « Utilisez-vous d'autres médicaments ? » dans cette section).

Hypertension artérielle et Zyban ...

Certaines personnes utilisant Zyban ont développé une hypertension artérielle qui doit être traitée. Si vous souffrez déjà d'hypertension, celle-ci peut s'aggraver. Le risque est plus élevé si vous utilisez également des patchs de nicotine pour vous aider à arrêter de fumer.

Votre tension artérielle devra être contrôlée avant d'utiliser Zyban. Pendant l'utilisation de Zyban, votre tension artérielle doit également être surveillée, en particulier si vous souffrez déjà d'hypertension. Si vous utilisez également des patchs de nicotine, votre tension artérielle doit être contrôlée chaque semaine. Si votre tension artérielle augmente, il peut être nécessaire d'arrêter d'utiliser Zyban.

Utilisez-vous d'autres médicaments ?

Utilisez-vous d'autres médicaments en plus de Zyban, y compris des médicaments que vous avez achetés sans ordonnance, l'avez-vous fait récemment ou allez-vous peut-être le faire bientôt ? Informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

Il peut y avoir un risque accru de convulsions par rapport à la normale :

si vous utilisez des médicaments pour la dépression ou d'autres problèmes psychiques (voir aussi la section

« Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament ? » au début de la section 2)

si vous utilisez de la théophylline pour l'asthme ou une maladie pulmonaire

si vous utilisez du tramadol, un analgésique puissant

si vous utilisez des médicaments contre le paludisme

si vous utilisez des médicaments stimulants ou d'autres médicaments pour contrôler votre poids ou votre appétit

si vous utilisez des stéroïdes (sauf les crèmes ou lotions pour les affections oculaires et cutanées)

si vous utilisez des antibiotiques appelés quinolones

si vous utilisez certains types d'antihistaminiques (principalement des médicaments contre les allergies) qui provoquent de la somnolence

si vous utilisez des médicaments contre le diabète

→ Si vous utilisez des médicaments de cette liste, contactez immédiatement votre médecin avant d'utiliser Zyban (voir « Certaines personnes doivent utiliser une dose plus faible » dans la rubrique 3).

Certains médicaments influencent l'action de Zyban ou peuvent augmenter le risque d'effets secondaires, y compris :

médicaments contre la dépression (comme la désipramine, l'imipramine, la paroxétine, le citalopram, l'escitalopram, la venlafaxine) ou un autre trouble psychique (comme la rispéridone, le thioridazine). Zyban peut interagir avec certains médicaments utilisés pour le traitement de la dépression et vous pouvez ressentir des changements d'état psychique (par ex. agitation, hallucinations, coma) et d'autres effets, tels qu'une température corporelle supérieure à 38 °C, une accélération du rythme cardiaque, une pression artérielle instable et des réflexes hyperactifs, une raideur musculaire, un manque de coordination et/ou des troubles gastro-intestinaux (par ex. nausées, vomissements, diarrhée)

médicaments contre la maladie de Parkinson (lévodopa, amantadine ou orphénadrine) carbamazépine, phénytoïne ou valproate, pour traiter l'épilepsie ou certains troubles psychiques

certains médicaments utilisés pour traiter le cancer (comme cyclophosphamide, ifosfamide)

ticlopidine ou clopidogrel, principalement utilisés pour traiter un AVC ou une maladie cardiaque

certains bêtabloquants (comme le métoprolol), principalement utilisés pour traiter l'hypertension artérielle

certains médicaments pour un rythme cardiaque irrégulier (comme le propafénone ou la flécaïnide)

ritonavir ou éfavirenz, pour le traitement d'une infection par le VIH

→ Si vous utilisez des médicaments de cette liste, contactez votre médecin. Votre médecin évaluera les avantages et les inconvénients de l'utilisation de Zyban pour vous ou pourra décider de modifier la dose de l'autre médicament que vous prenez.

Zyban peut rendre d'autres médicaments moins efficaces :

si vous utilisez du tamoxifène pour le traitement du cancer du sein

Si cela vous concerne, informez-en votre médecin. Il peut être nécessaire de passer à un autre traitement pour arrêter de fumer.

si vous utilisez de la digoxine pour votre cœur

Si cela vous concerne, informez-en votre médecin. Votre médecin peut envisager d'ajuster la dose de digoxine.

Il peut être nécessaire de réduire la posologie de certains médicaments si vous arrêtez de fumer

Si vous fumez, les substances chimiques absorbées dans votre corps peuvent rendre certains médicaments moins efficaces. Si vous arrêtez de fumer, il peut être nécessaire de réduire la posologie de ces médicaments ; sinon, vous pourriez ressentir des effets secondaires.

Si vous utilisez d'autres médicaments, contactez votre médecin si vous remarquez de nouveaux symptômes que vous pensez être des effets secondaires.

À quoi devez-vous faire attention avec l'alcool ?

Certaines personnes découvrent qu'elles sont plus sensibles à l'alcool lorsqu'elles utilisent Zyban. Votre médecin peut vous conseiller de ne pas boire d'alcool pendant que vous utilisez Zyban ou de boire le moins d'alcool possible. Mais si vous buvez actuellement beaucoup d'alcool, vous ne devez pas arrêter brusquement : cela peut être risqué et provoquer une crise.

Effet sur les tests urinaires

Zyban peut interférer avec les tests de laboratoire d'urine pour détecter d'autres médicaments. Si un test de laboratoire de votre urine doit être effectué, informez votre médecin ou l'hôpital que vous utilisez Zyban.

Grossesse, allaitement et fertilité

N'utilisez pas Zyban si vous êtes enceinte, souhaitez le devenir ou pensez l'être.

Contactez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament. Certaines, mais pas toutes, études ont signalé une augmentation du risque de malformations congénitales, en particulier des défauts cardiaques, chez les bébés dont les mères ont utilisé Zyban. On ne sait pas si cela est dû à l'utilisation de Zyban.

Les substances contenues dans Zyban peuvent passer dans le lait maternel. Contactez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Certains effets secondaires de Zyban, tels que des étourdissements ou une sensation de tête légère, peuvent affecter votre concentration et vos réflexes.

Si vous en ressentez les effets, ne conduisez pas de voiture et n'utilisez pas de machines.

3. Comment utiliser ce médicament ?

Utilisez toujours ce médicament exactement comme votre médecin ou pharmacien vous l'a indiqué. Vous avez des doutes sur la bonne utilisation ? Contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Quand devez-vous commencer et combien devez-vous prendre

Commencez à utiliser Zyban pendant que vous fumez encore.

Fixez une date pour arrêter de fumer. Il est préférable d'arrêter de fumer pendant la deuxième semaine d'utilisation de Zyban.

Semaine 1	Jours 1 à 6	Prenez un comprimé (150 mg) une fois
Continuez à fumer		par jour.

pendant que vous utilisez Zyban	Jour 7	Augmentez la dose à un comprimé deux fois par jour, avec au moins 8 heures d'intervalle, et pas juste avant de vous coucher.
Semaine 2		Continuez à prendre un comprimé deux fois par jour. Arrêtez de fumer cette semaine à la date que vous avez fixée.
Semaines 3 à 9		Continuez à prendre un comprimé deux fois par jour jusqu'à 9 semaines. Si vous n'avez pas réussi à arrêter de fumer après 7 semaines, votre médecin vous conseillera d'arrêter d'utiliser Zyban. Il peut vous être conseillé d'arrêter progressivement, après 7-9 semaines, l'utilisation de Zyban.

Certaines personnes doivent utiliser une dose plus faible car elles ont un risque accru d'effets secondaires :

- si vous avez plus de 65 ans
- si vous souffrez d'une maladie du foie ou des reins
- si vous avez un risque accru de convulsions (voir « Quand devez-vous être particulièrement prudent avec ce médicament ? » et « Prenez-vous d'autres médicaments ? » dans la rubrique 2)

La dose maximale recommandée pour vous est un comprimé de 150 mg une fois par jour.

Comment prendre vos comprimés ?

Il doit y avoir un intervalle d'au moins 8 heures entre la prise des comprimés de Zyban. Ne prenez pas Zyban juste avant de vous coucher - cela peut causer des problèmes de sommeil.

Vous pouvez prendre Zyban avec ou sans nourriture.

Avalez les comprimés entiers. Ne mâchez pas, n'écrasez pas et ne cassez pas les comprimés ; si vous le faites, le médicament sera libéré trop rapidement dans votre corps. Cela peut augmenter le risque d'effets secondaires, y compris des convulsions.

Avez-vous pris trop de ce médicament ?

Si vous prenez trop de comprimés, votre risque de convulsions ou d'autres effets secondaires peut être augmenté.

→ Agissez immédiatement. Demandez à votre médecin ce que vous devez faire ou contactez immédiatement le service des urgences le plus proche d'un hôpital.

Avez-vous oublié de prendre ce médicament ?

Si vous avez oublié une dose, attendez et prenez votre prochain comprimé à l'heure habituelle. Ne prenez pas de dose double pour compenser une dose oubliée.

Si vous arrêtez de prendre ce médicament

Il est possible que vous deviez prendre Zyban pendant 7 semaines pour obtenir l'effet complet. Ne cessez pas de prendre Zyban sans d'abord consulter votre médecin. Il est possible que vous deviez réduire progressivement votre dosage.

Avez-vous d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament ? Contactez alors votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets secondaires possibles

Comme tout médicament, ce médicament peut avoir des effets secondaires. Tout le monde n'y est pas sujet.

Effets secondaires graves

Convulsions (crises)

Environ 1 personne sur 1 000 utilisant Zyban risque d'avoir une crise. Les symptômes d'une crise incluent des convulsions et souvent une perte de conscience. Une personne ayant eu une crise peut être confuse par la suite et peut ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. Le risque que cela se produise est plus élevé si vous en prenez trop, si vous utilisez certains autres médicaments ou si vous avez un risque plus élevé de convulsions que d'habitude (voir rubrique 2).

→ Si vous avez une crise, informez-en votre médecin une fois rétabli. Ne prenez plus de Zyban.

Réactions allergiques

Rarement, des personnes (maximum 1 sur 1 000) peuvent avoir des réactions allergiques graves à Zyban. Les symptômes des réactions allergiques incluent :

éruption cutanée (y compris une éruption prurigineuse avec des bosses) ; certaines formes d'éruption cutanée nécessitent un traitement à l'hôpital, notamment si vous avez également une bouche douloureuse ou des yeux douloureux
respiration sifflante inhabituelle ou problèmes respiratoires
paupières, lèvres ou langue enflées
douleur dans les muscles ou les articulations
collapsus (évanouissement) ou une perte de connaissance

→ Si vous présentez des signes de réaction allergique, vous devez consulter immédiatement un médecin. Ne prenez plus de Zyban.

Éruption cutanée de lupus ou aggravation des symptômes liés au lupus

Inconnu – la fréquence ne peut être déterminée avec les données disponibles sur les personnes utilisant Zyban.

Le lupus est une maladie du système immunitaire qui affecte la peau et d'autres organes.

→ Si vous ressentez des poussées de lupus, des éruptions cutanées ou des lésions (notamment sur les zones exposées au soleil) pendant que vous utilisez Zyban, contactez immédiatement votre médecin, car il peut être nécessaire d'arrêter le traitement.

Pustulose Exanthématique Aiguë Généralisée (PEAG)

Inconnu – la fréquence ne peut être déterminée avec les données disponibles sur les personnes utilisant Zyban.

Les symptômes de la PEAG incluent une éruption avec des pustules remplies de pus.

→ Si vous avez une éruption avec des pustules remplies de pus, contactez immédiatement votre médecin, car il peut être nécessaire d'arrêter le traitement.

Autres effets secondaires

Effets secondaires très fréquents

Ceux-ci peuvent toucher plus d'une personne sur 10 :

troubles du sommeil (ne prenez pas Zyban juste avant de vous coucher)

Effets secondaires fréquents

Ceux-ci peuvent toucher jusqu'à une personne sur 10 :

se sentir déprimé (voir aussi « Quand devez-vous faire preuve de prudence avec ce médicament ? » dans la rubrique 2)

se sentir anxieux ou agité

problèmes de concentration

sensation d'instabilité (tremblements)

maux de tête

sensation de nausée (nausées), vomissements

douleurs abdominales ou autres problèmes (comme la constipation), changements dans le goût des aliments, bouche sèche

fièvre, vertiges, sueurs et éruptions cutanées (parfois dues à une réaction allergique), démangeaisons

Effets secondaires peu fréquents

Ceux-ci peuvent toucher jusqu'à une personne sur 100 :

acouphènes, problèmes de vision

augmentation de la pression artérielle (parfois sévère), rougeurs

perte d'appétit (anorexie)

faiblesse

douleur thoracique

confusion

rythme cardiaque accéléré

Effets secondaires rares

Ceux-ci peuvent affecter jusqu'à une personne sur 1 000 :

convulsions (voir le début de cette section)

tremblements musculaires, raideur musculaire, activité musculaire désordonnée,

problèmes de marche ou de coordination (ataxie)

palpitations

évanouissement, sensation de faiblesse lors d'un lever brusque en raison d'une chute rapide de la pression artérielle

irritation ou hostilité ; rêves anormaux (y compris cauchemars)

perte de mémoire

picotements ou engourdissements

réactions allergiques graves ; éruption cutanée associée à des douleurs articulaires et musculaires (voir le début de cette section)

uriner plus ou moins souvent que d'habitude

éruption cutanée sévère dans la bouche et sur d'autres parties du corps. Cette éruption peut être mortelle

aggravation du psoriasis (plaques épaisses de peau rouge)

jaunissement de la peau ou du blanc des yeux (jaunisse), augmentation des enzymes

hépatiques, hépatite

changements du taux de sucre dans le sang

se sentir irréel ou étrange (déréalisation) ; voir ou entendre des choses qui n'existent pas (hallucinations)

Effets secondaires très rares

Ceux-ci peuvent affecter jusqu'à une personne sur 10 000 :

- se sentir agité ou agressif
- ressentir ou croire des choses qui ne sont pas vraies (délires), méfiance sévère (paranoïa)
- incontinence urinaire (miction inattendue, perte d'urine)
- perte de cheveux inhabituelle ou amincissement des cheveux (alopécie).

Fréquence inconnue

Chez un petit nombre de personnes, d'autres effets indésirables sont survenus, dont la fréquence exacte n'est pas connue :

- pensées de se faire du mal ou de se suicider pendant l'utilisation de Zyban ou peu après l'arrêt de l'utilisation de Zyban (voir rubrique 2 « Quand ne pas utiliser ce médicament ou quand faire preuve de prudence ? »). Si vous avez ces pensées, contactez immédiatement votre médecin ou rendez-vous immédiatement à l'hôpital
- perte de contact avec la réalité et incapacité à penser ou à juger clairement (psychose) ; d'autres symptômes peuvent inclure des hallucinations et/ou des délires
- sensation de peur soudaine et intense (attaque de panique)
- bégaiement
- diminution du nombre de globules rouges (anémie), diminution du nombre de globules blancs (leucopénie) et diminution du nombre de plaquettes (thrombocytopénie)
- taux de sodium réduit dans le sang (hyponatrémie)
- changements de l'état mental (par ex. agitation, hallucinations, coma) et autres effets, tels que température corporelle supérieure à 38 °C, rythme cardiaque accéléré, pression artérielle instable et réflexes hyperactifs, raideur musculaire, manque de coordination et/ou troubles gastro-intestinaux (par ex. nausées, vomissements, diarrhée), lorsque vous utilisez Zyban avec des médicaments pour le traitement de la dépression (comme la paroxétine, le citalopram, l'escitalopram, la fluoxétine et la venlafaxine).

Effets de l'arrêt du tabac

Les personnes qui arrêtent de fumer souffrent parfois de symptômes de sevrage à la nicotine. Cela peut également se produire chez les personnes utilisant Zyban. Les signes de symptômes de sevrage à la nicotine incluent :

- problèmes de sommeil
- spasmes musculaires ou transpiration
- se sentir anxieux, excité ou déprimé, parfois avec des pensées suicidaires

Si vous êtes préoccupé par la façon dont vous vous sentez, contactez votre médecin.

Déclaration des effets indésirables

Si vous ressentez des effets indésirables, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Cela s'applique également aux effets indésirables qui ne sont pas mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets indésirables via le Centre Néerlandais de Pharmacovigilance Lareb, site web : www.lareb.nl. En signalant les effets indésirables, vous nous aidez à obtenir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conserver ce médicament ?

Conserver hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez plus ce médicament après la date de péremption. Celle-ci est indiquée sur l'emballage. Il y a un mois et une année. Le dernier jour de ce mois est la date de péremption.

Les comprimés de Zyban doivent être conservés de préférence dans l'emballage d'origine en dessous de 25 °C.

Ne jetez pas les médicaments dans l'évier ou les toilettes et ne les mettez pas à la poubelle. Demandez à votre pharmacien ce que vous devez faire avec les médicaments que vous n'utilisez plus. Si vous éliminez les médicaments correctement, ils seront détruits de manière appropriée et ne finiront pas dans l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Quelles sont les substances contenues dans ce médicament ?

La substance active de ce médicament est le chlorhydrate de bupropion.
Les autres substances de ce médicament sont :

noyau du comprimé	-	cellulose microcristalline, hypromellose, chlorhydrate de cystéine monohydraté, stéarate de magnésium
enrobage de comprimé	-	hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane (E171), cire de carnauba
encre d'impression	-	hypromellose, oxyde de fer noir (E172)

À quoi ressemble Zyban et que contient un emballage ?

Un comprimé de Zyban 150 mg est un médicament sous forme de comprimé blanc, pelliculé, biconvexe, rond avec le texte « GX CH7 » sur un côté. Les comprimés sont disponibles en boîtes contenant des blisters de 30, 40, 50, 60 ou 100 comprimés.

Il est possible que toutes les tailles d'emballage ne soient pas commercialisées.

Zyban est inscrit au registre sous le numéro RVG 24160.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation :
GlaxoSmithKline BV
Van Asch van Wijckstraat 55H
3811 LP Amersfoort
033 2081100

Fabricant :
Glaxo Wellcome S.A.
Avenida de Extremadura 3

09400 Aranda de Duero
Burgos
Espagne

Les marques sont la propriété ou sous licence du groupe GSK.

Ce médicament est enregistré dans les États membres de l'Espace économique européen sous les noms suivants :

Zyban : Belgique, Danemark, Allemagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède
Zyntabac : Pays-Bas, Espagne

Cette notice a été approuvée pour la dernière fois en mars 2024.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur ce médicament sur le site web de l'Agence néerlandaise des médicaments : www.cbg-meb.nl